

التصحيح

الموضوع الأول (20 نقطة) :

العلامة	عناصر الاجابة
كاملة جزأة	
3.5	<p>I - 1 - تحليل نتائج الوثيقة 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - عند الإصابة مباشرة بالفيروس ، يرتفع تركيز $LT4/mm^3$ في الدم من 550 إلى أن يصل إلى قيمة قصوى تقدر بـ 800 في الشهر 12 خلال مرحلة الإصابة بدون اعراض. - بالمقابل تنخفض هذه الكمية من 800 لتصل إلى 200 في الشهر 60 (بداية ظهور الامراض الانتهازية) لتنعدم في الشهر 84 . <p>الاستخلاص :</p> <ul style="list-style-type: none"> - سبب ظهور الامراض الانتهازية هو تنقص عدد $LT4$ إلى أقل من $200/mm^3$ من الدم .
7.5	<p>2 - تفسير النتائج المحصل عليها في الوثيقة 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - الغرفة 1أ : وسط الزرع يحتوي على المفاويات LB المنشطة بالمستضد X فقط ، نلاحظ غياب الأجسام المضادة في هذا الوسط ، يفسر ذلك لعدم قدرة LB المنشطة لوحدها على افراز الأجسام المضادة (غياب التحفيز) . - الغرفة 1ب : وسط الزرع يحتوي على المفاويات LB المنشطة بالمستضد X والمفاويات LT4 المنشطة بنفس المستضد ، نلاحظ وجود الأجسام المضادة في هذا الوسط ، يفسر ذلك تحفيز LT4 للمفاويات LB المنشطة وحيثها على التكاثر والتمايز إلى خلايا بلازمية منتجة للأجسام المضادة . - الغرفة 1ج : وسط الزرع يحتوي على المفاويات LB المنشطة بالمستضد X والمفاويات LT8 والمفاويات LT4 المنشطة بنفس المستضد ، نلاحظ غياب الأجسام المضادة في هذا الوسط ، يفسر ذلك بعدم قدرة LT8 على تحفيز LB المنشطة على انتاج الأجسام المضادة . - اذن ضرورة وجود تعاون خلوي بين المفاويات LT4 و LB فقط لإفراز الأجسام المضادة . <p>الغرفة 2أ : وسط الزرع يحتوي على LT8 المنشطة فقط ، لا نلاحظ انحلال للخلايا الليفية (السرطانية) ويفسر ذلك بغياب تحفيز LT8 .</p> <p>الغرفة 2ب : وسط الزرع يحتوي على LT8 المنشطة بنفس المستضد ، نلاحظ انحلال (تدمير) للخلايا السرطانية ، يفسر ذلك بتحفيز LT8 المنشطة من قبل LT4 وحيثها على التكاثر والتمايز إلى LTC المسئولة عن تدمير الخلايا السرطانية .</p> <p>اذن ضرورة وجود تعاون خلوي بين LT4 و LT8 لتدمير الخلايا السرطانية .</p>
303	<p>3 - شرح سبب ظهور الامراض الانتهازية :</p> <ul style="list-style-type: none"> - تبين الوثيقة 2 أهمية المفاويات LT4 في تنشيط الاستجابة المناعية النوعية ذات الوساطة الخلطية والتي تتدخل فيها المفاويات LB والاستجابة المناعية النوعية الخلوية والتي تتدخل فيها LT8 . - فالمفافيات LT4 تلعب دور محوري في الاستجابة المناعية النوعية (الخلطية والخلوية) . - تبين الوثيقة 1 ان الامراض الانتهازية تظهر عندما يتناقص عدد المفاويات LT4 إلى أقل $200/mm^3$ ويمكن تفسير ذلك من خلال افراز الضعيف لانترلوكينات الغير كاف لتحفيز LT8 و LB وحيثها على التكاثر والتمايز إلى خلايا بلازمية المنتجة للجسم المضادة والـ LTC على الترتيب . يترتب عن ذلك غياب الاستجابة المناعية النوعية أي فقدان المناعة المكتسبة عند المصايب ويصبح عرضة لظهور وتطور الامراض الانتهازية .
303	<p>4 - التبيان :</p> <ul style="list-style-type: none"> - في العلاج الأول ، يكون التلقيح فعال عندما يكون عدد $LT4/mm^3$ أعلى من 500 ($LT4/mm^3$) غير ان الامراض الانتهازية لا تتطور الا عند يكون عدد $LT4$ أقل من $200/mm^3$ (الشكل 1). (2.5 مرات اقل) (الوثيقة 1).

		<ul style="list-style-type: none"> - العلاج الأول فعال فقط ضد الالتهاب الرئوي وهو احدى الامراض الانتهازية . - لذلك فان العلاج الأول ليس فعال ضد تطور الامراض الانتهازية
03	2x1.5	<p>5 - البرهان على ان العلاج الثاني يؤخر الوصول على مرحلة الايدز :</p> <ul style="list-style-type: none"> - العلاج الثاني يسمح بارتفاع تركيز $\text{LT4}/\text{mm}^3$ في الدم من 250 (اقل بمرتين من 500) إلى $\text{LT4}/\text{mm}^3$ 480 بين بداية العلاج و5 سنوات من بداية العلاج (الشكل ب) . وهذا لا يؤدي إلى انخفاض عدد LT4 إلى اقل من $\text{LT4}/\text{mm}^3$ 200 في الدم المميز لمرحلة الايدز. - اذن هذا العلاج يمدد من مرحلة الإصابة بدون اعراض وتأخير الوصول الى مرحلة الايدز.

الموضوع الثاني (20 نقطة) :

العلامة	العلامة	عناصر الاجابة
كاملة	جزء	
02	02	<p>1 - شرح كيفية تأثير المورفين على المشابك العاملة بالأنكيفاليين :</p> <ul style="list-style-type: none"> - للمورفين بنية فراغية مماثلة للأنكيفاليين مما يسمح لها باحتلال المستقبل النوعي للأنكيفاليين الموجود في العشاء بعد مشبكى للعصبون الحسي . عليه يكون تأثير المورفين بنفس مفعول الأنكيفاليين أي تثبيط إفراز المادة الكيميائية (P) وهذا يوقف انتقال الرسالة العصبية عبر العصبون الوارد الى الدماغ (مركز الإحساس بالألم) ، ينجم عن ذلك عدم الإحساس بالألم .
04	02	<p>2 - تحليل نتائج التجربة 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - مدة البقاء في المنطقة P ، من الحيوانات الغير معالجة أو تلك المحقونة بالاندورفين فقط هي نفسها والمقدرة بـ 5 ثواني . وهي أقل بـ 14 مرة من 72 ثانية وهي المدة التي بقيت فيها الحيوانات المعالجة بالمورفين في المنطقة P . <p>الاستنتاج :</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاندورفين ليس له تأثير مسكن لالم ، على عكس المورفين الذي هو مسكن قوي.
02	02	<p>3 - فرضية تفسر النتيجة المحصل عليها بعد حقن الاندورفين :</p> <ul style="list-style-type: none"> - الفرضية 1 : الاندورفين يتخلل بسرعة قبل وصوله الى المشابك - الفرضية 2 : الاندورفين لا يستطيع اختراق الحاجز "دم - دماغ" للوصول الى مكان تأثيره على المشابك التي تعمل بالاندورفين . - الفرضية 3 : الاندورفين تأثيره محدد بمسافة قصيرة و زمن قصير .
03	1.5x2	<p>4 - تبيان نتائج التجربة 2 في تفسير نتيجة الجرد "ج" :</p> <ul style="list-style-type: none"> - تبين التجربة 2 التحول السريع للاندورفين إلى مواد أخرى ؛ مما تسبب في اختفائها السريع في الدم ومنع وصولها في النخاع الشوكي والدماغ . وبالمثل فإنه يدل على ان النشاط الاشعاعي يبقى على مستوى مما يفسر عدم قدرة الاندورفين لعبور الحاجز "دم-دماغ" ، هذا الحاجز غير نفوذ للاندروفين ونواتجه (مشتقاته) . - وهذا ما يفسر عدم فعالية الاندورفين كمسكن لالم سواء كان مصدره داخلي او خارجي (عن طريق حقته) .
	1.5x2	<p>5 - أ- تبيان ان الاوببيورفين هو مسكن للام :</p> <ul style="list-style-type: none"> - مدة بقاء الحيوانات المحقونة بمادة الاوببيورفين في المنطقة P ، تقدر بـ 62 ثانية وهي اقل بقليل من مدة بقاء الحيوانات المحقونة بالمورفين والتي تقدر بـ 72 ثانية ، على الرغم من حقن 1 mg/kg من المورفين . هذه الكمية اقل بـ 6 مرات من 6 mg/kg . - اذن اوبيورفين حتى ولو بجرعات ضعيفة ، فإنه فعال (مسكن لالم) مثل المورفين .

<p>3x1</p> <p>3x1</p>	<p>ب - شرح كيف تلعب مادة الأوببيورفين دور مسكن للألم ذو فعالية مشابهة للمورفين:</p> <ul style="list-style-type: none"> - يبدو أن مادة الأوببيورفين تحمي الأنكيفالين من تأثيرات الانزيم NEP الموجود في شق المشابك العصبية العاملة بالأنكيفالين . - هذه المسكن (الأوببيورفين) يقلل من تكثيف المبلغ العصبي الانكيفالين بعد تثبيته على مستقبلاته الغشائية النوعية المتواجدة على مستوى العشاء بعد مشبكى ، مما يؤدي إلى ارتفاع تركيز الانكيفالين وتواجده في الشق المشبكى وعلى المستقبلات الغشائية . - مما يدعم عمل الانكيفالين الذي يثبت انطلاق الرسالة العصبية الى مركز الإحساس بالالم ، بتنبيطة لافراز المادة p وهذا ما تبينه نتائج الشكل-أ- من خلال مدة بقاء الحيوانات المحقونة بـ اوبيورفين 62 ثانية وهي قريبة من المدة 72 ثانية لتلك المحقونة بالمورفين . <p>ج - استخلاص سببين يظهران ان الاوببيورفين هي جزئية ذات مردود علاجي أفضل من المورفين :</p> <ul style="list-style-type: none"> - اوبيورفين يؤثر بجرعات ضعيفة (6مرات اقل المورفين) للحصول على التاثير المسكن للألم : ◆ الآثار الجانبية لاستعمال اوبيورفين منخفضة بالمقارنة مع تلك التي يسببها المورفين : لا امساك والادمان / التبعية العقلية. - اوبيورفين مادة طبيعية تقرزها العضوية ، عكس المورفين ذو المصدر الخارجي . - اوبيورفين يعمل على تضخيم قدرات المسكنات الطبيعية (تضخيم عمل الانكيفالين الذي هو أيضا اندورفين طبيعي)، على عكس المورفين الذي يخفضها.
-------------------------------------	--