

التصحيح

عناصر الإجابة		العلامة
مجزأة	كاملة	
<u>01ن</u>		<p>I - 1 - أ - تعريف مفهوم "المحفز البيولوجي":</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ مادة كيميائية تسرع من التفاعل الكيميائي ، دون ان تتحول خلال التفاعل ولا تستهلك في نهاية التفاعل ، وتعمل في شروط ملائمة للحياة من درجة حرارة و PH ملائمين .
<u>01ن</u>		<p>ب- المقارنة بين انزيم الاميلاز وتحث الوحدة الريبوزومية الكبرى :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ أوجه التشابه : ▪ كليهما يمتلك بنية فراغية كروية والتي تشكل تجويف (موقع فعال) على مستواه يتم تثبيت مادة التفاعل. ✓ أوجه الاختلاف : ▪ مادة التفاعل هي النشاء بالنسبة لانزيم الاميلاز بينما البروتينات في مرحلة التشكل هي مادة التفاعل بالنسبة لتحث الوحدة الريبوزومية الكبرى. ▪ الاميلاز عبارة عن بروتين يتكون من سلسلة واحدة من الأحماض الأمينية بينما الريبوزوم (تحث الوحدة الريبوزومية الكبرى) عبارة عن تجمع جزيئات لمعقد من البروتينات الريبوزومية والـ ARN الريبوزومي.
<u>06ن</u>	<u>01ن</u>	<p>ج - نوع التفاعل الكيميائي المحفز من طرف كل من انزيم الأميلاز والريبوزوم (تحث الوحدة الكبرى):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ بالنسبة للاميلاز : نوع التفاعل إماهة (تفكيك) النشاء ✓ بالنسبة لتحث الوحدة الريبوزومية الكبرى : نوع التفاعل تركيب (بناء) ، حيث يتم ربط الاحماض الامينية مع بعضها مشكلة سلسلة ببتيدية.
<u>01ن</u>	<u>01ن</u>	
<u>04ن</u>	<u>02ن</u>	<p>2 - أ - المعلومة المستخرجة من معطيات الشكل(أ) من الوثيقة2 فيما يخص العلاقة بين البنية الفراغية والموقع الفعال لانزيم الأميلاز:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال لانزيم الاميلاز والتي تتدخل في عملية التحفيز الأنزيمي هي تلك التي تقع على مسافة من مادة التفاعل أقل من 1 nm ، مثال على ذلك الحمض الاميني التربتوفان رقم 58 يبعد بمسافة تقدر بـ 0.4 nm عن مادة التفاعل. <p>ب- تحليل معطيات الشكلين (ب و ج) على مستوى الريبوزوم:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ الشكل (أ) : الاحماض الامينية للبروتينات الأقرب من مادة التفاعل تقع على مسافة في حدود 2.0 nm. ✓ الشكل (ب) : في حين بعض نيكليوتيدات الـ ARNr تبع بمسافة أقل من 1 nm عن مادة التفاعل. مثل الادنين رقم 2485 يبعد فقط بـ 0.4 nm عن مادة التفاعل : <p style="text-align: right;">الاستنتاج :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ جزيئات الـ ARNr على مستوى الموقع الفعال والأقرب من مادة التفاعل ، تلعب دور محفز على مستوى الريبوزوم.
<u>02ن</u>	<u>02ن</u>	<p>II 1- شرح سبب فقدان الانزيم نشاطه التحفيزي على المستوى الجزيئي :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ تغيير لحمض الاميني التربتوفان رقم 58 بالالنين (أحد مكونات الموقع الفعال) على مستوى انزيم الاميلاز ، أدى الى فقدان هذا الأخير لنشاطه التحفيزي ، يرجع ذلك الى تغيير في البنية الفراغية الطبيعية للانزيم على مستوى الموقع الفعال مما يعيق تشكل المعقد "انزيم - مادة التفاعل" مما أدى الى توقف النشاط التحفيزي للاميلاز.
<u>03.5ن</u>	<u>05ن</u>	<p>2 - نعم تتوافق معطيات ونتائج الوثيقة3 مع ما توصلت اليه في اجابتك على السؤال (I-2-ب) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ جزيئات الـ ARNr على مستوى الموقع الفعال والأقرب من مادة التفاعل ، تلعب دور محفز على مستوى الريبوزوم. <p style="text-align: right;">الشرح :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ تغيير الادنين رقم 2485 بقاعدة بسيطة البيورين لتحث الوحدة الريبوزومية الكبرى أدى إلى انخفاض
<u>03ن</u>		

حاد في قدرتها على تركيب البروتين خلال 3 ساعات (انخفاض النشاط التحفيزي للريبوزوم)، فالريبوزوم المتغير يركب البروتينات أقل بـ 5 مرات من كمية الروتينات المركبة من قبل الريبوزوم الطبيعي ، فهذا الانخفاض في النشاط التحفيزي للريبوزوم المتغير يعود الى عرقلة تشكل المعقد "ريبوزوم - بروتين في مرحلة التشكل"

04.5ن

4.5ن

II – النص العلمي : تبيان بأن الريبوزوم يمتلك خصائص المحفز البيولوجي مماثلة للانزيم:

- ✓ يمتلك الريبوزوم خصائص مشابهة لانزيمات من طبيعة بروتينية : حيث تمتلك الريبوزومات موقع فعال تثبت عليه مادة التفاعل. على مستوى النزيم مثل الأميلاز .
- ✓ الاحماض الأمينية على مستوى الموقع الفعال والقريبة من مادة التفاعل هي المتدخلة في عملية التحفيز وتغيرها يخفض النشاط التحفيزي للانزيم . على مستوى الريبوزوم البروتينات ليست هي الأقرب لمادة التفاعل وانما الـ ARNr وتغير النيكلوتيدات المرتبطة مع مادة التفاعل او الركيزة يؤدي الى فقدان الخصائص التحفيزية للريبوزوم.
- ✓ اذن الـ ARNr هو الذي يلعب دور المحفز في الريبوزوم (تحت الوحدة الريبوزومية الكبرى) ويطلق عليه اسم الريبوزيم (ribozyme)