

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط للإمتحان التجريبي دورة ماي 2016 (لغات وأداب)

العلامة		عناصر الإجابة	محاور الموضوع										
المجموع	مجزأة												
5ن	0.5+0.5 0.5+0.5 0.5 × 3 0.5+0.5 0.5	<p><u>الموضوع الأول</u></p> <p><u>التمرين الأول:</u></p> <p>1. $619 \equiv 4[5]$ و $2124 \equiv 4[5]$</p> <p>2. أ لدينا $2124 \equiv 4[5]$ و $4 \equiv -1[5]$ ومنه $2124 \equiv -1[5]$</p> <p>ب) $2124^{720} \equiv 1[5]$ و $619^{721} \equiv -1[5]$ أي $619^{721} \equiv 4[5]$</p> <p>ج) $2124 \equiv -1[5]$ أي $2124^{2n} \equiv (-1)^{2n}[5]$ ومنه $2124^{2n} \equiv 1[5]$</p> <p>د) $n = 5k$</p>	<p><u>القسم في</u></p> <p><u>\mathbb{Z}</u></p>										
7ن	01.5 01.5 01 01.5 01.5	<p><u>التمرين الثاني:</u></p> <p>1. $u_3 = \frac{-11}{4}, u_2 = \frac{-1}{2}, u_1 = 1$</p> <p>2. $V_3 = \frac{-27}{4}, V_2 = \frac{-9}{2}, V_1 = -3$</p> <p>3. (V_n) متتالية هندسية حيث: $q = \frac{3}{2}$ و $V_0 = -2$</p> <p>4. $U_n = -2 \left(\frac{3}{2}\right)^n + 4$ و $V_n = -2 \left(\frac{3}{2}\right)^n$</p> <p>5. $S = 4 \left[1 - \left(\frac{3}{2}\right)^{n+1}\right]$ و $S' = 4 \left[1 - \left(\frac{3}{2}\right)^{n+1}\right] + 4(n+1)$</p>	<p><u>المتاليات</u></p> <p><u>العددية</u></p>										
8ن	01 0.75 01 0.5 0.5	<p><u>التمرين الثالث:</u></p> <p>1- النهايات</p> <p>$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$</p> <p>2 أ) $f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{-73}{27}, f(2) = 1, f(1) = -3$</p> <p>ب) الدالة المشتقة: $f'(x) = 6x^2 - 8x + 2$</p> <p>إتجاه التغير: $\Delta = 16, x_1 = \frac{1}{3}, x_2 = 1$</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">$-\infty$</td> <td style="text-align: center;">$\frac{1}{3}$</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">$+\infty$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$f'(x)$</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </table> <p>الدالة f متزايدة على كل من المجالين $]-\infty; \frac{1}{3}[$ و $]1; +\infty[$ ومتناقصة على $]\frac{1}{3}; 1[$</p>	x	$-\infty$	$\frac{1}{3}$	1	$+\infty$	$f'(x)$		+	-	+	<p><u>الدوال</u></p> <p><u>كثيرات</u></p> <p><u>الحدود</u></p>
x	$-\infty$	$\frac{1}{3}$	1	$+\infty$									
$f'(x)$		+	-	+									

0.75

x	$-\infty$	$\frac{1}{3}$	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	-	+
$f(x)$	$-\infty$	$-\frac{73}{27}$	-3	$+\infty$

0.5

0.5

0.5

$$f(x) = 2x(x - 1)^2 - 3 \quad /3$$

$$(T): y = 10x - 19 \quad /4$$

$$f'(x) = 12x - 8 \quad /5 \text{ نقطة الإنعطاف}$$

f'' تنعدم وتغير إشارتها عند النقطة ذات الفاصلة $\frac{2}{3}$

0.5

$$/6 \text{ مستقيم معادلته } (\Delta): y = 2x - 3$$

$$أ) \quad f(x) - (2x - 3) = 2x^2(x - 2)$$


$$ب) \text{ دراسة إشارة } f(x) - (2x - 3)$$

0.5

x	$+\infty$	2	$+\infty$
$f(x) - (2x - 3)$	-	0	+
الوضعية	يتقاطعان		(C_f) يقع فوق (Δ)

7/ التمثيل البياني:

01



الموضوع الثاني

التمرين الأول:

6 ن

05+05
01

0.5
01

0.5
02

$$u_n = -2n + 1, u_0 = 1 \quad /1$$

$$S_1 = (n+1)(1-n) \quad /2$$

$$S_2 = \frac{1}{4}(5^{n+1} - 1) \quad /3 \text{ أ} \quad v_n = 5^n \quad /3 \text{ ب}$$

$$w_n = v_n - u_n - 2 \quad /4$$

$$S_3 = S_2 - S_1 - 2(n+1)$$

الإحتمالات

04

01
0.5+0.5
0.5+0.5
0.5+0.5

$$\Omega = \{(1,2); (1,3); (1,4); (1,5); (1,6); (2,3); (2,4); (2,5); (2,6); (3,4); (3,5); (3,6); (4,5); (4,6); (5,6)\} \quad /1$$

$$A = \{(1,4); (2,3)\}, B = \{(1,3); (2,4); (3,5); (4,6)\} \quad /2$$

$$p(B) = \frac{4}{15} \quad \text{و} \quad p(A) = \frac{2}{15} \quad /3 \text{ أ}$$

$$p_A(B) = 0 \quad \text{إذن} \quad P(A \cap B) = 0 \quad \text{و} \quad A \cap B = \emptyset \quad /3 \text{ ب}$$

الدوال
التناظرية

10

4 × 0.5

0.5

0.5

01

01

01

التمرين الثالث:

1/ دراسة تغيرات f :

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -1$$

التفسير البياني:

1- معادلة مستقيم مقارب ل (C_f) يوازي محور الفواصل بجوار $(-\infty$ و $+\infty)$

2- معادلة مستقيم مقارب ل (C_f) يوازي محور الترتيب

2- إتجاه التغير:

$$f'(x) = \frac{-3}{(-x+4)^2}$$

ونلاحظ أنه من أجل كل $x \in D_f$: $f'(x) < 0$ ومنه f متناقصة تماما

-جدول التغيرات:

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$f(x)$	-1	$+\infty$	-1

3/ يوجد مماسين عند النقطتين ذات الفاصلتين: 3 و 5

01

- معادلة المماسين : $(\Delta) : y = -3x + 5$

01

 $(\Delta') : y = -3x + 17$

/4 نقاط التقاطع مع المحورين :

0.5

0.5

- مع محور الترتيب : $(C_f) \cap (yy') = \left\{ \left(0, -\frac{7}{4} \right) \right\}$ - مع محور الفواصل : $(C_f) \cap (xx') = \{ (7, 0) \}$

/5 التمثيل البياني:

01

