الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الـــــوادي
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي التجريبي
الشعبة: علوم تجريبية **(دورة: ماي2015)**

اختبار في مادة الرياضيات **المـدة: 03 ساعات ونصف**

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضـــوع الأول

التمرين الأول :(04 نقط)

الفضاء منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O;\vec{i};\vec{j};\vec{k})$. نعتبر النقط $A(-1;0;1)$ ، $B(1;1;0)$ و $C(0;-1;-4)$.

و ليكن (Δ) المستقيم المعرف بتمثيله الوسيطي التالي : $\begin{cases} x = 2t-1 \\ y = t+3 \; ; \; t \in \square \\ z = -t+1 \end{cases}$

(P) المستوي المعرف بتمثيله الوسيطي : $\begin{cases} x = \alpha+\beta+3 \\ y = -\alpha+2 \quad ; \; \alpha \in \square \; , \; \beta \in \square \\ z = \alpha+2\beta \end{cases}$

أجب بصحيح أو خطأ على الجمل التالية مع التعليل:

1. النقطة B هي المسقط العمودي للنقطة C على المستقيم (Δ)

2. المستوي (P) له معادلة ديكارتية من الشكل $2x+y+z-8=0$

3. المستقيم (Δ) يعامد المستوي (P)

4. النقطة B تنتمي إلى المستوي المحوري للقطعة $[AC]$

التمرين الثاني:(4.5 نقط)

I) حل في مجموعة الاعداد المركبة المعادلة: $(z+2)(z^2+2-2\sqrt{3}i)=0$

II) في المستوي المركب المنسوب لمعلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{u};\vec{v})$ نعتبر النقط A ، B و C التي لواحقها:

$z_A=-2$ ، $z_B=-1-i\sqrt{3}$ و $z_C=-z_B$.

1. بين أن $|z_A-z_B|^2+|z_A-z_C|^2=|z_B-z_C|^2$ ثم استنتج طبيعة المثلث ABC

2. أثبت ان النقط A ، B و C تنتمي الى نفس الدائرة ، يطلب تعيين مركزها و نصف قطرها

3. أ- عين z_D لاحقة النقطة D صورة النقطة A بالتحاكي الذي مركزه O نسبته -1

ب- ما طبيعة الرباعي $ABDC$

4. بين ان C صورة B بتحويل نقطي مركزه A يطلب تعيين طبيعته وعناصره المميزة

5. نرفق يكل نقطة M من المستوي ذات اللاحقة z $(z \neq -2)$ النقطة M' ذات اللاحقة z' حيث : $z'=\dfrac{iz-\sqrt{3}+i}{z+2}$

أ- اثبت أن $\arg(z')=\dfrac{\pi}{2}$ $(\overrightarrow{AM};\overrightarrow{BM})$

ب- عين مجموعة النقط M بحيث يكون z' تخيلي صرف موجب تماما

التمرين الثالث (4,5 نقط)

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $u_0 = e^3 - 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = e^{-3} - 1 + e^{-3}u_n$

1. احسب u_1 ، u_2 ثم برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n > -1$.

2. أ- بين أن المتتالية (u_n) متناقصة تماما

ب- استنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة ، ثم احسب نهايتها

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n = \frac{1}{2}v_n - 1$

أ- بين أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول v_0

ب- أكتب بدلالة n ، كلا من v_n و u_n ، ثم أحسب من جديد $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$

ج- عين مجموعة الأعداد الطبيعية n بحيث يكون $v_n > 2\times10^{-3}$

4. أ- احسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = \frac{u_0}{v_0} + \frac{u_1}{v_1} + \cdots + \frac{u_n}{v_n}$

ب- ليكن الجداء P_n حيث $P_n = v_0 \times v_1 \times \ldots \times v_n$

بين أن: $\ln(P_n) = 3n - \frac{n+1}{2}(2\ln 2 + 6)$ ثم استنتج P_n بدلالة n

التمرين الرابع (07نقط)

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = x + \ln 4 + \frac{2}{e^x + 1}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O;\vec{i};\vec{j})$

1. احسب نهايتي الدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$

2. ادرس اتجاه تغير الدالة f و شكل جدول تغيراتها

3. احسب من اجل كل عدد حقيقي x : $f(x) + f(-x)$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا

4. أ- بين أن المعادلة $f(x) = 3$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1,1 < \alpha < 1,2$

ب- من أجل اي قيمة للعدد الحقيقي m يكون العدد $(-\alpha)$ حلا للمعادلة $f(x) = m$

5. أ- بين أنه من كل عدد حقيقي x فان: $f(x) = x + 2 + \ln 4 - \frac{2e^x}{e^x + 1}$

ب- بين ان المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x + \ln 4$ و المستقيم (Δ') ذو المعادلة $y = x + 2 + \ln 4$ مستقيمان مقاربان للمنحنى (C_f) ثم ادرس وضعية (C_f) بالنسبة الى كل منهما

6. ارسم (Δ) ، (Δ') و (C_f)

7. ليكن λ عدد حقيقي موجب تماما ، $A(\lambda)$ مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) و المستقيم (Δ) و المستقيمين اللذين معادلتيهما $x = 0$ و $x = \lambda$

أ- اعتمادا على السؤال (5- أ) بين أن : $A(\lambda) = 2\ln\left(\frac{2e^\lambda}{e^\lambda + 1}\right)$

ب- عين قيمة العدد λ بحيث يكون $A(\lambda) = 1$.

الموضـــوع الثاني

التمرين الأول :(04 نقط)

الفضاء منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O;\vec{i};\vec{j};\vec{k})$. نعتبر النقط $A(2;1;-4)$ ، $B(-2;2;-1)$ و $C(0;3;-4)$

والمستوي (P) الذي معادلته $x-y+z+1=0$

1. بين أن النقط A ، B و C تعين مستوي (Q) بحيث الشعاع $\vec{n}(1;1;1)$ ناظميا له ، ثم اكتب معادلة ديكارتية لـ (Q)
2. بين أن (P) و (Q) غير متوازيين و غير متعامدين
3. عين تمثيل وسيطي للمستقيم (Δ) تقاطع المستويين (P) و (Q)
4. لتكن $\Omega(1;0;1)$ نقطة من الفضاء

أ بين ان النقطة Ω متساوية البعد عن المستويين (P) و (Q)

ب عين معادلة سطح الكرة (S) ذو المركز Ω و المماس لـ (P) و (Q)

ج عين احداثيات النقطتين D و H نقطتي التماس بين (S) و (P) و بين (S) و (Q) على الترتيب

5. لتكن $E\left(-\frac{1}{2};0;-\frac{1}{2}\right)$ هي المسقط العمودي لـ Ω على المستقيم (Δ) ، احسب المسافة بين Ω و (Δ)

التمرين الثاني :(4,5 نقط)

I) حل في مجموعة الاعداد المركبة المعادلة $(z+2)(z^2+z+1)=0$

II) في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ نعتبر النقط A ، B ، C ، D ، E ذات اللواحق

$z_A=\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$ ، $z_B=\overline{z_A}$ ، $z_C=-2$ ، $z_D=2(1+\sqrt{3}i)$ ، $z_E=\overline{z_D}$

1. اكتب $-z_A$ على الشكل الاسي ثم علم النقط A ، B ، C ، D ، E
2. ليكن R التحويل النقطي الذي يحول $M(z)$ الى $M'(z')$ حيث : $\frac{z'+2}{z+2}=-z_A$

أ ما طبيعة التحويل R و حدد عناصره المميزة

ب لتكن النقطة F حيث : $R(D)=F$ ، بين أن $z_F=1+\sqrt{3}i$

ج اكتب العدد $\frac{z_E-z_F}{z_D-z_F}$ على الشكل الجبري ثم استنتج ان المستقيمين (FD) و (EF) متعامدان

3. لتكن G مرجح الجملة $\{(A,|z_A|);(B,|z_B|);(C,|z_C|)\}$

أ عين z_G لاحقة G

ب عين مجموعة النقط M حيث : $\overrightarrow{MG}=\lambda\overrightarrow{AB}$ لما يمسح λ مجموعة الاعداد الحقيقية

ج اكتب معادلة ديكارتية لهذه المجموعة

التمرين الثالث:(4,5 نقط)

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بـ : $u_1 = e^2$ ومن أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ، $u_{n+1} = e^{\frac{-1}{2}}\sqrt{u_n}$

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $u_n > \frac{1}{e}$

2. أ- بين أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n : $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$

ب- استنتج أن (u_n) متناقصة تماما

ج هل (u_n) متقاربة ؟ اذا كانت متقاربة فما هي نهايتها

3. (v_n) متتالية معرفة من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n بـ : $v_n = \frac{1}{2} + \ln\sqrt{u_n}$

أ- برهن أن المتتالية (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول

ب- أكتب v_n بدلالة n ثم استنتج u_n بدلالة n

4. احسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = \frac{1}{1+\ln u_1} + \frac{1}{1+\ln u_2} + \cdots + \frac{1}{1+\ln u_n}$

التمرين الرابع :(07 نقط)

لتكن f دالة عددية معرفة على المجال $]-1;+\infty[$ كما يلي : $f(x) = \ln(x+1) - \frac{2x}{x+1}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O;\vec{i};\vec{j})$ (وحدة الطول 2cm)

1. احسب نهايتي الدالة f عند اطراف مجموعة تعريفها

2. أ- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-1;+\infty[$ فان: $f'(x) = \frac{1-x}{(x+1)^2}$

ب- ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها

3. اكتب معادلة المماس (Δ) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0

4. بين ان المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيين احداثييها

5. بين أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $3,9 < \alpha < 4$

6. ارسم المستقيم (Δ) و المنحنى (C_f)

7. ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و اشارة حلول المعادلة $f(x)=m$

8. F دالة معرفة على $]-1;+\infty[$ بـ : $F(x) = (3-x)\ln(x+1) + 3x$

أ- بين ان F دالة أصلية للدالة f على المجال $]-1;+\infty[$

ب- لتكن $A(\alpha)$ مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) و محور الفواصل و المستقيمين اللذين معادلتيهما $x=0$ و $x=\alpha$

بين أن : $A(\alpha) = \left(\frac{\alpha^2 - 3\alpha}{\alpha+1}\right) cm^2$ ثم اوجد حصرا لـ $A(\alpha)$