الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

امتحان بكالوريا تجريبي للتعليم الثانوي الشعبة : رياضي و تقني رياضي)

اختبار في مادة: الرياضيات المدة: 04 سا و 30 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعيين التاليين:

الموضوع الأول

التمرين الأول:(04 نقــاط)

الفضاء منسوب الى معلم متعامد متجانس $\left(O;\vec{i};\vec{j};\vec{k}\right)$، نعتبر المستقيمين (d) و (d') المعرفين كمايلي:

$$(d):x-2=\frac{y-1}{2}=1-z \quad ، \quad (d'):\begin{cases} x=4+3t' \\ y=3+t' \\ z=3+2t' \end{cases} ;t'\in\square$$

1) أكتب التمثيـل الوسيطي للمستقيم (d) ، ثم بين أن المستقيمين (d) و (d') ليسا من نفس المستوي.

2) أ*/ أوجد المعــادلة الديكــارتية للمستويين (p_1) و (p_2) اللذين يشملان النقطة $A(4;-7;5)$.

حيث المستوي (p_1) يحوي المستقيم (d) و المستوي (p_2) يحوي المستقيم (d') .

ب*/ تحقق أن المستويين (p_1) و (p_2) متقاطعان وفق مستقيم (Δ) معرف بـ: $(\Delta):\begin{cases} x=\frac{-1}{11}+9\alpha \\ y=3-22\alpha \\ z=11\alpha \end{cases} ;\alpha\in\square$

3) لتكـن $B\left(\frac{-1}{11};3;0\right)$ نقطة تقاطع المستقيم (Δ) و المستوي (Q) ذو المعادلة: $11x+y-z=2$.

أ*/ أوجد إحداثيات النقطة A' المسقط العمودي للنقطة A على المستوي (Q).

ب*/ استنتج المسقط العمودي للمستقيم (Δ) على المستوي (Q).

4) (Γ) مجموعة النقط $M(x,y,z)$ من الفضاء تحقق : $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$

*/ عين طبيعة المجموعة (Γ) محددا عناصرها المميزة.

التمرين الثاني: (04 نقــاط)

A_0 و B_0 نقطتان من المستوي حيث: $A_0B_0=8$ (الوحدة هي السنتيمتر) ، ليـكن S التشابــه المباشر الذي مركزه النقطة A_0 ونسبتـــه $\frac{1}{2}$ و زاويتـــه $\frac{3\pi}{4}$.

نعرف متتــالية النقـــط (B_n) كمـــايلي : $B_{n+1}=S(B_n)$ ، من أجل كل عدد طبيعي n .

1) أنشئ النقط B_1 ، B_2 ، B_3 و B_4.

2) أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n المثلثان: $A_0B_nB_{n+1}$ و $A_0B_{n+1}B_{n+2}$ متشابهان.

3) نعرف متتالية (u_n) بـ : $u_n = B_nB_{n+1}$ من أجل كل عدد طبيعي n.

أ*/ أثبت أن (u_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$.

ب*/ أكتب عبارة u_n بـدلالة n.

ج*/ نضع المجموع: $\delta_n = u_0 + u_1 + u_2 + ... + u_n$ ، أحسب δ_n بدلالة n ثم أوجد $\lim\limits_{n \to +\infty} \delta_n$

4) أ*/ حل في $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ المعادلة : $3x - 4y = 2$

ب*/ ليكن (Δ) المستقيم العمودي على المستقيم (A_0B_0) في النقطة A_0.

*جد قيم العدد الطبيعي n التي من اجلها تكون النقطة B_n تنتمي إلى المستقيم (Δ).

<u>التمرين الثالث</u>: (05 نقـــاط)

1) نعتبر في مجموعة الاعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z:

$(E) ... \ \overline{z}^3 - 3\overline{z}^2 + 3\overline{z} + 7 = 0$ ، $\overline{z}$ هو مرافق العدد المركب z .

أ*/ بين أن المعادلة (E) تكافئ المعادلة : $(\overline{z}+1)(\overline{z}^2 - 4\overline{z} + 7) = 0$.

ب*/ حـل في $\mathbb{C}$ المعادلة (E) .

2) في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(o;\vec{u};\vec{v})$ ، نعتبر النقط A, B, C و D لواحقها على الترتيب : $z_A = -1$ ، $z_B = 2 + i\sqrt{3}$ ، $z_C = \overline{z_B}$ ، $z_D = 3$.

أ*/ عين قيم العدد الطبيعي n حتى يكون $(z_B - z_A)^n$ عددا حقيقيا سـالبا .

ب*/ عين طبيعة المثلث ABC .

3) أ*/أكتب العدد $\frac{z_A - z_C}{z_D - z_C}$ على الشكل الأسي، ثم استنتج أن النقطة A صورة D بتحويل نقطي يطلب تعيينه.

ب*/ أوجد مركز ونصف قطر الدائرة المحيطة بالمثلث ACD .

4) (Γ) مجموعة النقط M من المستوي لاحقتها z تحقق: $z + 1 = 2\sqrt{3}.k.e^{i\frac{\pi}{6}}$ حيث k يمسح المجال $[0;+\infty[$

*/ عين قيسا للزاوية الموجهة $(\vec{u};\overrightarrow{AB})$ ، ثم استنتج مجموعة النقط (Γ).

5) أ*/ عين قيمة العدد الحقيقي α بحيث يكون : $-\overrightarrow{CA} + 2\overrightarrow{CB} + \alpha\overrightarrow{CD} = \vec{0}$.

ب*/ عين (E) مجموعة النقط M من المستوي حيث: $\left\|-\overrightarrow{AM} + 2\overrightarrow{BM} - 3\overrightarrow{DM}\right\| \leq 2\left\|\overrightarrow{BM} - \overrightarrow{CM}\right\|$

جـ*/ استنتج مجموعة نقط تقاطع (E) و (Γ).

التمرين الرابع:(07 نقـــاط)

1) g الدالة العددية للمتغير الحقيقي x المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـــ: $g(x)=x^2e^x$

أ*/ أدرس اتجاه تغير الدالة g على المجال $]0;+\infty[$.

ب*/ استنتج أنه : إذا كان $0 \prec x \prec 1$ فإن $g(x) \prec g\left(\frac{1}{x}\right)$ و إذا كان $x \succ 1$ فإن $g(x) \succ g\left(\frac{1}{x}\right)$

2) نعتبر الدالة العددية f للمتغير الحقيقي x المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي :

$$f(x)=\left(x^2-2x+2\right)e^x+e^{\frac{1}{x}}-3e$$

(C_f) تمثيـلها البيـاني في مستوي منسوب إلى معلم متعامد متجانس $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$.

h دالـة عددية معرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $h(x)=e^{\frac{1}{x}}-3e$. (C_h) تمثيلها البياني (**أنظر الملحق**)

أ*/ أحسـب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x \xrightarrow{>} 0} f(x)$.

ب*/ بين أنه من أجل كل x من المجال $]0;+\infty[$: $f'(x)=g(x)-g\left(\frac{1}{x}\right)$ ، ثم احسب $f'(1)$.

ج*/ شكل جدول تغيرات الدالة f على المجال $]0;+\infty[$.

3) أ*/ بين أن المعادلة: $\left(x^2-2x+2\right)e^x=-h(x)$ تقبل حلين α و β حيـث: $1.5 \prec \beta \prec 1.6$ و $0.5 \prec \alpha \prec 0.6$ ، ثم استنتج أن المنحنى (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطتين .

ب*/ أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمنحنى (C_h).

ج*/ بين ان المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) في النقطة التي فاصلتها 1 يطلب كتابة معادلته .

4) أ*/ أرسم (T) و (C_f) . **(الملحــق يعــاد مع ورقة الإجابـــة)**

ب*/ m عدد حقيقي موجب تماما ، أوجد قيمة m حتى تقبل المعادلة (E) حلين متمايزين:

$$(E)....f(x)=\left(m^2-2m+2\right)e^m+h(m)$$

5) أ*/ بين أنه من أجل كل x من المجال $]0;+\infty[$: $\int_1^x\left[f(t)-h(t)\right]dt=\left(x^2-4x+6\right)e^x-3e$

ب*/ ليكن العدد λ من المجـال $]0;1]$ ،

$A(\lambda)$ مســاحة الحيز المستوي المحــدد بالمنحنيين (C_h) و (C_f) و المستقيمين اللذين معادلتاهما : $x=\lambda$ و $x=1$.

* استنتـــج $A(\lambda)$ (مقدرة بوحدة المساحة) ، ثم احســب $\lim\limits_{\lambda \xrightarrow{>} 0} A(\lambda)$.

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني:

التمرين الأول:(04 نقــاط)

الفضاء منسوب الى معلم متعامد متجانس $\left(O;\vec{i};\vec{j};\vec{k}\right)$، نعتبر النقط $A\left(3;1;0\right)$، $B\left(1;2;0\right)$، $C\left(3;2;1\right)$

و $D\left(0;0;m\right)$ حيث m عدد حقيقي موجب ، $\left(Q\right)$ مستوي معرف بـ: $\begin{cases} x=2-2\alpha+\beta \\ y=\frac{3}{2}-4\alpha+2\beta \\ z=-5\alpha \end{cases} ;(\alpha,\beta)\in\mathbb{R}^2$

1) أ*/ أحسب الجداء السلمي $\overrightarrow{BA}.\overrightarrow{BC}$ ثم استنتج القيمتين المضبوطتين لكل من $Cos\widehat{ABC}$ و $Sin\widehat{ABC}$.

ب*/ أحسب مساحة المثلث ABC.

ج*/ بين أن $\vec{n}(1;2;-2)$ شعاع نـاظمي للمستوي $\left(ABC\right)$ ثم استنتج معادلة ديكــارتية له .

د*/ بين أن $ABCD$ رباعي وجوه و أن حجمـه : $V=\frac{2m+5}{6}\,uv$

2) أ*/ بين أن: $\left(Q\right)$ هو المستوي المحوري لقطعة المستقيم $\left[AB\right]$ معادلته الديكارتية : $-2x+y=\frac{-5}{2}$.

ب*/ استنتج ان المستويين $\left(ABC\right)$ و $\left(Q\right)$ متعامدان و أنهما متقاطعان وفق مستقيم $\left(\Delta\right)$ يطلب تعيين تمثيـله الوسيــطي.

ج*/ أحسب $d\left(D;\left(Q\right)\right)$ ثم استنتج بدلالة m المسافة بين النقطة D و المستقيم $\left(\Delta\right)$.

3) لتكن $\left(S_m\right)$ مجموعة النقط $M\left(x;y;z\right)$ من الفضاء التي تحقق: $x^2+y^2+z^2-2mz+m^2-9=0$

أ*/ بين أنه من اجل عدد حقيقي m فان $\left(S_m\right)$ سطح كرة يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها .

ب*/عين قيمة m حتى يكون المستوي $\left(ABC\right)$ مماسا لسطح الكرة $\left(S_m\right)$.

4) أكتب معادلة المستوي $\left(P\right)$ الموازي تماما للمستوي $\left(ABC\right)$ و يمس سطح الكرة $\left(S_m\right)$.

التمرين الثاني:(04 نقــاط)

1) نعتبر المعادلة $\left(E\right)$ ذات المجهولين الصحيحين x و y حيث: $11x-5y=2$

أ*/ أثبت أنه إذا كانت الثنائية $\left(x;y\right)$ من $\mathbb{Z}^2$ حلا للمعادلة $\left(E\right)$ فإن $y\equiv 4[11]$.

ب*/ استنتج حلول المعادلة $\left(E\right)$.

2) ليكن n عددا طبيعيا غير معدوم ، نضــع : $a=5n+2$ و $b=11n+4$.

أ*/ عين القيم الممكنة للقاسم المشترك الأكبر للعددين a و b .

ب*/عين قيم العدد الطبيعي غير المعدوم n بحيث يكون: $PGCD\left(a;b\right)=2$.

ج*/ استنتج قيم العدد الطبيعي غير المعدوم n بحيث يكون العددان a و b أوليان فيما بينهما.

3) من أجل كل عدد طبيعي n ، نضع : $A=5n^2+7n+2$ و $B=11n^2+15n+4$.

أ*/ بين أن العدد $(n+1)$ يقسم كل من العددين A و B .

ب*/ استنتج حسب قيم n القاسم المشترك الأكبر للعددين A و B.

التمرين الثالث: (05 نقــاط)

1) عين العددين المركبين z_1 و z_2 حيث : $\begin{cases} 2z_1 + iz_2 = 1 + i\sqrt{3} \\ (\sqrt{3}+2i)z_1 - z_2 = (1-\sqrt{3})i \end{cases}$

2) في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(o\,;\vec{u}\,;\vec{v}\right)$ ، نعتبر النقطتين A و B ذات اللاحقتين: $z_A = 1 - i$ و $z_B = 2 + \sqrt{3} + i$.

أ*/ اكتب z_A على الشكل الأسي .

ب*/ بين أن: $\frac{z_B}{z_A} = (1+\sqrt{3})e^{i\frac{\pi}{3}}$ ، ثم استنتج الشكل الأسي للعدد z_B .

ج*/هل تـوجد قيم للعدد الطبيعي n حتى تكون صورة العدد $\left(\frac{z_B}{z_A}\right)^n$ تنتمي إلى المنصف الأول؟

3) أ*/ أوجد لاحقة النقطة B' صورة النقطة B بالدوران r الذي مركزه النقطة O وزاويته $\frac{-\pi}{6}$.

ب*/ احسب مساحة الدائرة (γ) التي قطرها $[BB']$. (مقـدرة بوحدة المساحة)

ج*/ عين مجموعة النقط $M(z)$ من المستوي حيث: $\arg\left[(z - z_B)^2\right] = \arg(z_B) - \arg(z_{B'})$

د*/ عين z_C لاحقة النقطة C حتى يكون الرباعي $AB'BC$ مستطيل، ثم اوجد z_I لاحقة مركز ثقله.

4) نضـــع: $f = ros$ (يرمز o إلى تركيب التحويلين S و r) .

أ*/عين العبارة المركبة للتشابه المباشر S حيث يكون f تشابه مباشر مركزه O ونسبته 2 و زاويته $\frac{\pi}{3}$

ب*/ أوجد مساحة صورة الدائرة (γ) بالتشابه المباشر S (مقدرة بوحدة المساحة).

5) أ*/ إذا كان $S(M) = M'$ ، ما طبيعة المثلث OMM' ؟

ب*/عين مجموعة النقط M من المستوي التي يكون من أجلها : $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AM'} = 0$

التمرين الرابع: (07 نقــاط)

نعتبر الدالة العددية f للمتغير الحقيقي x المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x - e + \ln\left(1 + 2e^{-2(x-e)}\right)$

و (C_f) تمثيلها البياني في مستوي منسوب إلى معلم متعامد متجانس $\left(o,\vec{i},\vec{j}\right)$

1) أ*/ تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f(x) = -x + e + \ln\left(2 + e^{2(x-e)}\right)$

ب */ احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

ج*/ أدرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها .

2) أ*/ بين أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين (D) و (D') معادلتاهما:

$y = x - e$ و $y = -x + \ln 2 + e$ عند $+\infty$ و عند $-\infty$ على الترتيب.

ب*/ ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيمين المقاربين (D) و (D').

ج*/ بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $x=\frac{1}{2}\ln 2+e$ هو محور تناظر للمنحنى (C_f).

3) أرسم (Δ)، (D)، (D') و (C_f)

4) ليكن (D_m) المستقيم الذي معادلته : $y=mx-m\left(e+\frac{\ln 2}{2}\right)+\frac{\ln 2}{2}$ حيث m وسيط حقيقي.

أ*/ بين أن جميع المستقيمات (D_m) تشمل النقطة الثابتة $A\left(\frac{\ln 2}{2}+e\ ;\ \frac{\ln 2}{2}\right)$.

ب*/ ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد نقط تقاطع المستقيم (D_m) و المنحنى (C_f) .

5) نضع: $I=\int_{\ln\sqrt{2}+e}^{\ln\sqrt{3}+e}\left[f(x)-(x-e)\right]dx$ ، $I_n=\int_0^1 \ln\left(1+X^n\right)dX$ ، n عدد طبيعي غير معدوم

أ*/ فسر هندسيا العدد I و احسب العدد I_1.

ب*/ بين أن: $0\le I_n\le \ln 2$

ج*/ عين اتجـاه تغير المتتالية (I_n) ثم استنتج أنها متقاربة.

6) باستعمال : $\ln(1+X)\le X$ ، من أجل كل $X\in\left]0;+\infty\right[$

أ*/ استنتج أن : $0\le I+I_1\le \int_{\ln\sqrt{2}+e}^{\ln\sqrt{3}+e} 2e^{-2(x-e)}\,dx-1+\ln 4$

ب*/ اعط حصرا للعدد $I+I_1$.

انتهى

الموضوع الثاني

بالتوفيق في امتحان شهادة البكالوريا

الملحق:

الاسم :.....

اللقب : .....

القسم :.....



الملحق:

الاسم :.....

اللقب : .....

القسم : .....