

الإجابة النموذجية للاختبار التجريبي لشهادة التعليم المتوسط في مادة الرياضيات 2016\2017

العلامة الكاملة	العلامة الجزئية	عناصر الإجابة
03	0,5 0,25 0,25	<p>حل التمرين الأول:</p> <p>(1) تبيان أن $A = 8\sqrt{2} - 4$</p> $A = \sqrt{2}(3 + \sqrt{2}) + \sqrt{50} - 6$ $= 3\sqrt{2} + 2 + \sqrt{25 \times 2} - 6$ $= 3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} - 4$ $= 8\sqrt{2} - 4$
		<p>(2) كتابة النسبة B بمقام ناطق:</p> $B = \frac{4 - \sqrt{2}}{\sqrt{2}}$ $= \frac{(4 - \sqrt{2})\sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}}$ $= \frac{4\sqrt{2} - 2}{2}$
		<p>(3) تبيان أن $2B = \frac{1}{2}A$</p> $2B = 2 \left(\frac{4\sqrt{2} - 2}{2} \right) = 4\sqrt{2} - 2 \dots \dots (1)$ $\frac{1}{2}A = \frac{1}{2}(8\sqrt{2} - 4) = \frac{8\sqrt{2}}{2} - \frac{4}{2} = 4\sqrt{2} - 2 \dots \dots (2)$ <p>من (1) و (2) نجد المساواة $2B = \frac{1}{2}A$ محققة .</p>
	0,5 0,5	<p>حل التمرين الثاني:</p> <p>(1) نشر وتبسيط العبارة M:</p> $M = (2x - 3)^2 - 4 + 8(2x - 1)$ $= 4x^2 + 9 - 12x - 4 + 16x - 8$ $= 4x^2 + 4x - 3$
		<p>(2) تحليل العبارة $(2x - 3)^2 - 4$:</p> $(2x - 3)^2 - 4 = (2x - 3)^2 - 2^2$ $= (2x - 3 - 2)(2x - 3 + 2)$ $= (2x - 5)(2x - 1)$
		<p>استنتاج تحليل للعبارة M:</p> $M = (2x - 3)^2 - 4 + 8(2x - 1)$ $= (2x - 5)(2x - 1) + 8(2x - 1)$ $= (2x - 1)(2x - 5 + 8)$ $= (2x - 1)(2x + 3)$
	0,5	<p>0,5</p>
		<p>0,5</p>

(3) حل المعادلة M=0:

معناه : $2x+3=0$ و منه $2x=-3$ إذن : $x=-\frac{3}{2}$

أو : $2x-1=0$ و منه $2x=1$ إذن : $x=\frac{1}{2}$

للمعادلة حلان هما $-\frac{3}{2}$ و $\frac{1}{2}$.

حل التمرين الثالث:

(1) - حساب الطول AC:

لدينا المثلث ABC قائم في B ، حسب نظرية فيثاغورس نجد:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$AC^2 = 60^2 + 45^2$$

$$AC^2 = 5625$$

$$AC = \sqrt{5625}$$

$$AC = 75$$

الطول AC يساوي 75 cm

- حساب الطول AF:

لدينا في المثلث ABC : $(BC) \parallel (GF)$ لأنهما عموديان على نفس المستقيم (AB) حسب نظرية طالس نجد :

$$AF = \frac{75 \times 15}{45} \quad \text{و منه:} \quad \frac{AF}{75} = \frac{15}{45} \quad \text{بالتعويض} \quad \frac{AF}{AC} = \frac{AG}{AB} = \frac{FG}{BC}$$

$$AF = 25 \text{ cm} \quad \text{إذن :}$$


(2) اثبات أن $(BC) \parallel (AE)$:

$$\frac{FA}{FC} = \frac{25}{75-25} = \frac{25}{50} = \frac{1}{2} \quad \text{و} \quad \frac{FE}{FB} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \quad \text{لدينا:}$$

بما أن $\frac{FE}{FB} = \frac{FA}{FC}$ و النقط A ، F ، C ، بنفس ترتيب النقط E ، F ، B فإن النظرية العكسية لنظرية طالس. $(BC) \parallel (AE)$ حسب

حل التمرين الرابع:

(1) تعليم النقط A(0;3) ، B(3;3) ، C(2;-1) ، D(-1;-1).



01

01

03

01

01

0,5

(2) برهان أن الرباعي ABCD متوازي أضلاع:
لكي يكون الرباعي ABCD متوازي أضلاع يجب أن يكون فيه شعاعين متساويين،
نختار $\overline{AB} = \overline{DC}$ و نتحقق من المساواة بالحسابات:

01

$$\overline{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}, \quad \overline{AB} \begin{pmatrix} 3-0 \\ 3-3 \end{pmatrix}, \quad \overline{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\overline{DC} \begin{pmatrix} x_D - x_C \\ y_D - y_C \end{pmatrix}, \quad \overline{DC} \begin{pmatrix} 2-(-1) \\ -1-(-1) \end{pmatrix}, \quad \overline{DC} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

إذن الرباعي ABCD متوازي أضلاع

(3) حساب إحداثياتي E مركز تناظر الرباعي:
معناه E منتصف احد القطرين وليكن [AC]:

03

0,5

$$E \left(\frac{x_A + x_C}{2}; \frac{y_A + y_C}{2} \right)$$

$$E \left(\frac{0+2}{2}; \frac{3+(-1)}{2} \right)$$

$$E(1;1)$$

(4) تعليم النقطة M بحيث $\overline{AM} = \overline{AD} + \overline{DB} - \overline{CA}$

$$\overline{AM} = \overline{AD} + \overline{DB} - \overline{CA}$$

$$\overline{AM} = \overline{AB} + \overline{AC}$$

باستخدام العلاقة: $\overline{AM} = \overline{AB} + \overline{AC}$ (قاعدة متوازي الأضلاع)
ننشئ النقطة M على المعلم و نجد بقراءة بيانية نجد $M(5; -1)$

01

حل المسألة:

الجزء الأول:

(1) إيجاد قيس الزاوية التي يشكلها جدارين متتاليين أي \widehat{ABC} :

أولا نجد قيس الزاوية المركزية \widehat{AOB}

$$\widehat{ABO} = \frac{180-72}{2} = 54 \quad \text{ومنه} \quad \widehat{AOB} = \frac{360}{5} = 72$$

$$\widehat{ABC} = \widehat{ABO} \times 2 = 54 \times 2 = 108^\circ \quad \text{ومنه}$$

إذن قيس الزاوية التي يشكلها كل جدارين متتاليين هي 108°

(2) إيجاد مساحة القطعة الأرضية:

معناه إيجاد S_t مساحة الخماسي:

02

$$S_t = S_{ABC} \times 5$$

$$S_{ABC} = \frac{AB \times OS}{2}$$

$$AB = 2SB$$

$$\tan ABO = \frac{OS}{SB}$$

حيث:

$$SB = \frac{OS}{\tan 54} = \frac{10}{\tan 54} \approx 7,3$$

ومنه : $AB = 2 \times 7,3 \approx 14,6 \text{ cm}$

$$S_{ABC} = \frac{AB \times SO}{2} = \frac{14,6 \times 10}{2} = 73 \text{ m}^2 \text{ : نجد}$$

$$S_t = S_{ABC} \times 5 = 73 \times 5 = 365 \text{ m}^2 \text{ إذن}$$

مساحة القطعة الأرضية هي 365 m^2

الجزء الثاني:

نفرض عدد الكتب الأدبية هو x

و عدد الكتب العلمية هو y

فيكون :

$$\begin{cases} 2(x + y) = 500 \\ x - y = 90 \end{cases}$$

ومنه

$$\begin{cases} x + y = 250 \dots (1) \\ x - y = 90 \dots (2) \end{cases}$$

02

بجمع (1) و (2) طرفا لطرف نجد:

$$2x = 340 \text{ و منه } x = 170$$

بتعويض قيمة x في المعادلة (2) نجد

$$y = 80 \text{ و منه } 170 - y = 90$$

إذن: عدد الكتب الأدبية هو: 170 كتاب

و عدد الكتب العلمية هو: 80 كتاب

الجزء الثالث:

(1) إتمام الجدول:

عدد الكتب المعارة خلال السنة	10	30	40
الثمن بـ DA	150	450	600
الثمن بـ DA	350	450	500

(2) التعبير بدلالة x عن كل من $f(x)$ و $h(x)$:

$$f(x) = 15x \text{ دالة خطية}$$

$$g(x) = 5x + 300 \text{ دالة تآلفية}$$

03

(3) تمثيل الدالتين f و g بيانيا:


x	0	30
$g(x)$	300	450

x	0	30
$f(x)$	0	450

بالنسبة للدالة f نعلم النقطتين: $(0;0)$ ، $(30;450)$

و بالنسبة للدالة g نعلم النقطتين: $(0;300)$ ، $(30;450)$

ثمن الإعارة (DA)



• تحديد الصيغة الأكثر فائدة للقارئ بيانياً:

لما يكون عدد الكتب المعارة:

$0 < x < 30$: على القارئ اختيار الصيغة الأولى لأن تمثيلها البياني يقع أسفل التمثيل البياني للصيغة الثانية و بالتالي يكون أقل تكلفة.

$x > 30$: على القارئ اختيار الصيغة الثانية لأن تمثيلها البياني يقع أسفل التمثيل البياني للصيغة الأولى و بالتالي يكون أقل تكلفة.

و لهذا يمكن القول أن التكلفة الجيدة مرتبطة بعدد الكتب المراد استعارتها

شبكة تصحيح المسألة

السؤال	المعيار	المؤشرات	سلم التنقيط	العلامة الجزئية	العلامة النهائية
الجزء الأول	1م	<ul style="list-style-type: none"> توظيف عملية القسمة لحساب الزاوية المركزية. توظيف عملية الجمع لحساب الزاوية \widehat{ABC}. توظيف نسبة مثلثية لحساب AB. توظيف قانون حساب مساحة مثلث. توظيف عملية الضرب لحساب مساحة الأرضية. 	0.25 إن وُفق في مؤشر واحد. 0.5 إن وُفق في مؤشرين. 01 إن وُفق في ثلاث مؤشرات على الأقل.	1	02
	2م	<ul style="list-style-type: none"> قيس الزاوية المركزية صحيح. قيس الزاوية \widehat{AB} صحيح وفق القيم المحسوبة. الطول AB صحيح وفق القيم المحسوبة. مساحة المثلث AOB صحيحة وفق القيم المحسوبة. مساحة الخماسي صحيحة وفق القيم المحسوبة. 	0.25 إن وُفق في مؤشر واحد. 0.5 إن وُفق في مؤشرين. 01 إن وُفق في ثلاث مؤشرات على الأقل.	1	
الجزء الثاني	1م	<ul style="list-style-type: none"> ترميز عددي الصنفين بحرفين . وضع جملة معادلتين توظيف احدي طريقتي حل جملة. 	0.5 إن وُفق في مؤشر واحد 01 إن وُفق في مؤشرين على الأقل	01	02
	2م	<ul style="list-style-type: none"> الجملة المعبرة عن المجهولين صحيحة. حل الجملة صحيح وفق القيم المختارة. 	0.5 إن وُفق في مؤشر واحد 01 إن وُفق في مؤشرين	01	
الجزء الثالث	1م	<ul style="list-style-type: none"> توظيف العمليات الأربع في اتمام الجدول. التعبير عن الصيغتين بعبارتين حرفيتين انشاء مستقيمين ممثلين للدالتين تحديد مجالين يبينان افضلية كل صيغة. 	0.5 إن وُفق في مؤشر واحد. 01 إن وُفق في مؤشرين. 1,5 إن وُفق في ثلاث مؤشرات على الأقل.	01,5	03
	2م	<ul style="list-style-type: none"> قيم الجدول صحيحة. عبارتي الدالتين الخطية و التآلفية صحيحتين. التمثيل البياني للدالتين صحيح. تحديد الصيغة المناسبة صحيح وفق مجالين. 	0.5 إن وُفق في مؤشر واحد. 01 إن وُفق في مؤشرين. 1,5 إن وُفق في ثلاث مؤشرات على الأقل.	01,5	
كل المسألة	3م	<ul style="list-style-type: none"> تسلسل خطوات الحل منطقي وحدة القياس محترمة التصريح بالإجابة 	0,25 إن وُفق في مؤشر واحد 0,5 إن وُفق في مؤشرين على الأقل	0,5	01
	4م	<ul style="list-style-type: none"> الكتابة مقروءة لا يوجد تشطيبات تأطير النتائج 	0,25 إن وُفق في مؤشر واحد 0,5 إن وُفق في مؤشرين على الأقل	0,5	

المعايير:

- 1م : التفسير السليم للوضعية
- 2م : الإستعمال السليم للأدوات
- 3م : الانسجام
- 4م : الإتقان