



دورة: 2019

المدة: 04 سا و 30 د

اختبار في مادة: الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:
الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على (03) صفحات (من الصفحة 1 من 5 إلى الصفحة 3 من 5)

التمرين الأول: (04 نقاط)

(1) حل المعادلة $505x - 673y = 1 \dots\dots (E)$ ذات المجهول $(x; y)$ حيث x و y عداد صحيحان.

(لاحظ أنّ: $2020 = 4 \times 505$ و $2019 = 3 \times 673$)

(2) بين أنّه من أجل كل شائبة $(x; y)$ حل للمعادلة (E) فإنّ x و y من نفس الإشارة.

(3) نعتبر المتتاليتين (u_n) و (v_n) المعرفتين على \mathbb{N} بـ:

$$\begin{cases} v_0 = 4 \\ v_{n+1} = v_n + 673 \end{cases} \quad \text{و} \quad \begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = u_n + 505 \end{cases}$$

- اكتب u_α بدلالة α ثم اكتب v_β بدلالة β حيث α و β عداد طبيعيان.

(4) أ) عين الحدود المشتركة للمتتاليتين (u_n) و (v_n) ثم بين أنّ هذه الحدود المشتركة تشكّل متتالية حسابية (w_n) .
يطلب تعين أساسها وحدتها الأولى.

ب) نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $X_n = \frac{1}{505}(w_n - 2023)$

احسب بدلالة n الجداء $p = X_1 \cdot X_2 \cdots \cdot X_n$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، نعتبر النقط $A(1; 0; -1)$ ، $B(1; -2; 0)$ و $C(1; 2; 3)$.
(1) بين أنّ المثلث ABC قائم في A .

(2) اكتب معادلة للمستوى (Q) الذي يشمل A و \overrightarrow{AC} شعاع ناظمي له.

(3) وسيط حقيقي و (P_m) مستوى حيث: $m - 1)x + 2y - z - m = 0$ معادلة له.

أ) أثبت أنّه عندما يتغير m في \mathbb{R} فإنّ المستوى (P_m) يحوي مستقيما ثابتا (Δ) .
يطلب تعين تمثيل وسيطي له.
- تحقق أنّ A و C نقطتان من المستقيم (Δ) .

ب) تحقق أنّه مهما كان m من \mathbb{R} فإنّ المستوى (P_m) يعمد المستوى (Q) .



(4) لتكن $d(m)$ المسافة بين النقطة B و المستوي (P_m) .

أ) أثبت أن: $d(m) = \frac{5}{\sqrt{m^2 - 2m + 6}}$ ثم عين قيمة m التي تكون من أجلها $d(m)$ أعظمية واحسبها.

ب) استنتج أنه إذا كانت $d(m)$ أعظمية فإن النقطة A هي المسقط العمودي للنقطة B على (P_m) .

التمرين الثالث: (05 نقاط)

في المستوى المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ نعتبر النقط A, B, C و D

حيث: $z_E = 1 + i\sqrt{2}$ ، $z_D = \overline{z_B}$ ، $z_C = \overline{z_A}$ ، $z_B = i$ و $z_A = 1 + i\sqrt{2}$

(1) حل في المجموعة \mathbb{C} المعادلة ذات المجهول z : $(z^2 + 1)(z^2 - 2z + 3) = 0$

(2) أ) احسب كلاً من $|z_C - z_E|$ ، $|z_B - 1|$ و $|z_A - 1|$ ثم تحقق أن النقط الأربع A, B, C و D تتبع إلى نفس الدائرة التي يطلب تعين مركزها و طول نصف قطرها.

ب) بين أن: $(z_E - z_B - z_E)^2 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)(z_A - z_E)$ ثم استنتج أن B هي صورة A بتحويل نقطي يطلب تعين عناصره المميزة.

- ما طبيعة المثلث ABE ؟

(3) عين لحقتي الشعاعين \overrightarrow{BD} و \overrightarrow{AE} محدداً طبيعة الرباعي $.ABDE$.

(4) $\overrightarrow{w_1}$ و $\overrightarrow{w_2}$ شعاعان من المستوى لحقتا هما على الترتيب z_1 و z_2 .

أ) برهن أن: $(\overrightarrow{w_1} \text{ و } \overrightarrow{w_2} \text{ متعامدان}) \Leftrightarrow (z_1 \cdot \overline{z_2} + \overline{z_1} \cdot z_2 = 0)$.

ب) عين مجموعة النقط M من المستوى ذات اللاحقة z حيث: $(z - z_A)(\bar{z} - z_D) + (z - z_B)(\bar{z} - z_C) = 0$

التمرين الرابع: (07 نقاط)

f الدالة المعرفة على $[0; +\infty)$ بـ: $\begin{cases} f(x) = x - x^2 \ln x & , x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$

(1) برهن أن: C_f منحناها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. الوحدة 3 cm

إذا كان: $x > 1$ فإن: $1 - x - 2x \ln x < 0$ -

إذا كان: $0 < x < 1$ فإن: $1 - x - 2x \ln x > 0$ -

(2) أ) أثبت أن الدالة f قابلة للاشتقاق عند 0 من اليمين ثم اكتب معادلة لنصف المماس (Δ) للمنحنى (C_f) عند مبدأ المعلم.

ب) ادرس الوضع النسبي لـ (Δ) و (C_f) .

(3) أ) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .



(4) أ) اكتب معادلة (T) مماس المنحنى (C_f) الموازي لـ (Δ) .

ب) أثبت أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل في المجال $[1; +\infty]$ حلاً وحيداً α ثم تحقق أن: $1,76 < \alpha < 1,77$.

ج) اكتب معادلة للمستقيم (d) الذي يوازي (Δ) ويشمل النقطة ذات الإحداثيين $(\alpha; 0)$.

- ارسم كلا من (T) ، (Δ) و (d) ثم المنحنى (C_f) على المجال $[0; \alpha]$.

(5) m وسيط حقيقي، ناقش بيانياً حسب قيم m عدد حلول المعادلة: $x^2 \ln x + m = 0$ في المجال $[0; \alpha]$.

$$A(\lambda) = \int_{\lambda}^1 -x^2 \ln x dx \quad (6)$$

أ) باستعمال المتكاملة بالتجزئة احسب $A(\lambda)$ بدلالة λ .

ب) احسب $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} A(\lambda)$ ثم فسر النتيجة هندسياً.

انتهى الموضوع الأول




الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على صفحتين (02) (من الصفحة 4 من 5 إلى الصفحة 5 من 5)

التمرين الأول: (04 نقاط)

صندوقان غير شفافين U_1 و U_2 ، يحتوي الصندوق U_1 على 4 كريات حمراء و 3 كريات سوداء ويحتوي الصندوق U_2 على 3 كريات حمراء و كريتين سوداويين (الكريات كلها متشابهة لا نفرق بينها عند اللمس)



(2) أحسب احتمالات الأحداث A ، B و C .

نعتبر X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب عدد الكريات الحمراء المسحوبة.

(3) أ) عين قيم المتغير العشوائي X .

ب) عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X .

(4) أحسب الأمل الرياضي $E(X)$.

التمرين الثاني: (04 نقاط)

(u_n) متالية عددية حدودها موجبة معرفة بحدتها الأولى $u_1 = 0$ حيث $u_1 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي غير معروف n ،

$$u_{n+1} = u_n + 2\sqrt{u_n} + 1$$

(1)أ) تحقق أنه: من أجل كل عدد طبيعي غير معروف n ، $\sqrt{u_{n+1}} - \sqrt{u_n} = 1$

ب) استنتج كتابة الحد العام u_n بدلالة n

(2) تتحقق أنه: من أجل كل عدد طبيعي غير معروف n ، $u_n = n(n-2)+1$

(3) عين قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها: $2-n$ يقسم 5 .

(4)أ) من أجل كل عدد طبيعي n حيث $n \geq 2$ ، بين أنه: $PGCD(n-2; u_n) = 1$

ب) عين قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها $(n-5)u_n$ يقسم $(n^2+1)(n-2)$.

التمرين الثالث: (05 نقاط)

(1) نضع من أجل كل عدد مركب z ، $P(z) = z^4 - 6z^3 + 29z^2 - 24z + 100$

أ) بين أنه من أجل كل عدد مركب z ، $\overline{P(z)} = P(\bar{z})$ ، ثم استنتج أنه إذا كان z حلل لمعادلة $0 = P(z)$ فإن \bar{z} حل لها.

ب) حل في مجموعة الأعداد المركبة \mathbb{C} المعادلة $0 = P(z)$ علما أنها تقبل حللا تخيليا صرفا.



- 2) نعتبر في المستوى المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ، النقط A, B, M و M' التي لاحقاتها على الترتيب: $z = \frac{-i z + 4 + 3i}{z - 2i}$ حيث: $z \neq 2i$.
- ولتكن I مرجح الجملة $\{(A; -2), (B; 2), (A; 1)\}$ و J مرجح الجملة $\{(1), (B; 1), (B; 2)\}$ عين اللاحقتين z_I و z_J للنقطتين I و J على الترتيب.
- ب) لتكن (E) مجموعة النقط (z) M التي يكون من أجلها $|z| = 2$.
- بين أن النقطة M من (E) يكافيء $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{JM} = 0$ ، ثم عين (E) وأنشئها.
- ج) لتكن (Γ) مجموعة النقط (z) M التي يكون من أجلها $\arg(z') = 2k\pi$ حيث k عدد صحيح.
- تحقق أن النقطة D ذات اللاحقة i تتنمي إلى (Γ) ، ثم عين وأنشئ (Γ) .
- 3) عين الشكل الجيري للاحقة النقطة G تقاطع المجموعتين (E) و (Γ) .

التمرين الرابع: (07 نقاط)

- I) الدالة العددية المعرفة على \mathbb{R} هي: $f_k(x) = (x+1)^2 e^{-kx}$ حيث k وسيط حقيقي.
- ليكن (\mathcal{C}_k) التمثيل البياني للدالة f_k في المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}; \vec{i}, \vec{j})$.
- 1) بين أن كل المنحنيات (\mathcal{C}_k) تمر من نقطتين ثابتتين يطلب تعبينهما.
- 2) احسب نهايتي الدالة f_k عند $-\infty$ و عند $+\infty$. (ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي k).
- 3) أ) احسب (f'_k) ، ثم حدد حسب قيم الوسيط الحقيقي k اتجاه تغير الدالة f_k .
- ب) شكل جدول تغيرات الدالة f_k من أجل k عدد حقيقي موجب تماما.
- 4) نقاش حسب قيم الوسيط الحقيقي k الأوضاع النسبية للمنحنيين (\mathcal{C}_k) و (\mathcal{C}_{k+1}) .
- II) الدالة المعرفة على \mathbb{R} هي: $f(x) = (x+1)^2 e^{-2x}$
- نسمى (\mathcal{C}_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}; \vec{i}, \vec{j})$.
- 1) شكل جدول تغيرات الدالة f ، ثم أرسم المنحنى (\mathcal{C}_f) على المجال $\left[-\frac{3}{2}; +\infty\right]$.
- 2) أ) بين أن المعادلة $1 = f(x)$ تقبل حلّين في \mathbb{R} أحدهما α حيث: $-1,27 < \alpha < -1,28$.
- ب) عين قيم العدد الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $\left|\frac{x+1}{e^x}\right| = \left|\frac{m+1}{e^m}\right|$ حلّاً وحيدا.
- 3) g الدالة المعرفة على \mathbb{R} هي: $g(x) = (x+1)e^{-2x}$

أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن: $g'(x) + 2g(x) - e^{-2x} = 0$ ثم استنتج دالة أصلية لـ g على \mathbb{R} .

ب) باستعمال المتكاملة بالتجزئة، احسب مساحة الحيز المستوى المحدد بالمنحنى (\mathcal{C}_f) ومحور الفواصل

وال المستقيمين اللذين معادلاتها $x = 0$ و $x = -1$.