


الإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: الرياضيات / الشعب(ة): رياضيات / بكالوريا 2020

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)								
مجموعة	مجزأة									
<b>التمرين الأول: (04 نقاط)</b>										
0.75	2×0.25 0.25	(1) أ. لدينا: $f'(x) = \frac{40}{(9-x)^2}$ ومنه $f$ متزايدة تمامًا على $[1;4]$ . ب. من أجل: $x \in [1;4]$ يكون $f(x) \in [f(1); f(4)]$								
1.25	2×0.25 2×0.25 0.25	(2) أ. البرهان بالتراجع. ب. لدينا: $u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n - 1)(u_n - 4)}{9 - u_n}$ ونجد أن $(u_n)$ متناقصة تمامًا. الاستنتاج: $(u_n)$ متناقصة تمامًا و محدودة من الأسفل فهي متقاربة.								
1.25	2×0.25 2×0.25 0.25	(3) أ. لدينا: $v_{n+1} = \frac{5}{8}v_n$ ومنه $(v_n)$ هندسية أساسها $\frac{5}{8}$ و $v_0 = -\frac{1}{2}$ . ب. عبارة $v_n$ و عبارة $u_n$ : $v_n = \frac{-1}{2}\left(\frac{5}{8}\right)^n$ ، $u_n = \frac{4\left(\frac{5}{8}\right)^{n+2}}{\left(\frac{5}{8}\right)^{n+2}}$ حساب: $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$								
0.75	0.75	(4). نجد: $S_n = \frac{-1}{8}(5^{n+1} - 1)$								
<b>التمرين الثاني: (04 نقاط)</b>										
1.25	0.25x5	(1) شجرة الاحتمالات: 								
0.5	0.5	(2) احتمال أن يوجد في الصندوق 7 كريات بيضاء: $\frac{3}{8} \times \frac{3}{9} = \frac{1}{8}$								
0.75	0.75	(3) احتمال أن يوجد في الصندوق 4 كريات حمراء على الأقل: $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$								
1.50	0.5 0.75 0.25	(4) أ. تبرير أن قيم المتغير العشوائي $X$ هي: 5، 6 و 7 ب. تعريف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي. $E(X) = \frac{52}{9}$ <table border="1" style="display: inline-table; margin: 10px;"> <tr> <td><math>x_i</math></td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td><math>P(X=x_i)</math></td> <td><math>\frac{25}{72}</math></td> <td><math>\frac{38}{72}</math></td> <td><math>\frac{9}{72}</math></td> </tr> </table>	$x_i$	5	6	7	$P(X=x_i)$	$\frac{25}{72}$	$\frac{38}{72}$	$\frac{9}{72}$
$x_i$	5	6	7							
$P(X=x_i)$	$\frac{25}{72}$	$\frac{38}{72}$	$\frac{9}{72}$							
<b>التمرين الثالث: (05 نقاط)</b>										
0.75	0.75	(1) لدينا: $3a - 2b = 1$ ، إذن حسب بيزو $a$ و $b$ أوليان فيما بينهما								
1.5	0.75 0.75	(2) لدينا: $(\alpha a$ و $\alpha c$ ) ومنه: $\alpha (4c-3a)$ أي $\alpha 5$ $\alpha = 5$ معناه $(a \equiv 0[5]$ و $c \equiv 0[5])$ أي $n \equiv 1[5]$ ومنه $n = 5k + 1$ ، $k \in \mathbb{N}$								

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجزأة	
1.5	0.5	3) أ . إثبات أن $\alpha$ يقسم $\beta$ . لدينا $(\alpha c$ و $\alpha a)$ ومنه $(\alpha bc$ و $\alpha a)$ وبالتالي $\alpha pgcd(a, bc)$ أي $\alpha \beta$ ب. إثبات أن $\beta$ و $b$ أوليان فيما بينهما: نفرض أن $d$ قاسم مشترك لـ $\beta$ و $b$ $d b$ و $d \beta$ ومنه $(d a$ و $\alpha b)$ وبالتالي $d pgcd(a, b)$ أي: $d=1$
	0.5	ملاحظة: يمكن استعمال مبرهنة بيزو استنتاج أن: $\alpha = \beta$
	0.5	$(\beta bc$ و $\beta \wedge b=1)$ ومنه $(\beta c$ و $\beta a)$ وعليه $\beta \alpha$ $(\beta \alpha$ و $\alpha \beta)$ معناه $\alpha = \beta$
1.25	0.5	4) أ . لدينا : $A = (n-1)(4n+1)$ و $B = (n-1)bc$ إذن كلاً من $A$ و $B$ مضاعف لـ $(n-1)$ ب. لدينا $d = PGCD(A, B)$ ومنه $d = (n-1)PGCD(a, bc)$ ومنه $d = (n-1)\beta = (n-1)\alpha$ وعليه
	0.25x3	من أجل $\alpha=1$ : $d=n-1$ ، من أجل $\alpha=5$ : $d=5n-5$
التمرين الرابع : (07 نقاط)		
0.5	0.25x2	I) من أجل $x \in ]-\infty ; 0]$ و $h(x) \leq 0$ و $g(x) < 0$
1.25	0.5+0.25	II) 1) أ. من أجل كل $x$ من $]-\infty ; 0]$ : $f'(x) = x(e^x + 1) + (-2e^x) = h(x) + g(x)$
	0.5	ب. $f$ متناقصة تماماً على المجال $]-\infty ; 0]$ .
1	0.25x2 0.5	2) نجد: $f(0) = -3$ ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (xe^x - 3e^x + \frac{1}{2}x^2) = +\infty$ ، جدول التغيرات
1	0.75	3) $f$ مستمرة ومتناقصة تماماً على المجال $]-\infty ; 0]$ وتأخذ قيمها في $[-3; +\infty[$
	0.25	ومنه $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً $\alpha$ في $]-\infty ; 0]$ . التحقق أن $\alpha \in ]-1,5; -1,4[$ : $f(-1,5) \approx 0,121$ ، $f(-1,4) \approx -0,105$
1.75	0.5x2	4) أ . نجد: $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - \frac{1}{2}x^2) = 0$ ، إذن: $(P)$ منحنى مقارب لـ $(C_f)$ بجوار $-\infty$
	0.5+0.25	ب. من أجل كل $x$ من $]-\infty ; 0]$ : $f(x) - \frac{1}{2}x^2 = (x-3)e^x$ ومنه $f(x) - \frac{1}{2}x^2 < 0$ وبالتالي $(C_f)$ أسفل $(P)$ على المجال $]-\infty ; 0]$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجزأة	
0.75	0.25 0.5	 <p>ج. إنشاء <math>(P)</math> و <math>(C_f)</math> :</p>
0.75	$0.25 \times 3$	<p>5) المناقشة البيانية وحسب قيم <math>m</math> عدد حلول المعادلة: <math> f(x)  = e^m</math> في <math>]-\infty; 0]</math></p> <p>من أجل <math>m \leq \ln 3</math> المعادلة تقبل حلين مختلفين.</p> <p>من أجل <math>m &gt; \ln 3</math> المعادلة تقبل حل واحد</p>

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)																				
مجموعة	مجزأة																					
<b>التمرين الأول: (04 نقاط)</b>																						
1	1	(1) $(x; y) = (5k - 1; 3k - 1)$ حيث $k \in \mathbb{Z}$																				
1	0.5	(2) أ) بواقي القسمة الاقليدية للعدد $9^n$ على 7 ( $k \in \mathbb{N}$ ) ب) بواقي القسمة الاقليدية للعدد $4^n$ على 11 ( $k' \in \mathbb{N}$ )																				
	0.5																					
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td><math>n</math></td> <td><math>3k</math></td> <td><math>3k+1</math></td> <td><math>3k+2</math></td> </tr> <tr> <td>باقي القسمة</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td><math>n</math></td> <td><math>5k'</math></td> <td><math>5k'+1</math></td> <td><math>5k'+2</math></td> <td><math>5k'+3</math></td> <td><math>5k'+4</math></td> </tr> <tr> <td>باقي القسمة</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>9</td> <td>3</td> </tr> </table>	$n$	$3k$	$3k+1$	$3k+2$	باقي القسمة	1	2	4	$n$	$5k'$	$5k'+1$	$5k'+2$	$5k'+3$	$5k'+4$	باقي القسمة	1	4	5	9	3
$n$	$3k$	$3k+1$	$3k+2$																			
باقي القسمة	1	2	4																			
$n$	$5k'$	$5k'+1$	$5k'+2$	$5k'+3$	$5k'+4$																	
باقي القسمة	1	4	5	9	3																	
1	0.25×3 0.25	(3) بما أن 7 و 11 أوليان فيما بينهما فإن: $\begin{cases} 9^n \equiv 1[7] \\ 4^n \equiv 5[7] \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} 11 \times 9^n - 4 \equiv 0[7] \\ 14 \times 4^n - 4 \equiv 0[11] \end{cases} \text{ يعني } \begin{cases} 14 \times 4^n + 11 \times 9^n - 4 \equiv 0[7] \\ 14 \times 4^n + 11 \times 9^n - 4 \equiv 0[11] \end{cases}$ أى: $n = 3\alpha = 5\beta + 2$ ومنه $3\alpha - 5\beta = 2$ ( $\alpha, \beta$ عدنان طبيعيان) $n = 15p - 3$ ومنه $(\alpha; \beta) = (5p - 1; 3p - 1)$ حيث ( $p \in \mathbb{N}^*$ )																				
1	0.5	(4) أ. $S_n = 4(4^{15n-1}) + \frac{9}{2}(9^{15n-1})$ . ب. إثبات أن $S_n$ مضاعف للعدد 77.																				
	0.5	أي $2S_n \equiv 0[77]$ يعني $S_n \equiv 0[77]$ أي $8(4^{15n-1}) + 9(9^{15n-1}) \equiv 0[77]$ أي $8(4^{15n-1}) + 9(9^{15n-1}) \equiv 0[11]$ أي $\begin{cases} (1)^{5n} - 1 \equiv 0[7] \\ (1)^{3n} - 1 \equiv 0[11] \end{cases}$ محققة دوما أي $\begin{cases} (4^3)^{5n} - 1 \equiv 0[7] \\ (9^5)^{3n} - 1 \equiv 0[11] \end{cases}$ أي $\begin{cases} 4^{15n} - 1 \equiv 0[7] \\ 9^{15n} - 1 \equiv 0[11] \end{cases}$																				
<b>التمرين الثاني: (04 نقاط)</b>																						
1.5	0.5×2	(1) أ. $P(B) = \frac{n^2 - n + 2}{n^2 - n + 14}$ ، $P(A) = \frac{n^2 - n + 14}{(n+5)(n+6)}$ .																				
	0.5	ب. $P(A) = \frac{17}{55}$ يعني $n = 5$ .																				
1	0.5 0.5	(2) أ. بعد الحساب نجد قيم المتغير العشوائي $X$ ، $-\frac{1}{2}$ ، $0$ ، $\frac{1}{4}$ ، $1$ . ب. $P(X=0) = \frac{C_3^1 \times C_8^1 + C_3^2}{C_{11}^2} = \frac{27}{55}$ .																				

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)										
مجموعة	مجزأة											
1.5	1	<p>ج. قانون احتمال <math>X</math></p> <table border="1"> <tr> <td><math>x_i</math></td> <td><math>\frac{-1}{2}</math></td> <td>0</td> <td><math>\frac{1}{4}</math></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><math>p(X=x_i)</math></td> <td><math>\frac{12}{55}</math></td> <td><math>\frac{27}{55}</math></td> <td><math>\frac{1}{55}</math></td> <td><math>\frac{15}{55}</math></td> </tr> </table>	$x_i$	$\frac{-1}{2}$	0	$\frac{1}{4}$	1	$p(X=x_i)$	$\frac{12}{55}$	$\frac{27}{55}$	$\frac{1}{55}$	$\frac{15}{55}$
	$x_i$	$\frac{-1}{2}$	0	$\frac{1}{4}$	1							
$p(X=x_i)$	$\frac{12}{55}$	$\frac{27}{55}$	$\frac{1}{55}$	$\frac{15}{55}$								
	0.5	<p><math>E(X) = \frac{37}{220}</math></p>										
<b>التمرين الثالث: (05 نقاط)</b>												
2	2×0.25	<p>(1) أ. <math>w_1 = 4(6\alpha - 1)</math> ، <math>w_0 = 4</math></p>										
	0.5	<p>ب. <math>w_{n+1} = (6\alpha - 1)w_n</math> متتالية هندسية أساسها <math>(6\alpha - 1)</math>.</p>										
	0.5	<p>ج. <math>w_n = 4(6\alpha - 1)^n</math></p>										
	0.5	<p><math>\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = 0</math> يعني <math>-1 &lt; 6\alpha - 1 \leq 1</math> ومنه <math>0 &lt; \alpha \leq \frac{1}{3}</math></p>										
1.75	0.5	<p>(2) أ. <math>u_{n+1} - u_n = -(3\alpha - 1)w_n</math> ومنه المتتالية <math>(u_n)</math> متزايدة تمامًا .</p>										
	0.5	<p>ب. <math>v_{n+1} - v_n = (3\alpha - 1)w_n</math> ومنه المتتالية <math>(v_n)</math> متناقصة تمامًا.</p>										
	0.5	<p>ب. بما أن المتتالية <math>(u_n)</math> متزايدة تمامًا و المتتالية <math>(v_n)</math> متناقصة تمامًا و <math>\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0</math> فإنهما متجاورتان وبالتالي متقاربتان نحو نفس النهاية <math>l</math>.</p>										
	0.25	<p>(3) لدينا <math>u_{n+1} - u_n = -(3\alpha - 1)w_n</math> و <math>v_{n+1} - v_n = (3\alpha - 1)w_n</math> إذا <math>u_{n+1} + v_{n+1} = u_n + v_n = u_0 + v_0 = 2</math> استنتاج قيمة <math>l</math>: <math>\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = 2</math> ومنه <math>l = 1</math></p>										
0.75	0.5	<p>(4) نجد: <math>S = 2021 - \frac{(6\alpha - 1)^{2021} - 1}{3\alpha - 1}</math></p>										
	0.25											
<b>التمرين الرابع: (07 نقاط)</b>												
1.75	2×0.25	<p>(1) أ. <math>\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty</math> (مع التبرير)</p>										
	0.25	<p>اثبات أن: <math>\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty</math></p>										
	0.5	<p>ب. من أجل كل <math>x</math> من <math>\mathbb{R}</math>: <math>f'(x) = \frac{3}{\sqrt{9x^2 + 1}}</math></p>										
	0.25	<p>ج. من أجل كل <math>x</math> من <math>\mathbb{R}</math>: <math>f'(x) &gt; 0</math>، إذن <math>f</math> متزايدة تمامًا على <math>\mathbb{R}</math>. جدول تغيّرات الدالة <math>f</math>.</p>										
1	0.5	<p>(2) أ. تبيان أن <math>\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty</math></p>										
	0.5	<p>ب. تبيان أن من أجل كل <math>x \geq 0</math>: <math>g'(x) = \frac{-9x^2 + 8}{(\sqrt{9x^2 + 1})(3 + \sqrt{9x^2 + 1})}</math></p>										

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)								
مجموعة	مجزأة									
0.75	0.25	<p>ج. إشارة <math>g'(x)</math> هي من إشارة <math>(-9x^2 + 8)</math>.</p> <table border="1"> <tr> <td><math>x</math></td> <td>0</td> <td><math>\frac{2\sqrt{2}}{3}</math></td> <td><math>+\infty</math></td> </tr> <tr> <td><math>g'(x)</math></td> <td>+</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> </table>	$x$	0	$\frac{2\sqrt{2}}{3}$	$+\infty$	$g'(x)$	+	0	-
	$x$	0	$\frac{2\sqrt{2}}{3}$	$+\infty$						
	$g'(x)$	+	0	-						
0.25	0.25	<p><math>g</math> متزايدة تماماً على <math>\left[0; \frac{2\sqrt{2}}{3}\right]</math> و متناقصة تماماً على المجال <math>\left[\frac{2\sqrt{2}}{3}; +\infty\right[</math></p>								
	0.25	<p>جدول تغيرات الدالة <math>g</math></p>								
1.5	0.5	<p>3 أ. <math>g</math> مستمرة ورتيبة تماماً على <math>\left[\frac{2\sqrt{2}}{3}; +\infty\right[</math> وتأخذ قيمها في المجال <math>\left]-\infty; g\left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)\right]</math></p>								
	0.25	<p>. التتحقق من أن <math>2,83 &lt; \alpha &lt; 2,84</math> : <math>g(0.84) \approx -0.005</math> و <math>g(0.83) \approx 0.001</math></p>								
	0.25	<table border="1"> <tr> <td><math>x</math></td> <td>0</td> <td><math>\alpha</math></td> <td><math>+\infty</math></td> </tr> <tr> <td><math>g(x)</math></td> <td>0</td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>ب. استنتاج إشارة <math>g(x)</math> :  ج. الوضع النسبي : <math>(C_f)</math> فوق <math>(\Delta)</math> على المجال <math>]0; \alpha[</math></p>	$x$	0	$\alpha$	$+\infty$	$g(x)$	0	+	-
$x$	0	$\alpha$	$+\infty$							
$g(x)$	0	+	-							
	0.5	<p><math>(C_f)</math> تحت <math>(\Delta)</math> على المجال <math>]\alpha; +\infty[</math>  <math>(C_f)</math> و <math>(\Delta)</math> متقاطعان في نقطتين فاصلتاها <math>0</math> و <math>\alpha</math></p>								
0.75	0.25	<p>4 أ. لدينا <math>k(x) = \ln 6 + \ln x</math> إذن <math>(\gamma)</math> هو صورة المنحني الممثل للدالة <math>x \mapsto \ln x</math> بالانسحاب الذي شعاعه <math>\vec{u}(0; \ln 6)</math>.</p>								
	2×0.25	<p>ب. <math>\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - k(x)) = 0</math>. نستنتج أن <math>(\gamma)</math> منحنى مقارب لـ <math>(C_f)</math> بجوار <math>+\infty</math>.</p>								
1.25	0.25	<p>5 أ. إثبات أن الدالة <math>f</math> فردية.</p>								
	3×0.25	<p>ب. رسم كل من <math>(\gamma)</math>، على المجال <math>]0; +\infty[</math> و رسم <math>(C_f)</math> و <math>(\Delta)</math> على المجال <math>]0; +\infty[</math>.</p>								
	0.25	<p>استنتاج الرسم للمنحني <math>(C_f)</math> على <math>\mathbb{R}</math>.</p>								