

الف هذا الكتاب استجابة لتجهات برنامج الرياضيات للسنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، المصادق عليه من طرف وزارة التربية الوطنية في مطلع سنة 2005 تماشيا مع خطوات إصلاح المنظومة التربوية. وعليه فقد تم توزيع محتواه على تسعة أبواب تغطي الميادين الأربع التي جاءت في البرنامج، وهي بابان لميدان الأعداد وبابان للدواوين وباب واحد للمعادلات والتراجحات وأخر للإحصاء وثلاثة أبواب للهندسة.

تتألف معظم الأبواب من ثمانية مقاطع، اختيرت بهدف التكفل بتوجيهات البرنامج، ماعدا باب الإحصاء فهو لا يشتمل على مقطع تعلم البرهنة، وباب الهندسة الفضائية لا يشتمل على مقطع تكنولوجيات الإعلام الاتصال، وهذا نظرا لطبيعة الموضوعين. هذه المقاطع هي:

1. صفحة التقديم

تصف هذه الصفحة الكفاءات المستهدفة من البرنامج في موضوع الباب المعنوي، وتعطي لمحة تاريخية عن مفهوم رياضي ورد في هذا الباب.

2. مقطع الأنشطة

يقدم هذا المقطع أنشطة تغطي قدر الإمكان مختلف جوانب المفهوم الرئيس لهذا الباب بشكل متدرج يراعي مكتسبات التلميذ من مرحلة التعليم المتوسط، قصد فسح المجال أمامهم لملامسة هذه الجوانب ومن ثم اكتشافها تمهيدا لتأسيسها في مقطع الدرس.

3. مقطع الدرس

يحتوي هذا المقطع على المضمون الرياضي الذي يتمثل في مفاهيم وخوارزميات وإجراءات، وأدوات ومصطلحات وبراهين، تعتبر المحتوى الذي نتوخى أن يكتسبه التلميذ بما يخدمه من الكفاءات المنصوص عليها في البرنامج، وقد ورد في هذا الباب ذكر كلمة **برهنة** بدلا من كلمة نظرية بقصد التمييز بين نص رياضي يحتاج إلى برهان و مفهوم رياضي معبر عنه بالمعنى الواسع بواسطة بديهييات و المسلمات وخواص ومصطلحات ... إلخ.

4. مقطع الطرائق والتمارين المحلولة

يعتبر هذا المقطع الوجه التطبيقي لما عرض في الدرس، فهو لا يكتفي بتقديم الحلول بل يرفق بكل حل تعلقا أو تعاليق عليه، لا تجد مكانها فيه ولكنها تساعد التلميذ على فهمه، وهي تتراوح بين تنبيه التلميذ إلى أخطاء محتملة إلى الإشارة لطرق أخرى للحل مرورا بلاحظات يكتمل بها فهمه. ولا يتوقف الأمر هنا بل يمتد إلى خلاصة تعرض فيها الطريقة التي اعتمدت في هذا الحل. ويجدر التأكيد هنا على أن هذه التعاليق والخلاصة ليست جزء من الحل.

5. مقطع تعلم البرهنة

إضافة إلى البراهين المقدمة في الدرس، نجد هذا المقطع ينفرد بتقديم حلول ليست هدفا بحد ذاتها وإنما هي بمثابة أرضية تعالج فيها الأفكار المؤسسة للبرهان وكيفيات بنائه بغرض خدمة البرهان الرياضي بمختلف أنماطه المنصوص عليها في البرنامج لذلك جاء عرض محتوي هذا المقطع مختلفا من باب لآخر حسب الحاجة.

6. مقطع استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال

استحدث هذا المقطع لإدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تعلم الرياضيات، إذ تم التطرق فيه إلى بعض البرامج التي يوفرها الحاسوب إضافة إلى الحاسبة البيانية، وفي أثناء ذلك أعطيت شروحات نرها ضرورية باعتبار أن منظومتنا التربوية حديثة العهد بوسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

7. مقطع معالجة وضعية إدماجية

تسمح الوضعيات المقترحة في هذا المقطع بإعطاء فرصة للتميذكي يدمج مكتسباته، سواء المتعلق بالمرحلة المتوسطة أو تلك التي تحصل عليها للتو بعد انتهاءه من دراسة الموضوع المدرج في الباب المعنى. وبهذا المعنى يعتبر هذا المقطع في الكتاب مساحة مخصصة لخدمة المقاربة بالكافاءات المعتمدة في البرنامج.

8. مقطع التمارين

صنفت التمارين في كل باب حسب الفقرات الواردة في الدرس، وتتدرج من أسئلة تتعلق بالفهم إلى تمارين ذات تطبيقات مباشرة للدرس إلى أخرى تتطلب العمق في البحث إضافة إلى مسائل يحتاج حلها إلى دمج عدة كفاءات في آن واحد. وقد تم اختيار هذه التمارين بحيث تغطي مجموع المعارف التي ظهرت في كل باب.

الأعداد والحساب

1

الكافئات المستهدفة

- التمييز بين مختلف أنواع الأعداد.
 - التحكم في الحساب على الكسور وعلى الجذور التربيعية والقوى الصحيحة.
 - تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية و استعماله.
 - التعرّف على أولية عدد طبيعي.
 - التحويل من وإلى الكتابة العشرية، الكتابة العلمية، الكتابة باستعمال القوى الصحيحة للعدد 10.
 - تدوير عدد عشري.
 - تحديد رتبة مقدار عدد.
 - التمييز بين عدد وإحدى قيمه المقربة.
 - استخدام الحاسبة العلمية لتنظيم وإجراء حساب.

من تطور العد بمراحل مختلفة منذ الحضارات القديمة، ولقد أدى تطور مفهومه إلى ظهور مفهوم العدد، فكان المفهومان متلازمين بحيث لا معنى للعد دون العدد الذي ارتبط بالمحدود. وكانت معرفة القدماء بالأعداد بسيطة جداً، إذ استعمل السومريون منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد رموزاً فقط لكتابية الأعداد بالكتابة المسمارية هما: ٢ و كـ وقد كان نظام العد عندهم ستينيًّا وموضعياً (موقع الرموز مهم في العد). وهو نفس النظام الذي اعتمدته البابليون حيث ظهر ذلك في الألواح الطينية البابلية، التي تعود إلى نفس الفترة الزمنية، وكان لليونان نظام عد يعتمد على حروف لغتهم مكان كل حرف يدل على رقم $\alpha(1)$ ، $\beta(2)$ ، أما الرومانيون فقد وضعوا نظام عد يعتمد على الرموز: I ، X ، V ، L ، C ، D ، M وهو نظام موضعياً كسابقيه. حيث نجد مثلاً: I = M II = D III = C IV = L V = X VI = XI VII = IIIV VIII = IIIV

غير أن الفضل في اكتشاف النظام العشري الحالي، يعود إلى الهند الذين استعملوا أشكالاً مختلفة من الأرقام وأجروا بواسطه هذا النظام عمليات حسابية تعتمد على فكرة مراتب الأرقام في العدد الواحد. فورث العلماء في حضارة العرب والمسلمين هذا النظام فوحدوه وهذبوه وابتدعوا طرفاً جديدة للضرب والقسمة منها الضرب بالشبكة وضرب الملوك، حيث استعملت في المشرق الأرقام الهندية وهي ، $133 \cdot 56 \cdot 49 \cdot 7$ وظهرت في المغرب والأندلس الأرقام الغبارية وهي $1,2,3,4,5,6,7,8,9$ التي عرفت لاحقاً في أوروبا بالأرقام العربية، كما أدخلوا الصفر في حساباتهم دون أن يعتنروه عدداً. وقد انتقلت هذه الأرقام إلى أوروبا في القرن الثالث عشر عن طريق الرياضي الإيطالي ليوناردو فيبوناسي (عاش في الفترة 1170-1240م) عبر مدينة بجاية. ونجد إشارة إلى استعمال أهل المغرب الإسلامي للأرقام الغبارية عند الرياضي ابن قند القسطيوني (توفي 810 هـ - 1407 م) في كتابه "خط النقاب عن وجوه أعمال الحساب" حيث كتب مايلي:

..... أعلم أن صورة العدد في اصطلاح قومي
 تسعه وهي بالغبار هذه، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 وللهند
 غيرها لجاز وهي باصطلاح آخرين سبعة وعشرين وهي
 وهذه ثلاثة أسطر في كل سطر تسعه أعداد وثلاثة
 تسعه سبعة وعشرين

	5	6	7	239×567
9	5 4	4 5	3 6	ضرب الشبكة
3	5 1	8 1	1 2	
2	0 1	2 1	4 1	
	1	3	5	5 1 3

أنشطة

الذى يندرج المطلوب من كتاب حفظ المتاب لابن فهد الفيزيائي

نشاط 1 : مجموعات الأعداد

ضع العلامة \times في الخانات المناسبة عندما يكون العدد x من المجموعة المفروضة.


$(3 - 2\sqrt{2})(3 + 2\sqrt{2})$	$\frac{-\sqrt{98}}{\sqrt{2}}$	$\sqrt{\frac{4}{121}}$	$\sqrt{81 \times 10^6}$	$\sqrt{0,49}$	$\frac{2^3 \times 3^2}{9^2}$	$\frac{3}{7}$	13,023	$\frac{15}{10^3}$	$\frac{12}{5}$	$-\frac{493}{29}$	$\frac{\sqrt{2}}{x}$
											\mathbb{R}
											\mathbb{Q}
											\mathbb{D}
											\mathbb{Z}
											\mathbb{N}

نشاط 2 : أعداد قابلة للإنشاء (1)

(O;I) معلم للمستقيم (d) .

على نصف المستقيم (Ox) ، نعتبر النقط B,C,B ، ، D ، ، C ، ، B ، ، D ، ، I ، ، M ، ، I ، ، (d) حيث $OB = BC = CD$.

المستقيمان (CM) و (DI) متوازيان . (الشكل المقابل)



(1) ما هما فاصلتا النقطتين O و I ؟

(2) بين لماذا يمكنك استعمال مبرهنة طالس ،

لحساب النسبة $\frac{OM}{OI}$.

استنتج فاصلة النقطة M في المعلم ($O;I$) .

(3) باستعمال مسطرة غير مدرجة ومدور ، علم على المستقيم (d) النقطتين $P\left(-\frac{3}{4}\right)$ و $N\left(-\frac{1}{2}\right)$.

(4) أرسم قطعة المستقيم [BI] ثم الموازي للمستقيم (BI) الذي يشمل D ويقطع (D) في Q . ما هي فاصلة النقطة Q في المعلم ($O;I$) ؟


نشاط 3 : أعداد قابلة للإنشاء (2)

أعد رسم الشكل المقابل باحترام الأبعاد المعطاة .

(1) ضع على الشكل أطول أوتار المثلث القائم .

(2) علم على المستقيم العددي ، باستعمال المدور ، النقاط ذات الفواصل 1

$D(3 + \sqrt{2}) ; C(\sqrt{2} + \sqrt{3}) ; B(-\sqrt{5}) ; A(\sqrt{2})$.



3) احسب الطول AD .

4) هل مجموع عددين غير ناطقين هو دوماً عدد غير ناطق؟

نشاط 4 : ضرورة استعمال الحساب المضبوط في البرهان


في الشكل المقابل، لدينا: $OB = 1,2\text{ cm}$ $OA = 1,45\text{ cm}$

$$OD = 2,2\text{ cm} ; OC = 1,82\text{ cm}$$

1) أعد رسم الشكل باحترام الأبعاد المعطاة.

2) هل المستقيمان (AB) و (DC) متوازيان؟

برر إجابتك.



نشاط 5 : الخاصية المميزة للعدد العشري

ليكن $x = \frac{p}{q}$ عدداً ناطقاً مكتوباً على شكله غير القابل للاختزال (p و q عددان أوليان فيما بينهما).

لنبرهن أنّ x يكون عدداً عشررياً إذا وفقط إذا كان لا يشمل تحليل مقامه q إلى جداء عوامل أولية إلا العاملين 2 أو 5 بمعنى $p = 2^\alpha \times 5^\beta$ (حيث α و β عددان طبيعيان).

1) ضع $x = \frac{p}{2^\alpha \times 5^\beta}$ مع $\alpha \geq \beta$ مرة و $\beta < \alpha$ مرة أخرى وبين في

الحالتين أنه يمكن كتابة x على الشكل $\frac{p'}{10^n}$. ماذا تستنتج؟

2) بين أنه إذا كان x عدداً عشررياً فإن $x = \frac{p}{2^n \times 5^n}$. ماذا تستنتج؟

3) استخلص خاصية يتميز بها كلّ عدد عشري.

نشاط 6: الأعداد الأولية

تعريف: نسمى عدداً أولياً كلّ عدد طبيعي يقبل، بالضبط، قاسمين مختلفين هما: 1 والعدد نفسه.

1) عين من بين الأعداد الآتية الأعداد الأولية: 0, 1, 12, 29

2) ما هو أصغر عدد أولي؟

3) عين قائمة الأعداد الأولية الأصغر من 20.

4) نريد تعريف قائمة الأعداد الأولية الأصغر من أو المساوية 100، و لأجل ذلك نستعمل

غربال إراتostenes كما يلي:

▪ اكتب في جدول قائمة الأعداد من 2 إلى 100 كما يلي:

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

▪ أحفظ 2 الذي هو عدد أولي ثم اشطب كلّ مضاعفاته. اشرح لماذا هذه الأعداد ليست أولية؟


= أحفظ 3 ثم أشطب مضاعفاته غير المطلوبة من قلب. أعد العمل مع 5 وهكذا.
اشرح لماذا ننهي العمل مع 11 ومضاعفاته.

١. المجموعات الأساسية للأعداد

• مجموعة الأعداد الحقيقية

تعريف

مجموعة الأعداد الحقيقية، \mathbb{R} ، هي مجموعة فوائل نقط مستقيم مزود بعلم $(O; I)$.
العدد الحقيقي 0 هو فاصلة المبدأ O والعدد الحقيقي 1 هو فاصلة النقطة I .



أمثلة: لاحظ على الشكل، فاصلتا النقطتين A و B هما، على التوالي، العددان الحقيقيان السالبان $-2,5$ و $-\sqrt{3}$.


بينما الأعداد الحقيقة الموجبة $\sqrt{2}$ و π و $\frac{14}{3}$ هي فوائل النقط C و D و E على الترتيب.

ملاحظة: الأعداد الحقيقة الموجبة هي فوائل نقاط نصف المستقيم (OI) . الأعداد الحقيقة السالبة، ما عدا 0، هي فوائل نقاط المستقيم (OI) التي لا تنتهي إلى (OI) .

نرمز إلى مجموعة الأعداد الحقيقة الموجبة بالرمز \mathbb{R}^+ وإلى مجموعة الأعداد الحقيقة السالبة بالرمز \mathbb{R}^- .

0 عنصر من \mathbb{R}^+ ومن \mathbb{R}^- .

نعني بالرمز \mathbb{R}^* مجموعة الأعداد الحقيقة ما عدا الصفر.



• مجموعة الأعداد الطبيعية

٠؛ ١؛ ٢؛ ٣؛ ... أعداد طبيعية. نرمز إلى مجموعة الأعداد الطبيعية بالرمز \mathbb{N} .

• مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية

...؛ -3؛ -2؛ -1؛ 0؛ 1؛ 2؛ 3؛ ... أعداد صحيحة نسبية (سالبة، معدومة أو موجبة).

نرمز إلى مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية بالرمز \mathbb{Z} .

أمثلة

العدد 3 ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية. نكتب $3 \in \mathbb{N}$ (الرمز \in يقرأ "ينتمي إلى"). لدينا كذلك $2 \notin \mathbb{N}$ - (نقرأ 2 - لا ينتمي إلى \mathbb{N}).
 $2,1 \notin \mathbb{Z}$ و $-2 \in \mathbb{Z}$. لكن

مجموعة الأعداد الناطقة

- العدد الناطق هو العدد الذي يمكن كتابته على الشكل $\frac{p}{q}$ حيث p عدد صحيح نسبي و q عدد صحيح نسبي غير معدوم. نرمز إلى مجموعة الأعداد الناطقة بالرمز \mathbb{Q} .
- العدد العشري هو العدد الذي يمكن كتابته على الشكل $\frac{p}{10^n}$ حيث p عدد صحيح نسبي و n عدد طبيعي. نرمز إلى مجموعة الأعداد العشرية بالرمز \mathbb{D} .
- العدد الأصم هو كلّ عدد حقيقي غير ناطق.

أمثلة:

- $-\frac{2}{3} \in \mathbb{Q}$ - عدد ناطق، لأنّه يمكن كتابته على الشكل $\frac{p}{q}$ مع $p = -2$ و $q = 3$. نكتب $-\frac{2}{3}$
- $2,75 = \frac{275}{10^2} = \frac{1}{300}$ عدد عشري، لأنّ $2,75 \notin \mathbb{D}$. لكن $\sqrt{2}$ عدد أصمّ.
- نبرهن أنه لا يوجد عدد صحيح نسبي p و عدد صحيح نسبي غير معدوم q حيث $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ توجد أعداد صماء أخرى، مثل π .

خاصية

يتميز كلّ عدد ناطق بكتابته عشرية تتضمن دوراً.

مثال $\frac{1}{2} = 0,500000 \dots$; $\frac{17}{11} = 1,\underline{54} 54 54 54 \dots$; $\frac{23}{7} = 3, \underline{28571} 285741 \dots$ تختصر هذه الكتابات العشرية الدورية كما يلي: $\frac{1}{2} = 0,5\bar{0}$ ، $\frac{17}{11} = 1,\underline{54} \bar{4}$ ، $\frac{23}{7} = 3,\underline{28571} \bar{4}$

خاصية

كلّ عدد ناطق يقبل كتابة وحيدة على شكل كسر غير قابل للاختزال $\frac{p}{q}$ ، مع p و q عددين صحيحين نسبيين و $q \neq 0$.

مثال


الشكل غير القابل للاختزال للعدد الناطق $\frac{10}{17}$ هو $\frac{150}{255}$ (لاحظ أنّ $\frac{150}{255} = \frac{15 \times 10}{15 \times 17}$)

مقارنة مجموعات الأعداد

خاصية

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}, \mathbb{Z} \subset \mathbb{D}, \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}, \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

كل الأعداد الطبيعية هي أيضاً أعداد صحيحة نسبية.



بمعنى: المجموعة \mathbb{N} جزء من المجموعة \mathbb{Z}

نكتب: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$. ونقرأ " \mathbb{N} محتواة في \mathbb{Z} " .

ـ $-5 \in \mathbb{D}$: مثلا $-5 \in \mathbb{D}$ ، لأن $-5 = -\frac{5}{10^0}$

أي كل عدد صحيح نسبي هو عدد عشري.

ـ كل عدد عشري هو عدد ناطق ولكن،

ليس كل عدد ناطق عشريا. \mathbb{D} جزء من \mathbb{Q} .

$\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$ ، لأن: $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$. $0,14 = \frac{14}{10^2} \in \mathbb{Q}$

مجموعة الأعداد الناطقة جزء من مجموعة الأعداد الحقيقة.

2 . القوى الصحيحة

تعريف

ـ a عدد حقيقي كيقي و n عدد طبيعي غير معどوم. نسمى القوة ذات الرتبة n للعدد الحقيقي a ،

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_n \text{ حيث:}$$

ـ من أجل كل عدد حقيقي a غير معどوم و n عدد طبيعي غير معどوم، $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

اصطلاح: من أجل كل عدد حقيقي a غير معどوم، $a^0 = 1$

أمثلة: $10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000} = 0,001$ ؛ $10^4 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10\,000$

$a^{-1} = \frac{1}{a}$ ؛ $(0,5)^{-2} = \frac{1}{(0,5)^2} = \frac{1}{0,25} = 4$ ؛ $2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$

خاص

ـ a و b عدوان حقيقيان غير معدونين و m و n عددان صحيحان نسبيان.

$$\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m} \quad ; \quad (a \times b)^m = a^m \times b^m \quad ; \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad ; \quad (a^m)^n = a^{mn} \quad ; \quad a^m \times a^n = a^{m+n}$$

حالات خاصة

ـ من أجل كل عدد حقيقي a غير معدووم وكل عدد طبيعي n غير معدووم: $a^n \times a^{-n} = a^0 = 1$

ـ من أجل كل عدد طبيعي n :

- إذا كان n زوجيا، فإن $(-1)^n = 1$

- إذا كان n فرديا، فإن $(-1)^n = -1$

$$\frac{2^5}{2^{-3}} = 2^{5-(-3)} = 2^8 \quad ; \quad (2^5)^{-3} = 2^{5 \times (-3)} = 2^{-15} \quad ; \quad 2^5 \times 2^{-3} = 2^{5+(-3)} = 2^2$$

$$\cdot (-2)^5 = -2^5 \quad ; \quad (-2)^8 = 2^8 \quad ; \quad \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2^2}{3^2} \quad (2 \times 3)^2 = 2^2 \times 3^2$$

3. الجذور التربيعية

تعريف

نسمى الجذر التربيعي للعدد الحقيقي a العدد الحقيقي الموجب الذي مربعه يساوي a ونرمزه إليه \sqrt{a} .

مثال: $\sqrt{0,49} = 0,7$

خواص

- من أجل a موجب: $\cdot (\sqrt{a})^2 = a$ و $\sqrt{a} \geq 0$
- من أجل a و b موجبان: $\cdot \sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$
- من أجل a و $b > 0$: $\cdot \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$

$$\cdot \sqrt{\frac{1}{64}} = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{64}} = \frac{1}{8} \quad ; \quad \sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = \sqrt{4} \times \sqrt{3} = 2\sqrt{3} \quad ; \quad (\sqrt{3})^2 = 3 \quad \text{أمثلة:}$$

تبليغ: $\cdot \sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$ و $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$ لأن $\sqrt{9+16} \neq \sqrt{9} + \sqrt{16}$

4 . القيمة المضبوطة، القيم المقربة

• مُدَوَّر عدد حقيقي

تعريف

A عدد حقيقي مكتوب في شكله العشري، ولتكن d رقمه العشري ذو الرتبة. نسمى مُدَوَّر A إلى 10^{-p} العدد الذي نحصل عليه كما يلي:

- إذا كان $5 \geq d$ ، نأخذ العدد بأرقامه العشرية إلى الرقم العشري الذي رتبته p ، ونضيف 1 إلى هذا الرقم.
- إذا كان $5 < d$ ، نأخذ العدد بأرقامه العشرية إلى الرقم العشري الذي رتبته p .

مثال

المدَوَّر إلى 10^{-5}	المدَوَّر إلى 10^{-3}	المدَوَّر إلى الوحدة	3,141592653589793
3,14159	3,142	3	

• تقدير نتيجة

▪ الكتابة العلمية

تعريف

كتابة عدد عشري على الشكل العلمي، تعني التعبير عنه على الشكل $a \times 10^n$ (أو $-a \times 10^n$) حيث a عدد عشري يحقق $1 < a \leq 10$ و n عدد صحيح نسبي.

أمثلة

إزاحة الفاصلة	العدد مكتوب على الشكل العلمي	العدد
8 مراتب نحو اليسار	$1,28 \times 10^8$	128 000 000
10 مراتب نحو اليمين	$-7,5 \times 10^{-10}$	-0,000 000 000 75

EE

ملاحظة: يمكن تعين الكتابة العلمية لعدد عشري بواسطة الحاسبة وذلك باستعمال الممسة

▪ رتبة مقدار عدد

لإيجاد رتبة مقدار عدد:

- نكتب العدد على الشكل العلمي.

- ندور العدد العشري في كتابته العلمية إلى العدد الصحيح الأقرب منه ونحتفظ بقوة 10.

أمثلة

(1) رتبة مقدار العدد $9,2 \times 10^{12}$ هي 9×10^{12} .

(2) لنعيّن رتبة مقدار العدد $25120 \times 0,00935$.

▪ نكتب كل حدة في الجداء على الشكل العلمي:

$$25120 \times 0,00935 = 2,512 \times 10^4 \times 9,35 \times 10^{-3}$$

▪ ندور كلا من العددين العشريين في الكتابتين العلميتين إلى العدد الصحيح الأقرب:

$$3 \times 10^4 \times 9 \times 10^{-3}$$

▪ رتبة مقدار العدد $25120 \times 0,00935$ هي 10 .

5. الأعداد والحسابية


▪ تمثيل الأعداد في الحاسبة

عند استعمال الحاسبة، نتعامل مع العدد بثلاثة أشكال هي:

• القيمة المخزنة

• القيمة الظاهرة

• القيمة المضبوطة



مثال

عند استعمال الحاسبة TI-83 Plus بالنسبة إلى جذر 2، نجد: $\sqrt{2}$ هي القيمة المضبوطة.

$1,414213562$ هي القيمة الظاهرة.

$3,731E^{-10} - \sqrt{2} = 3,731E^{-10}$ هي القيمة المخزنة.

يقرأ العدد $3,731E^{-10}$ كما يقرأ العدد $3,731 \times 10^{-10}$.

ملاحظة

- تسمح طاقة الإظهار المألوفة للحاسبة بإعطاء القيمة المضبوطة لعدد له عشرة أرقام على الأكثر، أما إذا كان للعدد أكثر من 10 أرقام، فإنها تعطي قيمة مقربة له على شكل الكتابة العلمية.
- الحاسبات الحديثة تحترم أولويات العمليات.

▪ تنظيم حساب باليد أو بالحاسبة

عند إجراء حساب ما، تتبع عادة الخطوات التالية احتراماً لأولويات العمليات حيث تنجز على التوالي:

- الحسابات داخل الأقواس.
- الحسابات المتعلقة بالقوى والجذور التربيعية.
- عمليات الضرب والقسمة حسب ترتيب كتابتها.
- عمليات الجمع والطرح حسب ترتيب كتابتها.

أمثلة

(1) تنظيم حساب باليد:

$$\begin{aligned} (2 \times 3 + 2\sqrt{2})^2 - 14 &= (6 + 2\sqrt{2})^2 - 14 \\ &= 36 + 24\sqrt{2} + 8 - 14 \\ &= 44 + 24\sqrt{2} - 14 \\ &= 30 + 24\sqrt{2} \end{aligned}$$

↑
نجري العمليات داخل القوس
↑
ثم نحسب القوى
↑
وأخيراً عمليات الجمع
والطرح

(2) كتابة برنامج حساب بالحاسبة:

$$2 \quad \times \quad 1 \quad 0 \quad \wedge \quad (-) \quad 2 \quad \div \quad (\quad 3 \quad - \quad 0 \quad \cdot \quad 5 \quad) \quad \leftarrow \quad \frac{2 \times 10^{-2}}{3 - 0,5}$$

6. الأعداد الأولية

تعريف

نسمى عدداً أولياً كلّ عدد طبيعي يقبل، بالضبط، قاسمين مختلفين هما: 1 والعدد نفسه.

من أجل $n = 12$. قواسم العدد 12 هي 1؛ 2؛ 3؛ 4؛ 6؛ 12: العدد 12 يقبل، على الأقل، قاسماً يختلف عن 1 وعن 12. فهو ليس أولياً.

من أجل $n = 37$. قواسم 37 هما 1 و 37 فقط. فالعدد 37 أولي. العدد 1 ليس أولياً، لأنّه يقبل قاسماً واحداً فقط والعدد 0 ليس أولياً، لأنّه يقبل عدداً غير منتهٍ من القواسم.

الأعداد الأولية الأصغر من 100 هي:
 2؛ 3؛ 5؛ 7؛ 11؛ 13؛ 17؛ 19؛ 23؛ 29؛ 31؛ 37؛ 41؛ 43؛ 47؛ 53؛ 59؛ 61؛ 67؛ 71؛ 73؛ 79؛ 83؛ 89؛ 97.

مبرهنة

كل عدد طبيعي غير أولي و أكبر منه 2^2 يكتبه على شكل حداء أعداد أولية

مثال : $5418 = 2 \times 3^2 \times 7 \times 43$ ؛ $156 = 2^2 \times 3 \times 13$

• الانتقال من الكتابة العشرية لعدد ناطق إلى الكتابة الكسرية له

عَيْنَ الكتابة الكسرية للعدد a انطلاقاً من الكتابة العشرية الدورية له $a=3, \underline{254}$.

حل

نكتب العدد كمجموع جزئيه الصحيح والعشري.

$$\begin{aligned} \text{لدينا } 3,254\dots &= 3 + 0,254\dots \\ \text{نضع } x = 0,254\dots &= 3 + x \quad 3 + 0,254\dots \text{ مع } \dots \\ \text{انطلاقاً من } \dots &= x, \text{ نجد:} \end{aligned}$$

$$1000x = 254,254\dots$$

$$1000x = 254 + 0,254254\dots$$

$$1000x = 254 + x$$

$$999x = 254$$

$$x = \frac{254}{999}$$

$$\text{منه: } x + 3 = 3 + \frac{254}{999} = \frac{3 \times 999 + 254}{999} = \frac{3251}{999}$$

الجزء العشري للعدد المعطى يتضمن دوراً وهذا يحثنا على كتابته على شكل كسر.

أي نكتب:

$$0,254254\dots = a - 3$$

$$a - 3 \in \mathbb{Q} \quad \text{إذن } a \in \mathbb{Q}$$

طريقة

لتعيين الكتابة الكسرية لعدد ناطق انطلاقاً من كتابته العشرية الدورية، نكتبها كمجموع لجزئيه الصحيح والعشري.

نفرض x الجزء العشري لهذا العدد. بالضرب في 10^n حيث n عدد أرقام الدور، نحصل على معادلة ذات المجهول x ، نحلّ المعادلة. نعوض x بالقيمة المعينة ونحصل على العدد الناطق مكتوباً على شكل كسر.

• اختبار أولية عدد طبيعي

هل العدد 197 أولي؟

حل

تعاليق

- العدد 197 لا يقبل القسمة على كلٍ من 2 و 3 و 5.
- نختبر إن كان العدد 197 يقبل القسمة على الأعداد الأولية حسب ترتيبها في قائمة الأعداد الأولية الأولى:

هل يقبل العدد	القسمة على	13	11	7	5	3	2
لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا

عند إجراء عمليات القسمة على الأعداد الأولية، نستعين بقواعد قابلية القسمة.

- نقسم 197 على العدد الأولي 17. نجد $197 \div 17 \approx 11$.
- وباعتبار $17 > 11$ ، ننهي عمليات القسمة.
- نستخلص، العدد 197 أولي.

عند اختبار قابلية قسمة العدد المفروض على الأعداد الأولية، تؤخذ هذه الأعداد في ترتيب تصاعدي ويمكن استعمال الحاسبة لملحوظة حواصل القسمات.

طريقة

نختبر قابلية قسمة العدد على كلٍ من الأعداد الأولية حسب ترتيبها التصاعدي. نتوقف عن عمليات القسمة عند أول باق معروف أو عندما نصادف أول حاصل قسمة أصغر من

المقسوم عليه.

نستخلص: إذا صادفنا الباقي المعدوم يكون العدد غير أولي وإلا فهو أولي.

• تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية

لنبث عن تحليل العدد 240 إلى جداء عوامل أولية.

حل

تعليق

- ننظم الحساب كما يلي:

$$240 = 2 \times 120$$

$$120 = 2 \times 60$$

$$60 = 2 \times 30$$

$$30 = 2 \times 15$$

$$15 = 3 \times 5$$

$$5 = 5 \times 1$$

$$\text{نستخلص: } 240 = 2^4 \times 3 \times 5$$

- يمكن تنظيم الحساب عموديا، كما يلي:

$$\begin{array}{r|l} 240 & 2 \\ 120 & 2 \\ 60 & 2 \\ 30 & 2 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array}$$

طريقة

نقسم العدد على أصغر عدد أولي يكون قاسما له.

نقسم حاصل القسمة على أصغر عدد أولي يكون قاسما له.

نكرر عمليات القسمة هذه حتى نصل إلى حاصل قسمة يساوي 1.

كتابة جداء قوى كل هذه القواسم هو تحليل العدد إلى جداء عوامل أولية.

• استعمال التحليل إلى جداء عوامل أولية

1) حل إلى جداء عوامل أولية العددين 156 و 84

2) اكتب الكسر $\frac{156}{84}$ على الشكل غير القابل للاختزال.

3) احسب المضاعف المشترك الأصغر غير المعدوم للعددين 156 و 84. احسب الفرق $\frac{5}{156} - \frac{13}{84}$

حل

تعليق

$$84 = 2^2 \times 3 \times 7 \quad (1)$$

$$\frac{156}{84} = \frac{2^2 \times 3 \times 13}{2^2 \times 3 \times 7} = \frac{13}{7} \quad (2)$$

$$84 = 2^2 \times 3^1 \times 7^1 \times 13^0 \quad (3)$$

156 = $2^2 \times 3^1 \times 7^1 \times 13^1$ هو المضاعف المشترك الأصغر

غير المعدوم للعددين 156 و 84.

$$1932 = 156 \times 12 \quad 1932 = 84 \times 30$$

$$\frac{5}{156} - \frac{13}{84} = \frac{12 \times 5}{1932} - \frac{30 \times 13}{1932} = \frac{60 - 390}{1932} = -\frac{330}{1932}$$

يكن تطبيق الطريقة المقترنة في حل التمارين ③.

عند الاختزال، نطبق القواعد على القوى.

في حساب المضاعف المشترك الأصغر غير المعدوم لعددين، نأخذ كل عامل أولي بأكبر الأسرين في التحليلين.

طريقة

لتعيين الشكل غير القابل للاختزال لكس، يمكن:

- تحليل كل من بسطه ومقامه إلى جداء عوامل أولية ثم نطبق قواعد الحساب على القوى، لاختزال الكسر.

- استعمال الطريقة المدرosaة في التعليم المتوسط، والمتمثلة في تعيين القاسم المشترك الأكبر لحدى الكسrs ثم نقسم كلاً منها على هذا القاسم المشترك الأكبر.

لتعيين المضاعف المشترك الأصغر غير المعدوم لعددين طبيعيين غير معدومين، نحسب جداء كل العوامل الأولية الواردة في تحليلي هذين العددين مأخذة مرّة واحدة بأكبر أنس.

• معرفة إن كان عدد ناطق عدداً عشرياً

عُيّن من بين الأعداد الناطقة التالية الأعداد العشرية: $\frac{15}{280}$, $\frac{17}{21}$, $\frac{27}{30}$, $\frac{21}{4200}$, $\frac{35}{98}$

حل

تعاليق
تعتمد على الخاصية المميزة
للعدد العشري (انظر
النشاط ⑥)

تحليل المقام يشمل قوة للعدد 7. $\frac{35}{98}$ ليس عدداً عشرياً.

$$\frac{21}{4200} = \frac{21}{2 \times 21 \times 100} = \frac{1}{200}$$

■
و $200 = 2^3 \times 5^2$

تحليل المقام لا يشمل إلا قوى 2 أو 5. $\frac{21}{4200}$ عدد عشري.

نعمل بالمثل بالنسبة للأعداد الأخرى ونجد:

$$\frac{27}{30} - \text{عدد عشري و } \frac{17}{21} \text{ و } \frac{15}{280} \text{ عددان غير عشريين.}$$

طريقة

لمعرفة إن كان عدد ناطق عدداً عشرياً، نكتب العدد الناطق على شكله غير القابل للاختزال $\frac{p}{q}$ ، ثم نحل مقامه q إلى جداء عوامل أولية.
إذا كان هذا التحليل لا يشمل إلا قوى 2 أو 5، فالعدد عشري.

• استعمال رتبة مقدار عدد لتقدير نتيجة حساب

أجرى أمين الحسابات التالية باستعمال الحاسبة، ساعده على مراقبة النتائج الظاهرة لكل حساب.

$586\,251,365 \times 2\,658\,4,4$	$897\,563,25$	$256\,2356,12 \times 0,00035$	الحساب
$458 \times 0,0000012$	$0,036$		
28357243070000	249 323,125	896,824642	النتيجة الظاهرة

حل

تعاليق

لمساعدة أمين على مراقبة نتائجه نفهم هنا على أنها الحكم على معقولية هذه النتائج وليس تصديقها.

(3)	(2)	(1)	الحساب
28357243070000	249 323,125	896,824642	النتيجة المظهرة
$2,8 \times 10^{13}$	$2,4 \times 10^7$	$8,9 \times 10^2$	الكتابية العلمية للحاسب
3×10^{13}	2×10^7	9×10^2	تقدير النتيجة
الحساب معقول	الحساب غير معقول	الحساب معقول	الحكم

١ البرهان على صحة مساواة

للبرهان على صحة مساواة $A = B$ حيث A و B عدوان أو عبارتان، يمكن إتباع إحدى الطرق التالية

$$\text{مثال : نبرهن أن } \frac{1000 - 0,00003^2 - 10^3}{9 \times 10^{-9}} = 0,15$$

$$\text{نضع } B = 0,15 \text{ و } A = \frac{1000 - 0,00003^2 - 10^3}{9 \times 10^{-9}}$$

لدينا:

$$A = \frac{1000 - 0,00003^2 - 10^3}{6 \times 10^{-9}} = \frac{10^3 - (3 \times 10^{-5})^2 - 10^3}{6 \times 10^{-9}}$$

$$= \frac{9 \times 10^{-10}}{6 \times 10^{-9}} = \frac{3 \times 10^{-1}}{2} = 1,5 \times 10^{-1} = 0,15 = B$$

مثال : نبرهن أن

من أجل كل عدد حقيقي x

$$\cdot (x+2)^2 - 5 = (x-1)(x+5) + 4$$

$$\text{نضع } 5 - 5 = (x-1)(x+5) + 4 \text{ و } A = (x+2)^2 - 1$$

لدينا:

$$\text{من } A = (x+2)^2 - 5 = x^2 + 4x + 4 - 5 = x^2 + 4x - 1 \text{ جهة، ومن جهة أخرى،}$$

$$B = (x-1)(x+5) + 4 = x^2 + 5x - x - 5 + 4 = x^2 + 4x - 1$$

$$\cdot B = C \text{ و } A = C \text{ ، وجدنا } C = x^2 + 4x - 1 \text{ وبوضع } A = B \text{ نستخلص .}$$

$$\text{مثال : برهن أن } \frac{5-\sqrt{2}}{23} = \frac{1}{5+\sqrt{2}}$$

نسمي A الطرف الأول و B الطرف الثاني. نعتبر

$$\cdot A - B$$

لدينا:

$$\begin{aligned} A - B &= \frac{5-\sqrt{2}}{23} - \frac{1}{5+\sqrt{2}} \\ &= \frac{(5+\sqrt{2})(5-\sqrt{2}) - 23}{23(5+\sqrt{2})} \\ &= \frac{25 - 2 - 23}{23(5+\sqrt{2})} = 0 \end{aligned}$$

$$\cdot A = B \text{ نستخلص من } A - B = 0$$

- ننطلق من أحد الطرفين A أو B ونحوّل كتابته بتطبيق قواعد الحساب ضمن عدد معين من المراحل المتتابعة إلى أن نقضي إلى الطرف الآخر.

- نحوّل كتابتي الطرفين A و B إلى أن نقضي إلى نفس العبارة C .

- $\text{نبرهن أن } A - B = 0$

إعادة الاستئمار

برهن، باستعمال الطرق الثلاث السابقة، أنه:

$$x + 2 - \frac{3}{x} = \frac{(x-1)(x+3)}{x}$$

② معرفة إن كان نصّ رياضي صحيحاً أو خطأ

نصادف أحياناً نصوصاً استفهامية تصاغ على الشكل: هل ... ؟ هذه النصوص تحتمل الإجابة بنعم أو لا والإجابة عليها تحتاج في الحالتين إلى تبرير حتى وإن كان ذلك غير مطلوب في النصّ صراحة.

مثال 1: إليك النصّ الآتي "هل يكون مربع عدد حقيقي a أكبر من أو يساوي a دائمًا؟" ناقش الحوار الآتي الذي جرى بين تلميذين عند تبادلهم الحوار فيما بينهما حول هذا النصّ ثم حرر إجابتك.

• عمر: "جرّبت أعداداً موجبة وأخرى سالبة ووجدت أن مربعات هذه الأعداد أكبر من أو تساوي هذه الأعداد:

$$\text{من أجل 1: } 1^2 = 1 \geq 1$$

$$\text{من أجل 5: } 5^2 = 25 \geq 5$$

$$\text{من أجل } -1: (-1)^2 = 1 \geq 1$$

$$\text{من أجل } -5: (-5)^2 = 25 \geq 5$$

ثم جرّبت عدداً أكبر: $10000^2 = 1000000 \geq 100$ و منه استخلص أنَّ النصّ السابق صحيح.

• حكيم: "أظن أنك أخطأت. لا أعرف خطأك بالضبط، لكن عندما جرّبت العدد الحقيقي $\frac{1}{2}$

$$\text{ووجدت أن: } \frac{1}{4} \leq \frac{1}{2} \text{ و } \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

مثال 2: طُرح على تلميذ السؤال "هل مجموع عددين فرد़يين هو عدد زوجي؟" فكانت إجابته كالتالي:

أحرّب العددين الفردِّيين $1, 3 : 1+3=4$ و 4 عدد زوجي.

أحرّب عددين فردِّيين أكبر 105 و $123 : 105+123=228$ و 228 عدد زوجي.

استخلص أنَّ مجموع كُلَّ عددين فردِّيين هو عدد زوجي.

هذا صحيح ولكنه غير كاف لأنك لم تبرر النصّ.
أعد المحاولة مع اعتبار العدد الفردِّي عيّن الحالة.

نناقش هذه الإجابة ثم حرر إجابتك مستقيداً من ملاحظات الأستاذ.

إعادة الاستثمار

1. هل محمد استعمل تكنولوجيات الاعلام الاتصال
 2. هل مربع مجموع عددين يساوي مربع مجموع العددين ؟

• استعمال الحاسبة

① أنظم حسابا

$$B = \frac{9 \times 2 - 10}{12 - 8} ; A = (-15 + 8) \times 2 + 10$$

(1) احسب ما يلي:
 (2) اكتب الحساب الموافق للبرنامج التالي:



$$E = \frac{2\pi - \sqrt{3}}{10^{-2}}$$

(3) اكتب البرنامج الذي يسمح بحساب ما يلي:

② أسترجع الأرقام العشرية

11/13	, 8461538462
Ref*10^-8	
4615384615	
Ref*10^-4	
. 6153846154	

(1) أظهر العدد $\frac{11}{13}$. لتكن a القيمة الظاهرة.


(2) ماذا يمثل a بالنسبة إلى العدد $\frac{11}{13}$ ؟

(3) أجر الحساب المشار إليه في هذا الجدول لاسترجاع الأرقام العشرية المخزونة:



- هل الرقم ما قبل الأخير وارد في كتابة a ؟ لماذا ؟

(5) أجر الحساب الآتي:



- ما هو الرقم العشري المسترجع ؟

(6) واصل الإجراء حتى إظهار كل الأرقام المخزنة.
 ما هو عددها ؟

③ أعرف حدود الحاسبة

- (1) نريد حساب 10157^2 . العدد 10157 محصور بين 10 000 و 20 000 .
 - ما هو عدد أرقام العدد 10157^2 ؟ ما هو رقم أحد العدد 10157^2 ؟
 احسب، باستعمال الحاسبة العدد 10157^2 . تحقق من انسجام النتيجة الظاهرة مع إجابتك.
 احسب، باستعمال الحاسبة العدد 101578^2 (لاحظ أن الآلة تعطي النتيجة على الشكل العلمي).
 تحقق، باتباع نفس الخطوات كما في السؤال (1)، إن كانت النتيجة الظاهرة صحيحة.
 (2) احسب، باستعمال الحاسبة، العدد $(1+10^{-20})^2 - 1$. هل النتيجة الظاهرة معقولة ؟ اشرح لماذا ؟

$$(3) \text{ احسب باستعمال الحاسبة قيمة } \sqrt{2} . \text{ نسمي } x \text{ القيمة الظاهرة .}$$

احسب $\sqrt{2} - x$

هل القيمة المقربة للعدد $\sqrt{2}$ الظاهر هي نفس القيمة التي تستعملها الحاسبة في الحساب؟

• حساب القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين a و b ($a > b$) يمكن إنجاز المثال الآتي بمجدول أو حاسبة بيانية (casio TI83 أو

	A	B	C	D	E	F
	\oplus	a	b	الفرق		
2	1	3206	847	2359		
3	2					
4	3					
5						

مثال: لنحسب $PGCD(3206, 847)$

• باستعمال مجدول

1) حضر ورقة الحساب المقابلة.

لحساب الفرق $3206 - 847 = 2359$ ، نحجز في الخلية $D3$ الدستور: $=B3 - C3$

2) أحجز في الخلية $B4$ الدستور: $=MAX(C3; D3)$


أحجز في الخلية $C4$ الدستور: $=MIN(C3; D3)$

أحجز في الخلية $D4$ الدستور: $=B4 - C4$

3) حدد مجموعة الخلايا $B4:D4$ (من $B4$ إلى $D4$) ثم أنقلها بواسطة الزالق نحو الأسفل إلى أن تتحصل على فرق معدوم في إحدى خلايا العمود D .

4) تحقق من أنَّ الفرق الأخير غير المعدوم هو القاسم المشترك الأكبر للعددين المفروضين.

• باستعمال الحاسبة البيانية (TI-83 Plus)



1. اختيار البرنامج



2. بواسطة اللمسة

ثم بواسطة المفتاح \blacktriangledown اختيار الوظيفة $gcd()$ أو بالنقر على اللمسة 9 مباشرة.




3. نصادق (نؤكد الاختيار) بواسطة اللمسة



ونحجز العددين 3206 و 847.




4. نصادق (نطلب النتيجة) فنتحصل على القاسم المشترك الأكبر للعددين المحجوزين.



حل مسألة إدماجية

الهدف: استعمال الأعداد في ميدان الهندسة

1) على المستقيم المدرج، نريد إنشاء العدد الحقيقي $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ، المسمى العدد الذهبي.¹



لذلك، نعتبر الشكل المقابل حيث (OA) مستقيم مزور بالعلم (O,A) و OABC مربع و I منتصف [OA].

أ) أعد رسم الشكل ثم علم على المستقيم (OA) النقطة M التي فاصلتها ϕ .


ب) بين أن فاصلة النقطة N، نظيرة M بالنسبة إلى I، هي $1 - \phi$.

ح) احسب MN.

2) برهن أن ϕ يحقق الخواص:

$$\phi^3 = 2\phi + 1 \quad (ج) \quad \phi = 1 + \frac{1}{\phi} \quad (ب) \quad \phi^2 = \phi + 1 \quad (أ)$$

حل



أ) يمكن وضع العدد الذهبي على الشكل في المثلث القائم IAB في A وبنطبيق نظرية فيثاغورس، نجد: $AB = 1$ $IB^2 = IA^2 + AB^2$ مع $IB = \frac{\sqrt{5}}{2}$ و $IA = \frac{1}{2}$ منه: $IB = \frac{\sqrt{5}}{2}$

الدائرة التي مركزها I ونصف قطرها $\frac{\sqrt{5}}{2}$ تقطع المستقيم (OA) في نقطتين M و N.

$$\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} = \phi : M$$

ب) النقطتان M و N متاظرتان بالنسبة إلى I : $x_I = \frac{1}{2}$ و $x_M = \phi$ مع $x_M + x_N = 2x_I$ منه فاصلة النقطة $x_N = 1 - \phi$: N

$$MN = 2 \times \frac{\sqrt{5}}{2} = \sqrt{5} \quad (ح)$$


$$\phi^2 = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^2 = \frac{1+2\sqrt{5}+5}{4} = \frac{6+2\sqrt{5}}{4} = \frac{3+\sqrt{5}}{2} = \frac{2+1+\sqrt{5}}{2} = 1 + \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1 + \phi \quad (أ)$$

$$\phi = \frac{\phi+1}{\phi} = 1 + \frac{1}{\phi} \quad \text{نستنتج } \phi^2 = \phi + 1$$

$$\phi^3 = \phi^2 \times \phi = (\phi+1) \times \phi = \phi^2 + \phi = \phi + 1 + \phi = 2\phi + 1 \quad (ج)$$

تمارين وسائل

8. أوجد الأعداد المعينة بالحروف x و y و z على المستقيم العددي:



9. عُلم على مستقيم مزود بمعلم (O, I) (الوحدة 1cm) النقاط الممثلة للأعداد الحقيقة التالية:

$$\cdot 2\pi ; \frac{\pi}{2} ; \sqrt{5} ; -\frac{3}{2} ; -\pi$$

10. عُلم على مستقيم مزود بمعلم (O, I) (الوحدة 3cm) النقاط الممثلة للأعداد الحقيقة التالية:

$$\cdot \frac{3\pi}{2} ; -\frac{\pi}{3} ; \frac{8}{3} ; 2,5 ; -2$$

مجموعات الأعداد

11. أكمل بأحد الرمزيين \in أو \notin :

$$\frac{1}{3} \dots D \quad 3,5 \dots Z \quad 10 \dots N$$

$$\frac{2\pi}{3} \dots R \quad \frac{\sqrt{2}}{3} \dots Q$$

12. عِين المجموعة (أو المجموعات) التي ينتمي إليها كل من الأعداد التالية:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} ; 2\sqrt{3} ; 125 ; -3 \quad (1)$$

$$2,75 ; 0 ; \pi ; -\frac{7}{3} \quad (2)$$

13. بين طبيعة كل من الأعداد:

$$C = \sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}-1} ; B = \frac{\pi}{3,14} ; A = \frac{-\sqrt{144}}{3}$$

14. لتكن I مجموعة الأعداد الحقيقة x حيث

أصحيح أم خطأ

ضع العلامة \times في الخانة (أو الخانات) المناسبة.

1. $\frac{1}{7}$ ينتمي إلى:

$$D \square \quad Z \square \quad N \square \\ .R \square \quad Q \square$$

2. من بين الأعداد التالية، العدد الطبيعي هو:

$$(1+\sqrt{2})^2 - 3 \square \quad \frac{\sqrt{52}}{\sqrt{13}} \square \quad \frac{(\sqrt{2})^4}{4} \square$$

3. من بين الأعداد الناطقة التالية، العدد غير العشري هو:

$$\frac{1}{3 \times 10^2} \square \quad \sqrt{0,81} \square \quad 6 \times 10^{-4} \square$$

4. من بين الأعداد التالية، العدد الأولي هو:

$$259 \square \quad 121 \square \quad 183 \square$$

5. التحليل المناسب للعدد 6270 هو:

$$2 \times 5 \times 11 \times 57 \square \\ 2^2 \times 5 \times 313 \square \\ 2 \times 3 \times 5 \times 11 \times 19 \square \\ 2 \times 3 \times 5 \times 209 \square$$


6. العدد $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3$ يساوي:

$$(1+2+3+4+5)^3 \square \quad 225 \square \quad 15^3 \square$$

تمثيل أعداد على المستقيم العددي

7. اعد رسم المستقيم (الوحدة 1cm) ثم ضع كلا من الأعداد الحقيقة التالية في الخانة المناسبة:

$$-1 ; 1 ; \frac{3}{2} ; \pi ; -\sqrt{5}$$



$$-4 \leq x \leq 3$$

1) ما هو عدد عناصر N التي تشملها I ؟

2) ما هو عدد عناصر Z التي تشملها I ؟

3) ما هو عدد عناصر Q التي تشملها I ؟

21. باستعمال الحاسبة دون لمسة الفاصلة احسب:

$$0,00038 \times 32,956 = 2$$

22. دون استعمال الحاسبة، أوجد الكتابات التي تعين نفس العدد:

$$(2 \times 50)^{-2} ; 100 ; \left(\frac{1}{10}\right)^2 ; 10^{-2} ; \frac{1}{100}$$

23. اخترل إلى أقصى حد الأعداد التالية ثم عين أصغر مجموعة ينتمي إليها كل منها:

$$-\frac{6\pi}{3}, \frac{16}{6} - \frac{11}{3}, \frac{7\pi + 14}{3\pi + 6}, \frac{0,21}{1,05}, \frac{2}{\sqrt{2} + 1} - 2\sqrt{2}$$

24. عين، بالاستعانة بحاسبة، الكتابة العشرية لكل من الأعداد التالية:

$$B = \frac{7}{2 \times 3 \times 4}, A = \frac{589 - 32}{633 + 917}, C = \sqrt{56,25 + 7,75} - 8$$

اكتب برنامج كل حساب.

25. اكتب برنامج الحساب الموافق لكل حساب:

$$\frac{3(a+1)}{a} + 2, \frac{3a+1}{a+2}, 3a + \frac{1}{a} + 2, \frac{3(a+1)}{a+2}, 3a + \frac{1}{a+2}$$

قوى عدد حقيقي

26. عين إشارة كل من الأعداد التالية:

$$(-3^3)^2; (-5)^8; -3^5; 10^{-3}; (-3)^5$$

27. احسب

$$2^3 + 3^2; 2^3 \times 3^3; 2^2 \times 3^3 \times 5; 2^2 \times 3^3 \quad (1)$$

15. انقل الجدول التالي وامض بوضع علامة \times عندما يكون العدد عنصرا من المجموعة كما في السطر الأول.

\mathbb{N}	\mathbb{Z}	\mathbb{D}	\mathbb{Q}	\mathbb{R}	
\times	\times	\times	\times	\times	58
					$\frac{3}{2}$
					$-\frac{15}{3}$
					$1,5 \times 10^3$
					2π
					$\frac{1}{100}$
					$\sqrt{64}$
					$(0,5)^2$

16. تعطى قائمة لأعداد

$$-10^3; 10^{-3}; 4 \times 10^{-2}; 3587; 3,503$$

$$\frac{1}{3}; \sqrt{0,25}; \sqrt{2}; 3,14; -\frac{22}{7}; -\frac{3}{100}$$

$$0; \sqrt{\sqrt{16}}; \sqrt{\pi}; \frac{2}{\pi}; -\frac{21}{6}$$

(1) ما هي الأعداد العشرية؟

(2) ما هي الأعداد الناطقة غير العشرية؟

(3) ما هي الأعداد غير الناطقة؟

17. بين أن الأعداد التالية ناطقة:

$$\frac{5}{40 \times 10^{-2}}, \frac{0,125}{62,5}; 120; -0,47; 2,5$$

18. اكتب الأعداد التالية على الشكل العشري.

$$3 \times 10^{-2}; 25000 \times 10^{-4}$$

$$52 \times 10^{-3}; 6,125 \times 10^4; 12 \times 10^6$$

19. اكتب كلا من العددين الناطقين التاليين على شكل كسر:

$$B = 34,1456 \dots \quad A = 0,027027\dots$$

20. عين من بين الأعداد الناطقة التالية الأعداد

العشرية.

$$2 \times \left(\frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{4}{5}\right)^2 ; \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times \left(\frac{3}{2}\right)^3 ; \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times 3^2 \quad (2)$$

$$\left(-\frac{5}{4}\right) \times \left(\frac{4}{5}\right)^2 \times \left(-\frac{2}{5}\right) ; \left(-\frac{1}{2}\right)^2 \times \left(-\frac{1}{3}\right)^3 \quad (3)$$

34. اكتب على الشكل $a\sqrt{b}$ حيث b أصغر ما

$$\text{يمكن: } \sqrt{3^2 + 4^2} ; \sqrt{\frac{75}{27}} ; \sqrt{6} \times \sqrt{48} ; \sqrt{200}$$

35. اكتب على الشكل $a\sqrt{b}$ حيث $a \in N$ و $b \in Z$

$$A = 2\sqrt{3} + 5\sqrt{12} - \sqrt{75}$$

$$B = 3\sqrt{80} - \sqrt{180} - \sqrt{90}$$

36. عين الأعداد المتساوية

$$\sqrt{8} - \sqrt{2} ; \frac{\sqrt{2}}{2} ; \frac{2}{\sqrt{2}} ; \frac{1}{\sqrt{2}} ; \sqrt{2}$$

37. احسب

$$E = \left(\frac{12 + 25\sqrt{6}}{6} \right) \div \left(1 + \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{1}{\sqrt{6}} + \sqrt{24} \right)$$

$$38. \text{ احسب مقلوب} \cdot \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

39. اختصر كتابة كل من الأعداد التالية

$$\sqrt{27} + \sqrt{48} ; \sqrt{1080} ; \sqrt{175} ; \sqrt{81} ; \sqrt{27} + 2\sqrt{75} - \sqrt{108} ; \sqrt{0,45}$$

$$; \sqrt{36} - 3\sqrt{6} + 5\sqrt{144} ; \sqrt{\frac{8}{9}} \times \sqrt{\frac{12}{25}} \times \sqrt{\frac{225}{24}}$$

40. انشر ثم اخترل

$$\begin{aligned} & (1-5\sqrt{2})^2 ; (2\sqrt{5}+3)^2 ; (1+\sqrt{2})^2 \\ & (1-\sqrt{2})(1+\sqrt{3}) \times 2\sqrt{2} ; (7-\sqrt{3})(7+\sqrt{3}) \end{aligned}$$

41. اكتب الأعداد التالية بمقامات ناطقة

$$\frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}} ; \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}+2} ; \frac{\sqrt{7}}{3\sqrt{5}} ; \frac{5}{2\sqrt{10}}$$

42. اخترل الأعداد التالية (تعطى النتائج بمقامات ناطقة)

$$A = \frac{2}{\sqrt{33}} \left(\frac{\sqrt{363}}{\sqrt{2}-1} \right) ; B = \frac{3\sqrt{360}-2\sqrt{180}}{\sqrt{10}-\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{2000} ; \frac{33}{375} ; -\frac{32}{105} ; \frac{71}{25} ; \frac{15}{4} ; -\frac{13}{12} ; \frac{3}{2}$$

$$A = \frac{(-2)^5 \times (-6)^3 \times (-3)^8}{(15)^2 \times (-12)^3} \quad 28. \text{ احسب}$$

29. اختصر العبارات التالية

$$B = 2^3 \times 2^4 \times 2^{-5} ; A = (2^3 \times 2^{-4})^2 \times (3^3)^2 \times 3^{-5}$$

$$D = (2^3 \times 3^2)^2 ; C = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times 3^3$$

$$E = \left(-\frac{1}{3}\right)^2 \times 5^{-2} \times \left(\frac{3}{5}\right)^3$$

$$F = \left(\frac{2}{7}\right)^4 \times \left(\frac{7}{4}\right)^2 \times \left(\frac{-49}{2}\right)^3$$

$$G = \left(\frac{2}{3}\right)^{-2} \times \left(\frac{3}{4}\right)^4 \times \left(\frac{27}{4}\right)^{-1}$$

30. اكتب الأعداد التالية على الشكل $2^n \times 5^m$

حيث n و m عدوان صحيحان نسييان.

$$c = \frac{(10^2)^3}{2^6 \times 5^6} ; b = \frac{25^3}{5^{-5}} ; a = \frac{2^4}{10^5}$$

31. اخترل وأعط النتيجة على شكل كسر غير قابل للاختزال.

$$B = \frac{(-5)^3 \times (-8)^3 \times (-9)^2}{(15)^2 \times (12)^2} ; A = \frac{12^5 \times 35^{-2}}{49^{-3} \times 21^4}$$

32. نعتبر العدد:

$$A = 987891236^2 - 987891235^2$$

(1) احسب بالاستعانة بالحاسبة العدد A .

(2) برر ، بالتمعن في رقم الآحاد، أن هذه النتيجة خاطئة.

(3) ضع $a = 987891236$. عبّر عن A بدلالة a ثم استنتج القيمة المضبوطة للعدد A .

الجذور التربيعية

33. عين من بين الكتابات التالية الأعداد الحقيقة

43. a و b عدوان حقيقيان يحققان:
 (1) $a^2 + b^2 = 2$ و $a + b = 1$
 (2) احسب ab .

51. تقدر سرعة الضوء بـ $3 \times 108 \text{ m.s}^{-1}$ والمسافة المتوسطة بين الأرض والشمس بـ $1.49 \times 10^6 \text{ km}$.

احسب الزمن اللازم لإشارة ضوئية معطاة من الأرض للوصول إلى الشمس.

52. أعط رتبة مقدار نتائج كل عدد مما يلي:

$$851,7 \times 0,0018 \times 0,073 \quad (1)$$

$$0,05 \times 1200 \times 10^{-3} \quad (2)$$

$$\frac{181,47}{78,956} \quad (3)$$

53. ردا على سؤال يتعلق بإيجاد عدد ذرات النحاس الموجودة في 1 mm^3 من النحاس، كانت الإجابة هي العدد $8,5 \times 10^{19}$.

ما هو رأيك في هذه الإجابة؟ إذاعلمت أن كتلة ذرة النحاس هي $1,05 \times 10^{-25} \text{ kg}$ وكتلة 1 mm^3 من هذا المعدن هي $8,96 \times 10^{-6} \text{ kg}$.

54. a و b عددان لهما على الترتيب كرتبة مقدار

$$7 \times 10^8 \text{ و } 6 \times 10^{-15}.$$

(1) عين رتبة مقدار a^2 ، $a^2 b^2$ ثم b^2 .

(2) عين رتبة مقدار ab و $(ab)^2$.
ماذا تستنتج؟

55. نصف قطر الكرة الأرضية 6371 km والكتلة الحجمية لها $5,5 \text{ g.cm}^{-3}$.
أعط تقديرًا بالأطنان لكتلتها.

الأعداد الأولية

56. اجب بصحيح أو خاطئ:

- كل الأعداد الفردية أولية.

- لا يوجد عدد زوجي أولي.

- يوجد عدد غير منته من الأعداد الأولية.

57. عين الأعداد الأولية من بين الأعداد التالية:
 150×10^{-3} ؛ $27,31 \times 10^3$ ؛ $0,095$ ؛ $251,3$.
 319 ؛ 405 ؛ 18 ؛ 23 ؛ 27 ؛ 43 ؛ 89 ؛ 101 .

(2) برهن أن $a^4 + b^4$ عدد عشري.
 (3) برهن بالحساب أن $a = \frac{1-\sqrt{3}}{2}$ و $b = \frac{1+\sqrt{3}}{2}$

يحققان الشرطين (1).

44. برهن صحة المساواة

$$1 + \sqrt{3} = \sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = \sqrt{2} \times \sqrt{2 + \sqrt{3}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2} + 1} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{4} + \sqrt{3}} = 1$$

45. تعتبر العبارة $E = x^2 - 3x + 4$ باستعمال حاسبة، احسب قيمة E من أجل $x = 1 + \sqrt{3}$.

القيم المقربة

46. احسب، بالاستعانة بالحاسبة، المدور إلى 10^{-3} لكل من الأعداد التالية:

$$\frac{3\sqrt{7}-9}{2}, \cos(80^\circ), \frac{\pi}{60}, \frac{2000}{7}$$

47. بالاستعانة بالحاسبة، أكمل الجدول التالي:

$1205\sqrt{3} \times 4.10^{-4}$	$\frac{3\pi}{2}$	
		المدور إلى 10^{-3}

48. من بين الأعداد التالية، عين الأعداد المكتوبة على الشكل العلمي ثم اكتب الأعداد الأخرى على هذا الشكل:

$$5,03 \times 10^{-4}, 6,5 \times 10^5, 12 \times 10^{-3}, -34,56 \times 10^{-2}$$

49. اكتب الأعداد التالية على الشكل العلمي ثم أعط رتبة مقدار هذه الأعداد.

$$150 \times 10^{-3}, 27,31 \times 10^3, 0,095, 251,3$$

58. هل العدد 259 أولي ؟

59. حل إلى جداء عوامل أولية.

$$7951 \quad ; \quad 2520$$

67. اكتب على الشكل $a\sqrt{b}$ كلا من الأعداد التالية:

$$\sqrt{20825} \quad ; \quad \sqrt{1000} \quad ; \quad \sqrt{845} \quad ; \quad \sqrt{74} \quad ; \quad \sqrt{54}$$

68. (1) حل 330 و 252 إلى جداء عوامل أولية.

(2) عين الشكل غير القابل لاختزال للعدد

$$\frac{315}{252} \quad \text{والكتابة المختصرة للعدد } \sqrt{252}.$$

69. نعتبر العدد $A = 2^3 \times 5^2 \times 7$

(1) تتحقق من أنّ A يقبل 24 قاسماً.

(2) أوجد أصغر عدد طبيعي k حيث يكون kA مربعاً لعدد طبيعي.

(3) أوجد أصغر عدد طبيعي m حيث يكون mA مكعباً لعدد طبيعي.

70. نعتبر الأعداد من الشكل $f_n = 2^{2^n} + 1$

(1) احسب الأعداد f_0, f_1, f_2, f_3 ، ثم تتحقق أنها أولية.

(2) بين أن f_5 عدد يقبل القسمة على 641.

71. نعتبر الأعداد من الشكل $1 - 2^n$ حيث n عدد أولي.

(1) تتحقق من أنّ هذا الشكل يعطي أعداداً أولية من أجل قيم n الممثلة في الأعداد الأولية الأولى.

(2) أوجد القيمة الأولى للعدد n التي من أجلها لا يعطي الشكل السابق عدداً أولياً.

72. (1) احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 45 و 105.

$$(2) \text{ اخترل } \frac{45}{105} \text{ و } \sqrt{45}.$$

(3) استنتج التحليل إلى عوامل أولية لكلٍ من 45×105 و 45^4 و 105^3 .

73. عدد صفحات كتابين هو 378 و 420 صفحة على الترتيب.

يتكون كل كتاب من عدد معين من الكرايس ذات نفس عدد الصفحات.

50. اكتب على الشكل العلمي العدد :

$$A = 9 \times 10^{-3} + 0,4 \times 10^{-2} - 9 \times 10^{-4}$$

(دون الحاسبة)

60. أكتب كلا من الأعداد الزوجية التالية على شكل مجموع عددين أوليين (يمكن أن يكونا متساوين):

$$20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 6$$

ما هو التخمين الذي تضعه ؟

61. نعتبر العبارة: $P(n) = n^2 + n - 41$

حيث n عدد طبيعي.

(1) احسب $P(0); P(1); P(2); P(3); P(4)$

(2) بين أنّ الأعداد الناتجة أولية.

(3) هل العبارة تعطي دائماً أعداداً أولية ؟

62. نسمي عدداً كاملاً العدد الطبيعي الذي يساوي مجموع قواسمه، باستثناء العدد نفسه.

مثال: العدد 6 كامل، لأنّ $1+2+3=6$.

عين العدد الكامل الوحيد المحصور بين 25 و 30.

63. (1) أنشر ثم بسط العبارة $(n+1)^2 - n^2$.

استنتاج أنّ كلّ عدد فردي يمكن كتابته كفرق مربعين.

(4) تتحقق من ذلك بواسطة العددين 45 و 13.

64. ليكن $S = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30}$

(1) احسب S .

(2) باعتبار n عدد طبيعي غير معدوم، اخترل

$$\text{العبارة } A = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

(3) احسب A من أجل قيم n التالية:

$$1, 2, 3, 4, 5$$

استنتاج طريقة أبسط لحساب S ثم أوجد هكذا قيمتها المعينة في السؤال (1).


65. اخترل باستعمال التحليل إلى جداء عوامل أولية.

$$B = \frac{6\sqrt{288} \times \sqrt{75}}{\sqrt{90} \times \sqrt{20}} \quad ; \quad A = \frac{(-4)^2 (-25)^3}{36 \times 10^2}$$

1) ما هو أكبر عدد الصفحات التي يمكن أن يتضمنها كراس؟

2) ما هو في هذه الحالة عدد الكراريس التي يتشكل منها كل كتاب؟

حيث، عند نزع مربع طول ضلعه l منه يبقى مستطيل له نفس شكل المستطيل الأول.



(1) بين أن ذلك

يترجم بالتناسب

$$\cdot \frac{L}{l} = \frac{l}{L-l}$$


80. 2) بوضع $c^2 - c - 1 = \frac{L}{l}$, بين أن $0 = c$

وتحقق أن هذا يعني $\frac{5}{4} = (c - 0,5)^2$ وأن الحل

$$c = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

الموجب الوحيد هو 81.

$CD = 4\text{ cm}$ و $CDA = 60^\circ$




نقطة من
القطعة $[AD]$
حيث المثلث
 CDE متقارب
الأضلاع.

عين القيمة المضبوطة للطول AE التي من أجلها يكون محيط شبه المنحرف $ABCE$ مساوياً محيط المثلث CDE .

82. ABC مثلث قائم في. نضع $BC = a$

و $AB = c$ و $AC = b$. نرسم نصف الدائرة التي قطرها $[BC]$ والذي يشمل A , ثم نرسم نصفى الدائرتين اللتين قطراهما $[AB]$ و $[AC]$ خارج المثلث ABC .



الجزء المظلل يمثل ما يسمى هلالية Hippocrate

1) ما هي مساحة المثلث ABC بدلالة a و b و c ؟

2) عبر بدلالة a و b و c عن مساحة كل من

66. اخترل الكسور التالية:

$$\frac{17303}{792}, \frac{585}{1275}, \frac{180}{126}, \frac{48}{75}$$

$$A^2 = 4^3 \times 15^4 \times 11^2.$$

74. ليكن

عین التحليل إلى عوامل أولية لكل من A و A^2 .

75. أوجد أصغر عدد طبيعي n حيث يكون $240 \times n$ مربع تماما.

مسائل

76. في عام 1998، اكتشف فريق من باحثين

أمريكيين CLARKSON-WOLTMAN-KUROWSKI

$p = 2^{3021^{377}} - 1$ أكبر عدد أولي عرف آنذاك:

أعط تقديرًا لعدد أرقام p .

77. 1) ABC مثلث متقارب الأضلاع، ضلعه 2.

(أ) عين ارتفاع هذا المثلث.

(ب) أنشئ، على مستقيم مدرج (الوحدة

5 cm)، النقطة ذات الفاصلة $\sqrt{3}$.

(1) بملحوظة أن $39 = 3 \times 13$ ، أوجد عددين


طبيعيين a و b حيث $(a+b)(a-b) = 39$.

(ب) استنتج طريقة لإنشاء العدد $\sqrt{39}$.

78. تسمح المزولة (جهاز تيودوليت) بقياس

زوايا واقعة في المستوى الشاقولي انطلاقاً من

المستوى الأفقي.



وضع الجهاز على بعد $64,3\text{ m}$ من عمارة.

عند التسديد نحو القمة، نقيس الزاوية α

30°

عند التسديد نحو القاعدة، نقيس الزاوية β ونجد

$2,45^\circ$

ما هو ارتفاع العمارة؟

- . $[BC]$ $[AC]$ $[AB]$.
- أنصاف الدوائر التي أقطارها a و b و c
79. لتمييز شكل مستطيل نستعمل النسبة بين طوله وعرضه.
- (3) استنتج مساحة الجزء المظلل بدلالة a و b و c
- (4) استخلص.
- نسمى مستطيلا ذهبيا، كل مستطيل بعاده L و l

2

الترتيب - المجالات - القيمة المطلقة

الكلمات المستهدفة

- اختيار معيار لمقارنة عددين.
- إيجاد حصر لعدد حقيقي.
- حصر عبارة جبرية.
- حصر عبارة تتضمن مقلوباً.
- حصر مجموع وجاء عددين حقيقيين.
- كتابة عبارة تشتمل رمز القيمة المطلقة على شكل عبارة مكافئة لها بدون رمز القيمة المطلقة.
- التعبير عن جزء متصل من \mathbb{R} بإحدى الصيغ الأربع: بمحال أو بحصر أو بمسافة أو باستعمال القيمة المطلقة.

π العدد العجيب

يعتبر العدد π عدداً عجيباً لما أثاره من تساؤلات وفضول لدى الكثير من العلماء والباحثين عبر العصور، ولقد ارتبط تاريخ هذا العدد بالمشكل المشهور والمعروف بإحاطة الدائرة، والذي آل إلى محاولة "إنشاء مربع مساحته تساوي مساحة قرص نصف قطره r باستعمال المسطرة والمدور" الأمر الذي آل

بدوره إلى إنشاء قطعة مستقيم طولها c حيث $c^2 = \pi r^2$. تم البرهان على استحالة هذا الإنشاء في القرن التاسع عشر وسمحت مختلف المحاولات بإعطاء قيم مقربة لهذا العدد.

والجدير بالذكر أن فكرة العدد π كانت معروفة عند القدماء على أنها نسبة طول محيط الدائرة إلى قطراها ولم تكن قد نضجت كما هو حالها الآن سواء من حيث القيم المقربة لها أو من حيث الرمز المعطى لها.

ونجد عند البابليين قاعدة تعطي العدد $\frac{1}{8} + 3$ كقيمة مقربة للعدد π ويستبدلها البعض بالعدد 3. كما نجد في مخطوط بردية **ريندا** التي عثر عليها في مصر

عام 1855 م، العدد $\left(\frac{16}{9}\right)^2$ قيمة مقربة للعدد π ، تم الحصول عليها باستعمال قاعدة تدعى قاعدة "التحفيف بالتسع" التي تسمح بحساب المساحة S

لقرص بمعرفة طول قطره D وهي: $S = \left(D - \frac{D}{9}\right)^2$

القاعدة يعود إلى تقريب مساحة قرص قطره D إلى مساحة ثمانية أضلاع ينجز انطلاقاً من مربع طول ضلعه D وهذا من أجل $D = 9$ ومنه تم الحصول


على التقريب $\left(\frac{16}{9}\right)^2$ للعدد π . وقام **أرخميدس** (287-212 ق.م.) بإحاطة

دائرة نصف قطرها 1 بين مضلعين منتظمين لهما 7×2 ضلعاً، فاستطاع أن يحصل في حالة مضلعين لهما 96 ضلعاً على الحصر التالي:

$$\frac{1}{7} < \frac{\text{المحيط}}{\text{القطر}} < \frac{10}{17} + 3 \quad \text{وهو بالترميز الحديث:}$$


$$3 + \frac{10}{17} < \pi < 3 + \frac{1}{7}.$$

إنشاء أرخميدس المحقق في
حالة مضلعين لكل منهما
 $2^1 \times 3$ ضلعاً



طول المضلع الداخلي 6

طول المضلع الخارجي 6,928




المسألة رقم 48 من مخطوط
بردية ريندا

وباستعمال نفس الإجراء، تمكن الرياضي العربي الكاشي حوالي 1429 م من الحصول على الأرقام العشرية الأربع عشرة الأولى للعدد π حيث ذكر ذلك في كتابه **رسالة المحيطية**. وباستعمال الوسائل الحديثة والقوية للحساب، تمكن الباحثون من اكتشاف أكثر من 1 241 100 000 000 1 رقماً عشرياً للعدد π عام 2002، ولا زالت البحوث في هذا المجال مستمرة.


أنشطة

نشاط 1: مقارنة أعداد (1)

(1) قارن مساحات المثلثات الآتية ذات نفس القاعدة b والمرسومة على شريط عرضه h :



(2) أ) رتب تصاعدياً، دون استعمال حاسبة، محيطات المستطيل والدائرة والمثلث المتقابض الأضلاع الآتية:



ب) نفس السؤال السابق مع استبدال المحيطات بالمساحات.

نشاط 2: مقارنة أعداد (2)

(1) رتب تصاعدياً الأعداد الآتية:

$$1 + \sqrt{3} ; 2,732 ; 2,82 ; \frac{14}{5}$$

(2) قارن، دون استعمال حاسبة، مع التبرير.

$$\frac{1}{2} \text{ و } \frac{1}{\sqrt{5}} ; 1,25^2 ; 0,25^2 ; \frac{5}{8} \text{ و } \frac{2}{3} ; \frac{13}{23} \text{ و } \frac{13}{21} ; \frac{7}{11} \text{ و } \frac{9}{11}$$

(3) قارن العددين A و B ، دون استعمال حاسبة، مع التبرير.

$$B = -\frac{3}{4} \times \frac{7}{5} \text{ و } A = -\frac{3}{4} \times \frac{5}{7} ; B = \frac{3}{2} \times \frac{3}{5} \text{ و } A = \frac{3}{2} \times \frac{5}{3}$$

نشاط 3: الحصر

نسكب 6 فارورات ماء سعة كل منها V لتر حيث $1,6 < V < 1,7$ ، في حوض مائي له شكل بلاطة قائمة بعدها قاعدتها a و b بالسنتيمتر يتحققان $20,5 < a < 20,6$ و $35,6 < b < 35,7$.

(1) تحقق من أن ارتفاع الماء y يتحقق $\cdot y = \frac{6V}{ab}$

(2) أعط حصراً للعدد y (إرشاد: يمكن كتابة $y = \frac{6V}{ab} = 6V \times \frac{1}{ab}$)

نشاط 4: المسافة

(1) ارسم مستقيماً عديداً (D) مبدأه O ثم علم عليه النقاط A ، B ، C ، D ذات الفواصل على الترتيب: 6 ، 10 ، -3 ، -5 .

(2) عين المسافات OA ، OB ، OC ، AB ، AC ، BC مع ذكر في كل مرة الإجراء المستعمل.

(3) نقطة من (D) فاصلتها x . برر $OM = \sqrt{x^2}$ ، ثم اكتب $\sqrt{x^2}$ دون رمز الجذر التربيعي، تبعاً لموضع النقطة M بالنسبة إلى المبدأ O .

الدرس

1. الترتيب في مجموعة الأعداد الحقيقية

تعريف 1

a و b عددان حقيقيان.

▪ القول إن a أكبر من b أو يساويه معناه $a - b$ عدد موجب.

ونكتب: $a \geq b$ معناه $a - b \in \mathbb{R}^+$

▪ القول أن a أصغر من b أو يساويه معناه أن $a - b$ عدد سالب.

ونكتب: $a \leq b$ معناه $a - b \in \mathbb{R}^-$

ملاحظة

$a > b$ معناه $a - b \in \mathbb{R}^+$ و $a \neq b$: نقول إن a أكبر من b , وعلى محور معلمه $(O; I)$ تكون النقطة A ذات الفاصلة a على يمين النقطة B التي فاصلتها b .



$a < b$ معناه $a - b \in \mathbb{R}^-$ و $a \neq b$: نقول إن a أصغر من b .

تعريف 1

مقارنة عددين a و b معناه التصريح بصحّة إحدى الحالات الثلاث الآتية:

$a = b$ •

$a > b$ •

$a < b$ •

يمكن إختبار مقارنة
عددين بالحاسبة وذلك
باستعمال المنسنة TEST

$1+24\left(\frac{2}{2}\right) \rightarrow A$
3.828427125
$7-\sqrt{11} \rightarrow B$
3.68337521
$A-B$
$.1450519151$

مثال:

من أجل $a = 1 + 2\sqrt{2}$ و $b = 7 - \sqrt{11}$ $a - b$ موجب تماما، وبالتالي $a > b$

برهنة 1

من أجل كل أعداد حقيقية a ، b ، c : إذا كان

$$a \leq c \quad \text{فإن} \quad \begin{cases} a \leq b \\ \text{و} \\ b \leq c \end{cases}$$

برهان
إذا كان $a \leq b$ و $b \leq c$ فإن $a - b \leq c - b$ سالبان، وبالتالي يكون مجموعهما سالبا،
أي أن $(a - b) + (b - c) = a - c$ سالب. لكن $(a - b) + (b - c) = a - c$ سالب. لذلك $a - c \in \mathbb{R}^-$ منه $a \leq c$ ، وهذا معناه

2 . الترتيب والعمليات

• الترتيب والجمع

برهنة 2

من أجل كل أعداد حقيقية a ، b ، c : إذا كان $a \leq b$ فإن

برهان

، $(a+c) - (b+c) = a - b \in \mathbb{R}^-$. لكن $a \leq b$

. $a + c \leq b + c$ ، وهذا يعني أن $(a+c) - (b+c) \in \mathbb{R}^-$

مثال

أستطيع أن أضيف نفس العدد إلى طرفي متباينة:

$$a \leq b - 3 \quad \xleftarrow{\text{أضيف } -5} \quad a + 5 \leq b + 2$$

مبرهنة 3

من أجل كل أعداد حقيقة d, c, b, a إذا كان $a \leq b$ فإن $c \leq d$ و $a + c \leq b + d$

إذا كان $a \leq b$ و $c \leq d$ ، فيكون، حسب المبرهنة 2: $a + c \leq b + c$ و $b + c \leq b + d$ و حسب المبرهنة 1: $a + c \leq b + d$

مثال

أستطيع أن أجمع طرفا بطرف متباينتين من نفس الاتجاه.

$$a + b \leq -1 \quad \xleftarrow{\text{أجمع طرفا بطرف}} \quad b \leq -3 \quad \text{و} \quad a \leq 2$$

• الترتيب والضرب

مبرهنة 4

أعداد a, b, c حقيقة.

من أجل $c > 0$ لدينا: $ac \leq bc$ يكافيء $a \leq b$

من أجل $c < 0$ لدينا: $ac \geq bc$ يكافيء $a \leq b$

برهان: لدينا $ac - bc = (a - b)c$

▪ من أجل $c > 0$

يكون للعددين $a - b$ و $ac - bc$ نفس الإشارة.

▪ $a - b \in \mathbb{R}^-$ يكافيء $a \leq b$

ينتاج عنه $ac \leq bc$ يكافيء $a - b \in \mathbb{R}^-$ وبالتالي $a \leq b$ يكافيء

▪ من أجل $c < 0$

يكون للعددين $a - b$ و $ac - bc$ إشارتين مختلفتين.

▪ $a - b \in \mathbb{R}^-$ يكافيء $a \leq b$

ينتاج عنه $ac \geq bc$ يكافيء $a - b \in \mathbb{R}^+$ وبالتالي $a \leq b$ يكافيء

مثال: أستطيع أن أضرب طرفي متباينة في نفس العدد الموجب :

$$a \leq 3b \quad \xleftarrow{\text{أضرب في } 10} \quad 0,1a \leq 0,3b$$

أستطيع أن أضرب طرفي متباينة في نفس العدد السالب بشرط أن أغير اتجاه المتباينة:

$$a \geq -10 \quad \leftarrow \quad \text{أضرب في } -2 \quad \rightarrow \quad -\frac{1}{2}a \leq 5$$

مبرهنة 5

- d, c, b, a أعداد حقيقة موجبة .
- إذا كان $c \leq d$ و $a \leq b$ فإن $ac \leq bd$

برهان

نفرض a, b, c, d أعداداً حقيقة موجبة حيث $a \leq b$ و $c \leq d$.

- إذا كان $b = 0$ أو $c = 0$ فإن $ac \leq bd$
- إذا كان $b \neq 0$ و $c \neq 0$ فإن $bc \leq bd$ و $ac \leq bc$ (حسب المبرهنة 4)، وبالتالي $ac \leq bd$ (حسب المبرهنة 1).

مثال

استطيع أن أضرب طرفي متباينتين من نفس الاتجاه، طرفاً بطرف، عندما يتعلق الأمر بأعداد موجبة:

$$ab \leq 5 \quad \leftarrow \quad \text{أضرب طرفاً بطرف} \quad b \leq 10 \quad \text{و} \quad a \leq \frac{1}{2}$$

3. قواعد المقارنة

مبرهنة 6

a, b عددين حقيقيان.

- من أجل $a \geq 0$ و $b \geq 0$ لدينا : $a^2 \leq b^2 \iff a \leq b$
- من أجل $a \leq 0$ و $b \leq 0$ لدينا : $a^2 \geq b^2 \iff a \leq b$

برهان

نعلم أن $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

- من أجل $a \geq 0$ و $b \geq 0$ لدينا $a+b \in \mathbb{R}^+$ ومنه العددان $a-b$ ، $a^2 - b^2$ من نفس الإشارات.
- وحيث أن $a-b \in \mathbb{R}^-$ يكافيء $a \leq b$ ينتج أن $a^2 - b^2 \in \mathbb{R}^-$ يكافيء $a-b \in \mathbb{R}^-$ وبالتالي $a^2 \leq b^2 \iff a \leq b$

- من أجل $a \leq 0$ و $b \leq 0$ لدينا

وحيث أن $a-b \in \mathbb{R}^-$ يكافيء $a \leq b$ ينتج أن $a^2 - b^2 \in \mathbb{R}^+$ يكافيء $a-b \in \mathbb{R}^-$ وبالتالي $a^2 \geq b^2 \iff a \leq b$

مثال

أرتّب مربعي عددين موجبين والجذرين التربيعيين لهما بنفس ترتيب هذين العددين وأرتّب مربعي عددين سالبيين في الاتجاه المعاكس لترتيبهما.

إذا كان $2 \leq a \leq 0$ ، فإن $a^2 \leq 4$ و $\sqrt{a} \leq \sqrt{2}$

مبرهنة 7

$a \leq b$ ، عددان حقيقيان موجبان لدينا : $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$ يكافيء $a \leq b$ إرشاد للبرهنة: لإثبات المبرهنة 7 يمكن الاعتماد على المبرهنة 6.

برهنة 8

$a \leq b$ ، عددان حقيقيان غير معدومين ومن نفس الإشارة لدينا: $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$ يكافيء $a \leq b$

إرشاد للبرهنة: يمكن الاستفادة من $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab}$

مثال

أربّب مقلوبي عددين حقيقيين غير معدومين ومن نفس الاشارة في الترتيب المعاكس لترتيبهما.

$$\text{إذا كان } a < 0, \text{ فإن } \frac{1}{a} \geq \frac{1}{2}$$

برهنة 9

a عدد حقيقي لدينا:

- إذا كان $0 \leq a \leq 1$ فإن $a^3 \leq a^2 \leq a$
- إذا كان $a \geq 1$ فإن $a^3 \geq a^2 \geq a$

برهان

▪ إذا كان $0 \leq a \leq 1$ ، فإن $a^2 \leq a$ وبالتالي $a^3 \leq a^2$. ومنه $a^3 \leq a^2 \leq a$.

▪ إذا كان $a \geq 1$ ، فإن $a^2 \geq a$ وبالتالي $a^3 \geq a^2 \geq a$. ومنه $a^3 \geq a^2 \geq a$.

ملاحظة: يمكن تعليم ترتيب قوى عدد حقيقي موجب a كما يلي:

إذا كان a محصوراً بين 0 و 1 ، فإن قوى a ترتتب ترتيباً تنازلياً.

إذا كان a أكبر من 1 ، فإن قوى a ترتتب ترتيباً تصاعدياً.

مثال

من أجل $a = 2$ ، لدينا $2^3 \geq 2^2 \geq 2$ ، و من أجل $a = \frac{1}{2}$ ، لدينا $\frac{1}{2^3} \leq \frac{1}{2^2} \leq \frac{1}{2}$

4. المجالات

تعريف

$a \leq b$ عددان حقيقيان حيث $a \leq b$.




نسمي مجالاً مغلقاً حداه a و b ، مجموعة الأعداد الحقيقة x حيث $a \leq x \leq b$ و نرمز إليه بالرّمز $[a ; b]$.

• تمثيل مجال

يمثل المجال $[a ; b]$ هندسياً بالشكل الآتي حيث A و B نقطتان فاصلتاهم a و b على الترتيب.



• أنواع المجالات

يُمثل على المستقيم العددي بالشكل ...	هو مجموعة الأعداد الحقيقة x حيث ...	المجال الذي يُرمز إليه ...
	$a \leq x \leq b$	$[a ; b]$
	$a \leq x < b$	$[a ; b[$
	$a < x \leq b$	$]a ; b]$
	$a < x < b$	$]a ; b[$
	$x \leq b$	$] -\infty ; b]$
	$x < b$	$] -\infty ; b [$
	$x \geq a$	$[a ; +\infty [$
	$x > b$	$]a ; +\infty [$

في المجال المغلق $[a ; b]$ ، العارضتان موجهتان نحو الداخل.
 $[a ; b[$ هو مجال مفتوح، العارضتان موجهتان نحو الخارج.

ملاحظات

- a و b ينتميان إلى المجال $[a ; b]$ ولا ينتميان إلى المجال $[a ; b[$.
- الرمزان $-\infty$ و $+\infty$ (يقرآن: ناقص لانهاية ، زائد لانهاية) لا يمثلان عددين حقيقيين وبالتالي تكون العارضتان مفتوحتتين عندهما.

• تقاطع وإتحاد مجالين

تعريف

- تقاطع مجالين I و J هو مجموعة الأعداد الحقيقة التي تنتهي إلى I و J ، ونرمز إليه بالرمز $I \cap J$.
- إتحاد مجالين I و J هو مجموعة الأعداد الحقيقة التي تنتهي إلى I أو J ، ونرمز إليه بالرمز $I \cup J$.

أمثلة

- $[0 ; 2] \cap [1 ; 5]$ هو مجموعة الأعداد الحقيقة x حيث $0 \leq x \leq 2$ و $1 < x \leq 5$



$$[0; 2] \cap]1; 5] =]1; 2]$$

$x \geq 2$ و $-4 < x \leq 3$ حيث هو مجموعة الأعداد الحقيقية x




5. القيمة المطلقة والمسافة

• القيمة المطلقة لعدد حقيقي

تعريف

عند حقيقي، M نقطة من مستقيم مزود بمعلم (O, I) فاصلتها x . القيمة المطلقة للعدد x هي المسافة OM ، ونرمز إليها بالرّمز $|x|$. ونكتب



نتائج:

- بما أن المسافة موجبة فإن $|x| \geq 0$ من أجل كل عدد حقيقي x .
- من أجل كل عدد حقيقي x : $\begin{cases} |x| = x & ; x \in [0; +\infty[\\ |x| = -x & ; x \in]-\infty; 0] \end{cases}$

أمثلة

$1 - \sqrt{2}$
-0.4142135624

- من أجل $x = \sqrt{3}$ ، العدد x موجب، وبالتالي $|\sqrt{3}| = \sqrt{3}$
- من أجل $x = 1 - \sqrt{2}$ ، العدد x سالب، وبالتالي $|1 - \sqrt{2}| = -(1 - \sqrt{2}) = \sqrt{2} - 1$
- $|0| = 0$

abs(-3)
■ 3

ملاحظة: يمكن حساب القيمة المطلقة لعدد حقيقي x باستعمال الدالة $abs()$ للحاسبة.

خواص

بفرض x و y عددين حقيقيين، لدينا:

$$\begin{aligned} |-x| &= |x| & \blacksquare \\ \sqrt{x^2} &= |x| & \blacksquare \\ |xy| &= |x| \times |y| & \blacksquare \end{aligned}$$

$$y \neq 0 \text{ مع } \left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|} \quad \blacksquare$$

(المتباعدة المثلثية) $|x+y| \leq |x| + |y| \quad \blacksquare$

ملاحظة

المتباعدة المثلثية تصبح $|x+y| = |x| + |y|$ عندما يكون العددان x و y من نفس الإشارات.

أمثلة

- $|2| = |-2| = 2$ العدد ومعاكسه لهما نفس القيمة المطلقة: 2
- $. 1 - 2\sqrt{3} \in R^-$ لأن $\sqrt{(1-2\sqrt{3})^2} = |1-2\sqrt{3}| = 2\sqrt{3} - 1$
- $. |-3(x-2)| = |-3| \times |x-2| = 3|x-2|$
- $|x-3| \leq |x| + 3$ منه $|x-3| \leq |x| + |-3|$

• المسافة بين نقطتين


مبرهنة 10:

إذا كانت A ، B نقطتان من مستقيم مزود بعلم (O,I) فاصلتاهم a ، b على الترتيب فإن

$$AB = |a - b| = |b - a|$$

برهان

نقتصر على الوضعية التي تكون فيها النقطة B على يمين النقطة A أي $b \geq a$ وبالتالي $|b - a| = b - a$ لأن الوضعية الأخرى تبرهن بنفس الكيفية، ونميز ثلاثة حالات:
 أ) النقطتان A ، B على يمين النقطة O .



$$AB = OB - OA = b - a$$

ب) النقطتان A ، B على يسار النقطة O .

$$AB = OA - OB = -a - (-b) = b - a$$


ج) النقطة O بين النقطتين A ، B .

$$AB = OA + OB = -a + b = b - a$$

وجدنا في كل الحالات:

$$AB = |b - a|$$

مثال:



$$AB = |-2 - (-5)| = |-5 - (-2)| = 3 \bullet$$

$$AB = |-1,5 - 3| = |3 - (-1,5)| = 4,5 \bullet$$

• المسافة بين عددين حقيقيين

تعريف

المسافة بين عددين حقيقيين a و b هي العدد $(|b-a| \text{ أو } |a-b|)$

$$d(a; b) = |a - b| = |b - a|$$

أمثلة

$$d(4;5) = |4 - 5| = 1 \quad , \quad d(0;-3) = |0 - (-3)| = 3$$

$$d\left(-11; \frac{17}{3}\right) = \left|-11 - \frac{17}{3}\right| = \frac{50}{3} \quad , \quad d(-2,7;-3) = |-2,7 - (-3)| = 0,3$$

• الحصر تعريف

حصر عدد حقيقي x يعني إيجاد عددين a و b حيث $a \leq x \leq b$.

مثال

باستعمال حاسبة، نحصل على: $\sqrt{5} \approx 2,23607$ وهي القيمة المدورّة للعدد $\sqrt{5}$ إلى 10^{-5} .

م(5)
2.236067977

$2 \leq \sqrt{5} \leq 3$ هو حصر العدد $\sqrt{5}$ ، بالتقريب إلى الوحدة.

$2,23 \leq \sqrt{5} \leq 2,24$ هو حصر العدد $\sqrt{5}$ ، بالتقريب إلى 10^{-2} .

• القيمة المطلقة، المسافة، المجال والحصر

مبرهنة 11

c عدد حقيقي ، r عدد حقيقي موجب.

من أجل كل عدد حقيقي x ، $|x - c| \leq r$ معناه

برهان

▪ نبرهن أنّه إذا كان $x \in [c - r; c + r]$ فإن $|x - c| \leq r$.

ليكن x عدداً حقيقياً حيث $|x - c| \leq r$.

- إذا كان $x \geq c$ فإن $|x - c| = x - c$ ويكون $x - c \in R^+$ وبالتالي

$c - r \leq x \leq c + r$ ، $c \leq x \leq c + r$ ، وبالتالي

- إذا كان $x \leq c$ فإن $|x - c| = c - x$ ويكون $x - c \in R^-$ وبالتالي

$c - r \leq x \leq c + r$ ، $c - r \leq x \leq c$ ، وبالتالي

يتضح أنّ في الحالتين لدينا $c - r \leq x \leq c + r$.

▪ نبرهن أنّه إذا كان $x \in [c - r; c + r]$ فإن $|x - c| \leq r$

ليكن x عدداً حقيقياً من المجال $[c - r; c + r]$ ، أي $c - r \leq x \leq c + r$ ومنه $c - r \leq x - c \leq r$.

لدينا من جهة $x - c \leq r$.

ومن جهة أخرى $-r \leq x - c$ ، ومنه $-r \leq x - c \leq r$.


وبما أنّ $|x - c| \leq r$ يساوي إما $x - c$ وإما $c - x$ ، نستخلص

أمثلة

. $x \in [2;4]$ أي $-1 \leq x - 3 \leq 1$ معناه $|x - 3| \leq 1$

. $x \in [-4;4]$ أي $-4 \leq x \leq 4$ معناه $|x| \leq 4$

$$x \in [-4; -1] \text{ أي } -\frac{3}{2} \leq x + \frac{5}{2} \leq \frac{3}{2} \text{ معناه } \left| x + \frac{5}{2} \right| \leq \frac{3}{2}$$




عناصر المجال:

يتميز المجال $[a;b]$ بالعناصر الآتية:

- **مركزه** ، وهو العدد الحقيقي $c = \frac{a+b}{2}$
- **طوله** ، وهو العدد الحقيقي الموجب $b-a$
- **نصف قطره** ، وهو العدد الحقيقي الموجب $r = \frac{b-a}{2}$

نتيجة

c عدد حقيقي كيقي و r عدد حقيقي موجب. من أجل كل عدد حقيقي x ، النصوص الآتية متكافئة:



- $x \in [c-r; c+r]$ (في صيغة مجال)
- $c-r \leq x \leq c+r$ (في صيغة حصر)
- $d(c; x) \leq r$ (في صيغة مسافة)
- $|x - c| \leq r$ (في صيغة قيمة مطلقة)

مثال

القيمة المطلقة	المسافة	الحصر	المجال	التمثيل
$\left x - \frac{3}{2} \right \leq \frac{7}{2}$	$d\left(x; \frac{3}{2}\right) \leq \frac{7}{2}$	$-2 \leq x \leq 5$	$x \in [-2; 5]$	

6. القيم المقربة لعدد حقيقي

تعريف

فرض عدد حقيقي a وعدد عشري d وعدد طبيعي n . القول أن d قيمة مقربة عشرية إلى 10^{-n} للعدد a معناه المسافة من a إلى d أصغر من 10^{-n} . بعبارة أخرى $|a - d| < 10^{-n}$. وتبعد لكون $d \leq a$ أو $d \geq a$ ، نتحدث عن قيمة مقربة بالقصان أو بالزيادة.

مثال

الحاسبة تظهر من أجل $\cos 20^\circ$ العدد 0,9396926208 .

يمكن أن نستنتج مثلا $0,93 < \cos 20^\circ < 0,94$.

و $0,93$ و $0,94$ هما قيمتان مقربتان للعدد $\cos 20^\circ$ ، إلى 10^{-2} ، إلى النقصان وبالزيادة على الترتيب.

كل عدد عشري من المجال $[0,93; 0,94]$ هو قيمة مقربة للعدد $\cos 20^\circ$ إلى 10^{-2} ، لأنّه موجود على مسافة أصغر من 10^{-2} بالنسبة إلى $\cos 20^\circ$.

طرائق وتمارين محلولة

• مقارنة عددين حقيقيين (1)

قارن العددين الحقيقيين:

$$\cdot \frac{472}{95} \text{ و } \frac{159}{32} ; \quad \frac{17}{21} \text{ و } \frac{19}{13} ; \quad \frac{22}{7} \text{ و } 152,13 ; \quad \pi \text{ و } 152,125$$

حل

- 152,13 و 152,125 عددان عشريان لهما نفس الجزء الصحيح. لمقارنتهما نعتبر الجزأين العشريين فيهما ونجد: $152,125 < 152,13$.

- لمقارنة العددين π و $\frac{22}{7}$ ، يمكن استعمال الحاسبة

π	3.141592654
$\frac{22}{7}$	3.142857143

ونجد:

الرقمان الممثلان للجزأين من الألف مختلفان.

وكون $1 > 2$ فإنّ $\frac{22}{7} > \pi$

- بمقارنة كلا من الكسرتين بالعدد 1 ، نجد:

$$\cdot \frac{19}{13} > \frac{17}{21} < \frac{17}{21} \text{ و نستنتج } \frac{19}{13} > 1$$

تعاليل
نستعمل طريقة مقارنة عددين عشريين.

الحاسبة تعطي قيماً مقربة في شكل كتابة عشرية، تتم المقارنة كما في المثال الأول.

عند المقارنة بالعدد 1 ، نلاحظ البسط والمقام في كلّ كسر:

- إذا كان البسط أكبر من المقام فإنّ الكسر أكبر من الوحدة.
- إذا كان البسط أصغر من المقام فإنّ الكسر أصغر من الوحدة.

عند حساب الفرق، نستعمل الطريقة المذكورة في الصفحة 12، التمرين 4. ثم ندرس إشارة الفرق.

- نحسب الفرق $\frac{159}{32} - \frac{472}{95}$ ونجد:

$$\frac{159}{32} - \frac{472}{95} = \frac{95 \times 159 - 32 \times 472}{3040} = \frac{15105 - 15104}{3040} \\ = \frac{1}{3040}$$

وكون $\frac{1}{3040} > 0$ نستنتج $\frac{159}{32} > \frac{472}{95}$

طريقة

لمقارنة عددين حقيقيين، يمكن:

- استعمال الحاسبة للحصول على قيمة مقربة.

- مقارنة كل من العددين بعدد ثالث.
- دراسة إشارة الفرق.

• مقارنة عددين حقيقيين (2)

قارن العددين الحقيقيين:

$$\pi^3 \text{ و } \pi^2 \text{ و } \pi \quad ; \quad \frac{1}{2^3} \text{ و } \frac{1}{2^2} \text{ و } \frac{1}{2} \quad ; \quad \sqrt{6-2\sqrt{5}} \text{ و } 1-\sqrt{5}$$

حل	تعاليل
<ul style="list-style-type: none"> ▪ نضع $B = \sqrt{6-2\sqrt{5}}$ و $A = 1-\sqrt{5}$ ثم نحسب A^2 و B^2 $A^2 = (1-\sqrt{5})^2 = 1^2 - 2\sqrt{5} + (\sqrt{5})^2 = 6 - 2\sqrt{5}$ $B^2 = (\sqrt{6-2\sqrt{5}})^2 = 6 - 2\sqrt{5}$ <p>نلاحظ أن $A^2 = B^2 \in R^-$ وكون $A^2 = B^2 \in R^-$ ، نستنتج: $. A = -B$</p>	نستعمل المتطابقات الشهيرة لحساب مربع العددين.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ المطلوب هو مقارنة قوى عدد حقيقي a في حالة $a < 1$ $\frac{1}{2} > \frac{1}{2^2} > \frac{1}{2^3}$ <p>نجد:</p>	طبق قواعد مقارنة قوى عدد حقيقي a (المبرهنة 6).
<ul style="list-style-type: none"> ▪ المطلوب هو مقارنة قوى عدد حقيقي a في حالة $a > 1$ $\pi < \pi^2 < \pi^3$ <p>نجد:</p>	

طريقة

لمقارنة عددين يتضمانان جذوراً تربيعية، يمكن مقارنة مربعيهما.

إذا كان مربعاً عددين متساوين فإن هذين العددين متساويان أو متعاكسان:

$$\text{إذا كان } A = B \text{ فإن } A^2 = B^2 \text{ أو } A = -B \text{ فإن } A^2 = B^2$$

• مقارنة عددين حقيقيين (3)

$$x \text{ عدد حقيقي حيث } x \geq 1 \text{ ، برهن صحة المتباينتين: } 3x+1 \leq 4 \text{ و } 2-5x \leq -3$$

حل	تعاليل
<ul style="list-style-type: none"> ▪ لدينا $x \geq 1$ وبضرب طرفي المتباينة في العدد السالب -5 ، نحصل على $-5x \leq -5$. ثم بإضافة 2 ، نستخلص: $2-5x \leq -3$. 	طبق خواص المتباينات.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ لدينا $x \geq 1$ وبالتالي $3x+1 \geq 4$ وذلك بالاستدلال كما في السؤال السابق. وكون العددين الحقيقيين الموجبين $3x+1$ و 4 مرتبين في الترتيب المضاد لمقلوبهما، نستخلص: $\frac{1}{3x+1} \leq \frac{1}{4}$ 	

طريقة

لمقارنة عددين حقيقين مكتوبين على الشكل الجبري، يمكن استعمال خواص المتباينات على التوالي.

• إيجاد حصر لعدد حقيقي

▪ حصر مجموع وجداء

$a \times b$ عددان حقيقيان حيث $3 \leq a \leq 8$ و $7 \leq b \leq 1$. احصر العددين $a+b$ و $a \times b$

▪ حصر فرق وحاصل قسمة

بنفس المعطيات السابقة، أحصر العددين $a-b$ و $\frac{a}{b}$

حل

تعالق

▪ باستعمال قاعدة الجمع طرفا بطرف للمتباينات، نطبق خواص المتباينات.

نجد:

$$4 \leq a+b \leq 15$$

كون الأعداد الستة موجبة وبالضرب طرفا بطرف

نجد:

$$3 \leq ab \leq 56$$

▪ نكتب $a-b$ على الشكل $a+(-b)$.
بضرب المتباينة المضاعفة $7 \leq b \leq 1$ في العدد

السالب (-1)

$$-7 \leq -b \leq -1$$

وبالجمع طرفا بطرف نجد:

$$3 \leq a \leq 8$$

$$-7 \leq -b \leq -1$$

$$\hline -4 \leq a-b \leq 7$$

نكتب $\frac{a}{b}$ على الشكل $a \times \left(\frac{1}{b}\right)$

الأعداد $1, b, 7$ من نفس الإشارة و $7 \leq b \leq 1$ فيكون

$$\cdot \frac{1}{7} \leq \frac{1}{b} \leq 1$$

وكون الأعداد $3, a, 8, \frac{1}{b}, \frac{1}{7}, 1$ موجبة وبالضرب

$$\frac{3}{7} \leq \frac{a}{b} \leq 8$$

لا يصلح الطرح طرفا لطرف كما هو الشأن مع قاعدة الجمع طرفا لطرف !!

لا تصلح القسمة طرفا لطرف كما هو الشأن مع قاعدة الضرب طرفا لطرف في حالة الأعداد الموجبة تماما !!

طريقة

لحصر فرق أو حاصل القسمة نتذكر أن الطرح يعني إضافة المعاكس والقسمة تعني الضرب في المقلوب.

إعادة استثمار

مستطيل طوله L وعرضه l حيث $[L \in 134; 135]$ و $[l \in 25; 26]$.
أعط حصار للمحيط P وللمساحة H ولل قطر D المستطيل.

• حل معادلة أو متراجحة تتضمن القيمة المطلقة

حل المعادلات والمتراجحات الآتية:

$$|x+3| < |x-5| \quad (3)$$


$$|x+3| = |x-5| \quad (2)$$

$$|x+3| = 4 \quad (1)$$

حل

تعاليف

1. على مستقيم مدرج، نسمي M النقطة التي فاصلتها x .
 $|x+3|$ هي المسافة من النقطة M إلى النقطة A ذات الفاصلة -



$$\begin{aligned} &|x+3| = 4 \\ &MA = 4 \end{aligned}$$


نعيّن عن القيمة المطلقة
بعبارات المسافة على المستقيم
العدي.

توجد عندَ نقطتان متاظرتان بالنسبة إلى A ، المسافة من كلّ
منهما إلى A هي 4 : هما النقطتان اللتان فاصلتاها -7 و 1.
منه مجموعة حلول المعادلة: $S_1 = \{-7; 1\}$

2. على مستقيم مدرج، نسمي M النقطة التي فاصلتها x .
 $|x+3|$ هي المسافة من النقطة M إلى النقطة A ذات الفاصلة -

- 3
 $|x-5|$ هي المسافة من النقطة M إلى النقطة B ذات الفاصلة
 5

$$M \in (AB) \quad MA=MB \quad |x+3| = |x-5|$$



هذا يعني أنّ M منتصف $[AB]$. فاصلة M هي I $\frac{-3+5}{2} = 1$
منه مجموعة حلول المعادلة: $S_2 = \{1\}$

3. بنفس الفرضيات والشكل كما في السؤال (2)،

$$MA < MB \quad |x+3| < |x-5|$$

هذا يعني أنّ النقطة M تكون أقرب من النقطة A عنه من B . إذا فرضنا I منتصف $[AB]$ ، فإنّ النقطة M تكون أقرب من النقطة A عندما تكون قبل I أي من أجل كلّ النقاط ذات فاصل أصغر تماماً من 1.

طريقة

لحل معادلة أو متراجحة تتضمن فيما مطلقة، نعيّن عن القيم المطلقة بعبارات المسافة على المستقيم العدي ونترجم المساويات أو المتباينات بعبارات المسافة بين نقطتين.

حل المعادلة والمترابطة الآتية

$|x+4| \leq 2$ ، $|x+3| + |x-5| = 8$

الهدف: إعطاء معنى للاستلزم والتكافؤ

① الاستلزم

تصادفنا في بعض النصوص العبارة "إذا كان ... فإن ... "، مثل:

- إذا كان $ABCD$ متوازي الأضلاع فإن $[AC]$ و $[BD]$ متقاطعان.

- إذا كان لعددين حقيقيين نفس المربع فإنهما متساويان أو متعاكسان.

عموماً، إذا كان P فإن Q ، حيث P هي **الفرضية** و Q هي **النتيجة**، نقول أن P تستلزم Q

تمرين 1: في كلّ نصٍ من النصوص الآتية، عين الفرضية والنتيجة ثم أعد التحرير باستعمال الصيغة: "إذا كان ... فإن ... ":

- (1) العدد المحسور بين 0 و 1 يكون أكبر من مربعه.

- (2) المستقيمان اللذان لهما نفس معامل التوجيه متوازيان.

- (3) متوازي الأضلاع الذي له زاوية قائمة يكون مستطيلاً.

تمرين 2: بين إن كان كلّ نصٍ (قضية) من النصوص الآتية، صحيحاً أم خاطئاً مبرراً إجابتك.

- (1) إذا كان $ABCD$ مربعاً فإنَّ القطريْن $[AC]$ و $[BD]$ متعامدان.

- (2) إذا كان في مضلع $ABCD$ القطران $[AC]$ و $[BD]$ متعامدان فإنَّ $ABCD$ مستطيل.

$$(3) \text{ إذا كان } 2a \geq 5b \text{ - فإنَّ } b - \frac{5}{2}a \leq 0.$$

② التكافؤ

نعلم أنَّه:

- إذا كان $ABCD$ رباعي متوازي أضلاع فإنَّ قطريه $[AC]$ و $[BD]$ متقاطعان.

- إذا كان القطران $[AC]$ و $[BD]$ في رباعي $ABCD$ متقاطفين فإنَّه متوازي أضلاع.

إذا رمزاً بالرمز P إلى النص $ABCD$ رباعي متوازي أضلاع

و بالرمز Q إلى النص $ABCD$ متقاطفين

نجد P يستلزم Q و Q يستلزم P في آن واحد.

- نقول إنَّ النصَّين P و Q متكافئان. ونقرأ " P يكافي Q " أو " P إذا وفقط إذا Q ".

- نقول عن الاستلزمتين السابقتين أنَّ كلَّ منها عكس الآخر.

تمرين 3: أنقل ثم أكمل الجدول ب الصحيح (ص) أو خاطئ (خ).

المعطيات	P	Q	P يستلزم Q	Q	P	Q يكافي P
x عدد حقيقي				$x = -2$ أو $x = 2$	$ x = 2$	
x و y عددان حقيقيان				$x > 0$ و $y > 0$	$xy > 0$	
أربع نقاط من المستوى				$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$	$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$	D, C, B, A

إعادة استثمار: لترير الخاصية " M منتصف $[AB]$ " ، دار هذا الحديث بين تلميذين، المطلوب مناقشة كل اقتراح: أمين: " بما أنّ $AM = \frac{1}{2} AB$ ، فانّ M منتصف $[AB]$ ".

استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال

تقريب \sqrt{N} بطريقة Héron

الهدف: ترجمة طريقة Héron هندسياً والتحقق باستعمال حاسبة و مجدول

• الطريقة الهندسية

الغرض من هذا النشاط هو تقريب $\sqrt{30}$ مثلاً.

- أنشئ مستطيلاً طوله L يساوي 15 وعرضه ℓ يساوي 2 بحيث تكون مساحته مساوية 30.
- باعتبار أنّ بعدي هذا المستطيل مختلفان كثيراً، أنشئ مستطيلاً جديداً حيث يكون طوله L' مساوياً الوسط الحسابي للبعدين L و ℓ ($L' = \frac{L+\ell}{2}$) ومساحته هي أيضاً 30.
- (إنّ اللجوء إلى الوسط الحسابي من شأنه تقليص الاختلاف بين بعدي المستطيل).
- أعد التجربة مرة ثانية ثم مرة ثالثة. ماذا تلاحظ؟ ما هو شكل المستطيل الأخير وما هما بعدها بالتقريب؟

• التحقق بحاسبة

انقل ثم أكمل الجدول التالي:

المستطيل رقم	L (كسر)	ℓ (كسر)	L (مدور إلى 10^{-6})	ℓ (مدور إلى 10^{-6})
1	15	2	15,000 000	2,000 000
2				
3				
4				

- قارن الأعداد المحصل عليها في الخانات المظللة مع قيمة الظاهر على الحاسبة.
- هل هذه النتائج تؤكّد الملاحظة المسجلة عند الترجمة الهندسية؟

• التحقق بمجدول

	A	B
1	L	ℓ
2	15,000,000,000,000,000	2,000,000,000,000,000
3	8,500,000,000,000,000	3,529,411,764,705,880
4	6,014,705,882,352,940	4,987,775,061,124,690
5	5,501,240,471,738,820	5,453,315,512,040,810
6	5,477,277,991,889,810	5,477,173,158,715,130
7	5,477,225,575,302,470	5,477,225,574,800,850
8	5,477,225,575,051,660	5,477,225,575,051,660
9	5,477,225,575,051,660	5,477,225,575,051,660
10	5,477,225,575,051,660	5,477,225,575,051,660

الشكل المقابل يمثل ورقة مجدول تسمح بحساب قيمة م دورة إلى 10^{-14} لكل من L و ℓ . للحصول على هذه الدقة، ينبغي برمجة المجدول إلى 14 رقماً عشرياً.

- ما هي الدساتير المكتوبة في الخلتين A3 و B3 و المنقولة إلى الأسفل؟

2. ما هو عدد الخطوات الضرورية للحصول على قيمة مقربة إلى 10^{-5} ، 10^{-12} للعدد

$\sqrt[3]{30}$

حل مسألة إدماجية

(1) ليكن a عدداً حقيقياً موجباً تماماً ويختلف عن $\sqrt{2}$.

أ) بين أن a و $\frac{2}{a}$ يحصان $\sqrt{2}$.

ب) قارن $\frac{1}{2} \left(a + \frac{2}{a} \right)$ و $\sqrt{2}$ (العدد


(2) عُلم على المستقيم العددي النقط ذات الفواصل a ، $\frac{2}{a}$ ، $\sqrt{2}$.

لوَّن بالأزرق أصغر مجال يشمل $\sqrt{2}$. ما هو الحصر المحصل عليه عندئذ؟

(3) انطلاقاً من $a = 1$ وبتعويض a بالقيمة المضبوطة للعدد

السابقة حسراً جديداً للعدد $\sqrt{2}$. هل هذا الحصر أفضل من الحصر المحصل عليه في السؤال (2)؟

(1) في الحالة $a < \sqrt{2}$:



☞ من أجل كل قيمة مقربة a للعدد $\sqrt{2}$

يمكن أن نعطي قيمة مقربة أخرى للعدد $\sqrt{2}$ تكون أفضل هي الوسط الحسابي

$$\cdot \frac{1}{2} \left(a + \frac{2}{a} \right)$$

(3) انطلاقاً من $a = 1$ ، نجد:

$$< \sqrt{2} < \frac{3}{2} \quad \text{وبالتالي} \quad \frac{1}{2} \left(a + \frac{2}{a} \right) = \frac{3}{2}$$

وبتعويض a بالقيمة المضبوطة للعدد $\frac{3}{2}$ ، أي $\frac{3}{2}$ ، نجد:

$$\frac{1}{2} \left(a + \frac{2}{a} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} + \frac{4}{3} \right) = \frac{17}{12} \quad \text{و} \quad \frac{2}{a} = \frac{4}{3}$$

وبالتالي:

(1) للإجابة، نميز حالتين:

$$0 < a < \sqrt{2}$$

بالمرور إلى مقارنة المقلوبين، نجد $\frac{1}{\sqrt{2}} < \frac{1}{a}$ وبالتالي $\frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} < \frac{2}{a}$. وكون $\frac{2}{\sqrt{2}}$ نحصل على:

$$a < \sqrt{2} < \frac{2}{a} \quad \text{ومنه الحصر} \quad \sqrt{2} < a$$

نجد بالمثل $\frac{2}{a} < \frac{1}{\sqrt{2}}$ ومنه $\frac{1}{a} < \frac{1}{\sqrt{2}}$ أي أن:

$$\frac{2}{a} < \sqrt{2} < a$$

هكذا يكون في الحالتين a و $\frac{2}{a}$ يحصان $\sqrt{2}$.

(2) لمقارنة العددين $\sqrt{2}$ و $\frac{1}{2} \left(a + \frac{2}{a} \right)$ ، ندرس إشارة فرقهما:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \left(a + \frac{2}{a} \right) - \sqrt{2} &= \frac{1}{2} \left(a + \frac{2}{a} - 2\sqrt{2} \right) \\ &= \frac{1}{2a} \left(a^2 + 2 - 2a\sqrt{2} \right) \\ &= \frac{1}{2a} \left(a - \sqrt{2} \right)^2 \end{aligned}$$

$\frac{4}{3} < \sqrt{2} < \frac{17}{12}$
هذا الحصر أفضل من الحصر الأول لأن طبقاً الحال المماثلة له أصلح.

وباعتبار أن a موجب وكذلك $(a - \sqrt{2})^2$ فيكون الفرق موجباً، وبالتالي:

$$\sqrt{2} < \frac{1}{2}(a + 2)$$

تمارين وسائل

13. أدرج عدداً عشرياً بين:
 $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{3}$ ؛ $32,509$ و $32,528$
 $\sqrt{92}$ و $\frac{57}{6}$ ؛ $\frac{181}{99}$ و $\frac{31}{17}$
14. عين قيمة الرقم العشري d حيث:
 $25, d22 \leq 25,22$ ؛ $-40,501 \geq -40,6d9$
15. من بين الأعداد الآتية، عين الأعداد المحسورة بين 0 و 1:
 $\cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{10}$ ؛ 25% ؛ $\left(-\frac{4}{3}\right)^5$ ؛ $\frac{1}{10^{-3}}$ ؛ $(-10)^{-2}$
16. قارن، دون استعمال الحاسبة، كل عددين فيما يلي:
 -10^{-4} و -10^{-3} ؛ $-\frac{8}{11}$ و $-\frac{9}{11}$ ؛ $\frac{17}{23}$ و $\frac{17}{22}$
17. نفس السؤال من أجل:
 $\frac{1}{\sqrt{2}+1}$ و $\sqrt{2}-1$ ؛ $\frac{1}{3\sqrt{2}}$ و $\frac{1}{2\sqrt{3}}$
 $\sqrt{5+2\sqrt{6}}$ و $\sqrt{2+\sqrt{3}}$ ؛ $\sqrt{2\sqrt{7}+8}$ و $1+\sqrt{7}$
18. (1) بفرض a عدد حقيقي كيقي، فارن العددين الحقيقيين $a^2 - 8a$ و 16 .
(2) استنتج، دون استعمال الحاسبة، مقارنة العددين الحقيقيين $8\sqrt{2} - 2$ و 16 .
19. احسب بالاستعانة بحاسبة الفرق $y - x$ ثم استنتاج مقارنة x و y .
 $\cdot y = \frac{138}{31}$ و $x = \pi\sqrt{2}$
20. رتب، باستعمال حاسبة، من الأصغر إلى

أصحٍ أم خطأ؟

أجب بنعم أو لا على الأسئلة الآتية:

1. العدد ومقلوبه من إشارتين متعاكستين.
2. العدد هو دائماً أصغر من أو يساوي مربعه.
3. جداء عددين حقيقيين كلّ منهما أكبر من 2 أكبر من 2.
4. إذا كان $6 \leq 2x$ فإن $x \geq -3$.
5. $\sqrt{7} + \sqrt{13} = \sqrt{20}$
6. $2 \in]-\infty; 5] \cap [3; 8[$ (1)
7. إذا كان $x \in [-3; 7]$ فإن $8 \leq x < 3$ (2)
7. إذا كان a و c من إشارتين مختلفتين،
مهما كان b : $b - 25a^3b^2c$ موجب.
8. من أجل كلّ عدد حقيقي x : $|x^2| = |x|^2$
9. إذا كان $2 \geq x$ فإن $|1-2x| = 1-2x$
10. $\left[\frac{1}{5}; \frac{1}{3}\right]$ هو مركز المجال $\frac{1}{4}$.
11. الترتيب في مجموعة الأعداد الحقيقية
11. ترتيب تصاعدياً للأعداد الآتية:

$$\frac{1258}{181} ; \frac{4109}{587}$$

الأكبر الأعداد: 2π ; $\sqrt{50}$; $7,07$; $\frac{1258}{181}$; $\frac{4109}{587}$

$$0,557 ; 0,57 ; 0,577 ; 0,77 ; 0,757$$

12. رتب تنازليا الأعداد الآتية:

$$-2,022 ; -2,22 ; -2,202 ; -2,02$$


21. ما هو أكبر العددين:

$$\beta = 1 - 10^{-18} \quad \alpha = \sqrt{1 - 10^{-19}}$$

30. a و b و c أعداد حقيقة موجبة تماما.

$$\cdot \frac{a}{c} < \frac{b}{c} \quad \text{إذا كان } b < a, \text{ فإن } \frac{a}{c} < \frac{b}{c}$$

$$\cdot \frac{c}{a} > \frac{c}{b} \quad \text{إذا كان } b < a, \text{ فإن } \frac{c}{a} > \frac{c}{b}$$



31. $ABCD$ رباعي

محيطه P .

برهن أنّ:

$$AC + BD < P$$

32. أين الخطأ في الاستدلال التالي:

$$3\pi - \pi^2 > 9 \quad \text{وبالتالي} \quad 3\pi > 9 + \pi^2$$

$$(3-\pi)\pi > (3-\pi)(3+\pi) \quad \text{وبالتالي}$$

$$\pi > 3 + \pi \quad \text{وبالتالي} \quad 0 > 3$$

المجالات

33. عين المجالات الموافقة للأعداد الحقيقة:

(1) الأكبر من أو المساوية 2.

(2) المحصورة تماما بين 4 و 7.

(3) الأصغر تماما من 1.

(4) السالبة تماما أو الأكبر من أو المساوية 3.

34. بفرض قائمة أعداد حقيقة:

$$-\frac{11}{3} ; \sqrt{2} ; 5 ; \pi ; -2,2$$

وقائمة مجالات:

$$[-\infty ; 2] ; [-2 ; 2] ; [-1 ; 5] ; [-4 ; +\infty]$$

يبين بالنسبة إلى كل مجال إن كان كل عدد ينتمي إليه أو لا ينتمي.

35. مثل على المستقيم العدي المجالات الآتية:

12. (1) نريد ترتيب الأعداد

$$\frac{1}{1+4\times 10^{-15}} < 1-4\times 10^{-15} < (1-4\times 10^{-15})^2$$

تصاعديا. هل يكون ذلك ممكنا بالحاسبة؟

(2) نضع $a = 4 \times 10^{-15}$. ما هو المطلوب عندئذ؟ استخلص.

23. (1) أكمل باستعمال $<$ أو $>$ أو $=$:

$$\sqrt{9} + \sqrt{16} \dots \sqrt{25}$$

(2) نعتبر $B = \sqrt{a+b}$ و $A = \sqrt{a} + \sqrt{b}$

احسب A^2 و B^2 ثم قارن A و B .

24. رتب تصاعديا الأعداد a و a^2 و a^3 في الحالتين:

$$a = \sqrt{2} - 1$$

$$a = \frac{3 + \sqrt{3}}{3}$$

25. x عدد حقيقي حيث $x \in [0 ; 1]$ ، قارن العددين $(1-x)^3$ و $(1-x)$.

26. x عدد حقيقي حيث $x \geq 2$. نعتبر العبارتين

$$B = (x-2)^2 \quad A = (x-1)^2$$

(1) حل الفرق $A - B$

(2) استنتاج إشارة $A - B$ ثم قارن A و B .

27. بفرض $0 < x$ و $0 < y$ ، انقل وأكمل الجدول:

صحيح	خطأ	لا يمكن الحكم
$-2x < 0$		
$-x + y < 0$		
$x + y < 0$		
$-x - y > 0$		
$x - y < 0$		

28. بفرض $b < a$ ، بين أنّ:

$$\cdot \left] -\infty ; -\frac{3}{2} \right[\cup \left[\frac{1}{2} ; +\infty \right[\cup \left] -2 ; -1 \right[\cup \left[1 ; 4 \right]$$

36. عين كل الأعداد الطبيعية ثم كل الأعداد الصحيحة النسبية التي تنتمي إلى المجال

$$\cdot \left[-2 ; \frac{9}{2} \right]$$

45. أنقل ثم أكمل الجدول.

$x \in$	المتباينات
	$-2 \leq x < 3$
$] -3 ; 0 [$	
$[5 ; +\infty [$	
	$x \leq -\sqrt{2}$

46. عين المجالات الآتية:

$$]-\infty ; 0] \cup]0 ; +\infty [\quad]-\infty ; 3] \cup [2 ; +\infty [$$

$$]-\infty ; 1] \cup]1 ; +\infty [\quad [-2 ; 3] \cup [-4 ; 6] \quad \blacksquare$$

47. أنقل ثم أكمل الجدول.

I	J	$I \cap J$	$I \cup J$
$[2 ; 5]$	$[1 ; +\infty [$		
$] -1 ; 3]$	$] -5 ; 5 [$		
$] -\infty ; \frac{1}{2} [$	$] -\frac{5}{2} ; \frac{1}{3} [$		
$[1 ; 2]$	$] \frac{1}{2} ; 2 [$		

المسافة والقيمة المطلقة

48. أنقل ثم أكمل الجدول بالمسافة d للعدد الحقيقي x إلى 0.

x	1,5	0	-3	10^2
d				

49. بفرض M و N و P ثلث نقاط ذات الفواصل 4، 3، 0، -3 على الترتيب من المستقيم العددي. أحسب المسافات MN و NP و MP .

50. أحسب المسافة بين كل عددين حقيقيين فيما يلي:

$$2a+1 < 2b+1 \quad (1)$$

$$3-a > 3-b \quad (2)$$

برهن أن:

$$2x+1 \geq 7 \quad x \geq 3 \quad (1)$$

$$-x+4 \leq -1 \quad x \geq 5 \quad (2)$$

37. عين المجالات الآتية

$$[0 ; 2] \cap]1 ; 6] \quad (1)$$

$$[-2 ; 2] \cap]-2 ; +\infty [\quad (2)$$

$$[-1 ; 3] \cap]3 ; +\infty [\quad (3)$$

$$]-\infty ; \frac{1}{2}] \cap \left[\frac{1}{2} ; +\infty \right[\quad (4)$$

38. أكتب على شكل مجالات مجموعات الأعداد الحقيقة الممثلة والملونة على المستقيم العددي.

39. أكتب على شكل مجالات مجموعات الأعداد

الحقيقة المعرفة بالممتثلات الآتية:

$$x \leq -2,5 \quad 2 \leq x \leq 6 \quad (1)$$

$$x > \sqrt{3} \quad -4 \leq x \leq 3 \quad (2)$$

نفس السؤال السابق من أجل:

$$x \geq -1 \quad x < 2 \quad (1)$$

$$1 \leq x \leq 5 \quad -4 < x < 1 \quad (2)$$

41. اكتب على شكل مجالات المجموعات الآتية:

$$R^{++} \quad ; \quad R^* \quad ; \quad R^+ \quad ; \quad R^- \quad ; \quad R$$

42. عين مركز وطول كل مجال:

$$[-\pi + 1 ; \pi + 1] \quad ; \quad [-0,5 ; 0,1] \quad ; \quad [-2 ; 2]$$

43. ما هما حدا المجال المغلق الذي يقع في $-5,3$ و طوله $0,7$ ؟

44. أنقل ثم أكمل الجدول.

المجال	مجموعات الأعداد الحقيقة x
	$] -1 ; 2 [$

$$5 \text{ و } 11 \text{ ، } 3 - 2 \text{ و } \sqrt{3} \text{ ، } 3\pi \text{ و } 9$$

51. مثل على المستقيم العددي مجموعة الأعداد الحقيقية حيث: (1) $|x| \leq 3$ ، (2) $|x| > 1$

$2 \leq x \leq 5$	
$x \geq 0$	
	$]-\infty; \frac{1}{2}]$

52. عين في كل حالة الأعداد الحقيقية x حيث: $|x^2| = 1$ (3) $|x| = \sqrt{2}$ (2) $|x| = 4$ (1)

51. بفرض K مجموعة الأعداد الحقيقية x حيث: $|3 - x| \leq 1$

أكتب K على شكل مجال.

52. بالاستعانة بالحاسبة بين إن كان العدد 2 أقرب من $\sqrt{5}$ أو من $\sqrt{3}$.

$$\cdot |\sqrt{3} - 2| \text{ و } |\sqrt{5} - 2|$$

53. بفرض $A = 3x - |2 - 4x|$ ، أحسب A من أجل $x = 3$

64. أحسب العدد A المعرف بالشكل:

$$A = |a+b| - |a-1| + 2|2-b|$$

في الحالات الآتية:

$$b = 4 \text{ و } a = 3 \quad (2) \quad a = b = \frac{1}{2} \quad (1)$$

$$\cdot b = 3 \text{ و } a = -2 \quad (3)$$

65. ما هي القيمة المطلقة لكل من الأعداد:

$$-\frac{1}{10^2} \quad ; \quad (-2)^3 \quad ; \quad \sqrt{5} - \sqrt{7} \quad ; \quad -5 \quad (1)$$

$$x^2 = 9 \quad (2)$$

66. أحسب القيم المطلقة:

$$\left| -2 - \frac{4}{5} \right| \quad (3) \quad \left| -2 - \pi \right| \quad (2) \quad \left| 2 - \sqrt{5} \right| \quad (1)$$

$$\left| \frac{1}{3} - 3 \right| + \left| 5 - \frac{3}{2} \right| \quad (5) \quad \left| -0,4 + \frac{1}{5} \right| \quad (4)$$

67. أحسب القيم المطلقة:

$$\left| -2\sqrt{2} + 1 \right| \quad (2) \quad \left| (2 - \sqrt{3})^2 \right| \quad (1)$$

53. أنقل ثم أكمل الجدول بالمسافة d للعدد الحقيقي x إلى 0.

x	1,5	0	-3	10^2
d				

54. بفرض M و N و P ثلات نقاط ذات الفواصل -4 ، 0 ، 3 على الترتيب من المستقيم العددي. أحسب المسافات MN و NP و MP .

55. أحسب المسافة بين كل عددين حقيقيين فيما يلي:

$$5 \text{ و } 11 \text{ ، } 3 - 2 \text{ و } \sqrt{2} \text{ ، } 3\pi \text{ و } 9$$

56. مثل على المستقيم العددي مجموعة الأعداد الحقيقة حيث:

$$|x| > 1 \quad (2) \quad |x| \leq 3 \quad (1)$$

57. بفرض x فاصلة نقطة M على مستقيم عددي، أحسب المسافات الآتية:

$$CM = |x - 2| ; BM = \left| x + \frac{2}{3} \right| ; AM = \left| x - \frac{1}{3} \right|$$

$$\cdot x = -3$$

58. حل كل من المعدلات أو المترابعات الآتية في R ، ترجم العلاقات الآتية في عبارات المسافة ومثل الوضعية على مستقيم عددي قبل الاستخلاص.

$$|x+2| \leq 1 \quad ; \quad |x+2| = \frac{5}{2} \quad ; \quad |x-3| = 2$$

59. على المستقيم المزود بالمعلم $(O; I)$ علم النقطتين A و B ذات الفاصلتين 2 و 5 على الترتيب والنقطة J منتصف $[AB]$. نقطة M متراكمة فاصلتها x .

عين في كل حالة من الحالات الآتية موضع (أو مواضع) M عندما تتحقق فاصلتها الشرط المعين:

$$\sqrt{(\sqrt{7}-5)^2} \quad (4-2|6-2\sqrt{5}|) \quad (3)$$

$$|x+2| + |x-5| = 7 \quad (2) \quad |x+2| = |x-5| \quad (1)$$

$$|x+2| < |x-5| \quad (3)$$

68. برهن المساويتين:

$$\sqrt{(1-\sqrt{2})^2} = |1-\sqrt{2}| = \sqrt{2}-1 \quad (1)$$

$$\sqrt{4-2\sqrt{3}} = |1-\sqrt{3}| = \sqrt{3}-1 \quad (2)$$

الحصر

78. أعط حصراً للعدد x في الحالات الآتية:

$$10,1 \leq x-8 \leq 10,2 \quad (1)$$

$$|x-3| < 2,5 \quad (2)$$

$$d(5;x) \leq 10^{-2} \quad (3)$$

79. عين حصراً لكل من محيط ومساحة قرص

نصف قطره r ، علماً أن $2,1 < r < 2,2$.
(الوحدة cm).

يعطى $3,14 < \pi < 3,15$.

80. أحصراً مساحة شبه منحرف قاعدته b
وارتفاعه h حيث:

$$10 < h < 11 ; \quad 29 < b < 30 ; \quad 19 < b < 20 \quad (الوحدة cm)$$

81. أحصراً حجم مخروط نصف قطره r

وارتفاعه h علماً أن: $3,14 < \pi < 3,15$;

$$5,10 < h < 5,11 ; \quad 3,530 < r < 3,531 \quad (الوحدة cm)$$

82. مثلث مساحته محصور بين $51cm^2$ و $52cm^2$
و قاعدته محصورة بين $7,9cm$ و $8,1cm$.
أحصراً الارتفاع الموافق.

83. ترجم في الشكل $|x-a| \leq \varepsilon$ ما يلي:
 $x \in [4,1 ; 4,2]$ (2) $x \in [3 ; 5]$ (1)

84. ترجم في شكل حصر ما يلي:
 $|x+5,4| \leq 0,1$ (2) $|x-3| \leq 2$ (1)

85. أنقل ثم أكمل الجدول التالي:

القيمة المطلقة	المجال	الحصر	المسافة
----------------	--------	-------	---------

60. باستعمال اللمسة abs للحاسبة، أحسب $|5+3|$ و $|5-3|$. قارن النتائج.

69. باستعمال الحصر $4,4721 < \sqrt{20} < 4,4722$ أحصراً كلاً من الأعداد الآتية:

$$-\sqrt{20} ; \quad 6+\sqrt{20} ; \quad 10\sqrt{20} ; \quad \frac{\sqrt{20}}{2}$$

70. a عدد حقيقي حيث $-1 < a < 2$.

استنتج من هذا الحصر حصراً لكل من الأعداد الآتية:

$$\frac{1}{2a-5} ; \quad 7-3a ; \quad 5a-2 ; \quad 2a+1$$

71. b عدد حقيقي حيث $2 < b < 3$.

$$\frac{2-b^2}{5} \quad \text{أحصراً للعدد}$$

يعطى أيضاً عدد حقيقي a حيث $1 < a < 2$.
أحصراً للعدد $b-2a$.

$$2,36 < A < 2,37 \quad \text{علماً أن: } \frac{1+A}{2}$$

$$3,16 < B < 3,17 \quad \text{علماً أن: } \frac{5-2B}{10}$$

73. بفرض $1,7 < \sqrt{3} < 1,8$ و $1,4 < \sqrt{2} < 1,5$

$$B = 2\sqrt{3} - 3\sqrt{2} ; \quad A = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{2}$$

74. x و y عددان حقيقييان حيث:

$$2,4 < y < 2,5 ; \quad 1,2 < x < 1,3$$

أحصراً xy و $5x-4y$ و $x-y$ و $x+y$.

75. بفرض $y \in [3 ; 4]$ و $x \in [-2 ; 1]$

$$y^2 ; \quad x^2 ; \quad x-2y ; \quad y-x$$

76. بفرض z عدد حقيقي يحقق $25 < z < 36$.

$$\text{أحصراً } \frac{1}{\sqrt{z}}, \frac{1}{z}, \frac{1}{z^2}$$

77. (1) عين باستعمال الحاسبة قيماً عشرية مقربة

$... \leq ...$	$d(... ; ...) \leq ...$	$x \in ...$	$2 \leq x \leq 6$
		$x \in]-1; 5[$	
	$d\left(x; \frac{3}{2}\right) \leq \frac{7}{2}$		
$\left x + \frac{5}{2}\right \leq \frac{3}{2}$			

91. باستعمال صفيحة معدنية بعدها L و ℓ حيث

$L < \ell$ يمكن أن نصنع نوعين من الأسطوانات

(الشكل) وذلك بالالف



- (1) عبر بدلاة L و ℓ عن حجم كل من الأسطوانتين.
 (2) قارن الحجمين.

92. ABC مثلث قائم في A . الوتر a محصور بين 3 و 3,1 و الصلع $[AC]$ طوله b محصور بين 1,6 و 1,5 . (الوحدة cm).

(1) أعط حسرا للضلوع الثالث.

(2) نسمى H نقطة تقاطع الارتفاع المتعلق بالرأس A مع $[CB]$ في المثلث ABC .

كتابة مساحة المثلث ABC بكيفيتين، برهن أن:

$$BC \times AH = AB \times AC$$

(2) استنتج حسرا للطول AH

$\sqrt{1+x}$. 93

بفرض x عددا حقيقيا موجبا تماما، نضع:

$$B = 1 + \frac{x}{2} \quad ; \quad A = \sqrt{1+x}$$

$$C = \frac{x^2}{8} + \sqrt{1+x}$$

(1) بين أن كلا من A و B و C أكبر تماما من 1.

(2) قارن A^2 و B^2 واستنتاج أن:

$$\sqrt{1+x} < 1 + \frac{x}{2}$$

(3) بين أن:

$$C^2 - B^2 = \frac{x^2}{4} \left(\sqrt{1+x} + \frac{x^2}{16} - 1 \right)$$

(4) قارن B^2 و C^2 واستنتاج أن:

$$1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} < \sqrt{1+x} < 1 + \frac{x}{2}$$

بالزيادة وبالنقصان إلى 10^{-4} للأعداد:

$$b = \sin^2 71^\circ \quad a = \sin 71^\circ$$

$$d = \cos^2 71^\circ \quad c = \cos 71^\circ$$

$$e = \sin^2 71^\circ + \cos^2 71^\circ$$

(2) قارن العددين e و 1.

86. أعط حسرا للعدد المجهول a في الحالات الآتية:

▪ 2,715 قيمة مقربة عشرية للعدد a إلى 10^{-3} .

▪ 3,1416 قيمة مقربة عشرية للعدد a إلى 10^{-4} .

87. 1) بفرض n عدد صحيح. برهن أن:

$$4^n < p < 4^{n+1} \text{ معناه } 2^n < \sqrt{p} < 2^{n+1}$$

(2) استنتج ذهنيا قيمة n حيث:

$$2^n < \sqrt{27} < 2^{n+1}$$

(3) أوجد n حيث:

$$2^n < \sqrt{3000} < 2^{n+1}$$

مسائل

88. هرم منتظم رأسه S وقاعدته مربع مركزه O . بفرض $2,4\text{cm}$ مدور ضلع المربع و $3,5\text{cm}$ مدور الارتفاع SO ، بين أن V حجم الهرم ينتمي إلى المجال $[6,72 ; 7,5]$.

89. هل يمكن تفريغ قارورة حليب مملوءة سعتها $1,8\ell$ في إناء أسطواني الشكل نصف قطره r وارتفاعه h حيث:

$$8 < r < 8,1$$




و

$$8 < h < 8,1$$

(الوحدة cm)

اعتبر $\pi \leq 3,15$

90. قارن المساحات الكلية لمتوازيات المستطيلات الآتية:



وحدة الأطوال هي cm و $a > 1$.

تطبيق:

دون الاستعانة بحاسبة، أعط حسراً لعدد

$$\cdot \sqrt{1,000} 2$$

3

عموميات على الدّوال

الكلاءات المستهدفة

- تحديد دالة (متغيرها، مجموعة تعريفها، مجموعة قيمها)
- تعين صورة عدد أو سابقة عدد وفق دالة معرفة بواسطة منحنى أو دستور.
- الرابط بين دستور جدول قيم وتمثيل بياني.
- توظيف الحاسبة البيانية لإعطاء التمثيل البياني لدالة معطاة على مجال بواسطة دستور.
- وصف سلوك دالة معرفة بمنحن باستعمال التعبير الرياضي المناسب.
- استنتاج جدول تغيرات دالة انطلاقاً من تمثيلها البياني.
- إرفاق جدول تغيرات معطى بتمثيل بياني ممكن.
- استعمال الحاسبة البيانية لإيجاد القيم الحدية لدالة على مجال.
- التعرف على شفاعة دالة انطلاقاً من تمثيلها البياني أو بالاعتماد على التعبير الجبري للخاصية.



كوت فراید ویلیام لیبینیتز
عاش بين (1646-1716م)
برع في ميادين علمية هي المنطق
والفلسفة والحقوق والرياضيات

تمتد البدايات الأولى لفكرة الدالة إلى العهد البابلي حيث ظهرت في الجداول العددية التي كانوا ينجزونها لمقابلة العدد بمربعيه أو بمقولبيه أو بجذرته أو بمكعبه أو بجذره التكعيبي، كما ظهرت في جداولهم الفلكية على شكل ربط بين عدد من القيم تعبّر مثلاً عن الزمن وقيم أخرى تعبّر عن المواقع. غير أن هذا الربط لا يرقى إلى مفهوم الربط الدالي (من كلمة دالة) بين الكميات الذي نعرفه اليوم. ولقد كان توجّه بعض الرياضيين إلى التعبير عن ظواهر طبيعية كالحرارة، الكثافة، السرعة... إلخ، بواسطة كميات عدديّة بداية لتبلور هذا المفهوم. فعن ظاهرة السرعة قدّم الرياضي نيكول أوراسم (1382-1320م) برهاناً هندسياً حول النتيجة الآتية: "في فترة زمنية معطاة، يقطع متحرك بحركة متتسعة بانتظام نفس المسافة التي يقطعها متحرك آخر بسرعة ثابتة تساوي متوسط السرعتين الأقصىين للمتحرك الأول" واستخدم في ذلك تمثيلاً بيانياً كان بمثابة أولى العلاقات الدالية

التي تربط الزمن بالسرعة. ثم تطور التعبير عن هذه العلاقة الدالية مع مطلع القرن السابع عشر بواسطة ما يسمى "دستور" وهذا بفضل عاملين أساسيين ومصيريَّين ليس فقط بالنسبة لمفهوم الدالة، ولكن أيضاً بالنسبة لتقدير الرياضيات عموماً، العامل الأول هو اكتشاف الترميز الحرفي في الجبر والعامل الثاني هو التصور الجديد للرياضيات كلغة تعبّر عن الحقائق الفيزيائية الطبيعية الذي عبر عنه غاليليو (1564-1642م). وكان الفضل لديكارت (1596-1650م) في التعبير لأول مرة عن فكرة الارتباط بين كميّتين متغيّرتين، أما كلمة "دالة" فقد استخدمت في الرياضيات لأول مرة من طرف ليبنیتز (1646-1716م). ولم ينضج مفهوم الدالة إلا بمجيء ریمان (1826-1866م) حيث قدّم دراسة نظرية شاملة لهذا المفهوم.


أنشطة

نشاط 1: الدوال في الحياة اليومية

أثناء تجربة، قيس توافر النبضات القلبية، عدد النبضات في الدقيقة، لعداء مسافة m 400 وسجلت النتائج التالية:

المسافة المقطوعة x (m)	0	50	100	150	200	250	300	350	400
توافر النبضات القلبية y (عدد النبضات في الدقيقة)	80	150	165	170	175	185	190	200	210


1. أنقل ثم أكمل التمثيل البياني التالي، باستعمال المعطيات الواردة في الجدول السابق.



2. ما هو توافر نبض رياضي عند بداية السباق؟ عند قطع نصف المسافة؟
 3. ما هو عدد الأمتار التي قطعها العداء وتوافر نبضه يساوي 175 نبضة في الدقيقة؟
 4. على أي مسافة كان هذا التوافر أكبر من 165 نبضة في الدقيقة؟

نشاط 2: الدوال في الهندسة

متّلث قائم ومتقابلي الضلعين رأسه A حيث $AB=10\text{ cm}$ حيث I منتصف $[AB]$.
 لتكن M نقطة متغيرة من $[AC]$. نضع $CM=x$.
 المسقّي (D) المواضي للمسقّي (AB) والمار بالنقطة M يقطع $[BC]$ في النقطة N .
 نسمّي $A(x)$ مساحة الرباعي $AINM$.



1. إلى أي مجال ينتمي الطول x ؟
 2. أوجد عبارة $A(x)$ بدلالة x .

3. ما هي قيم x التي من أجلها يكون $A(x)=25\text{ cm}^2$?
 4. باستعمال الحاسبة، أتمم الجدول الآتي:

x	0	0,5	1	1,5	2	2,5	...	9	9,5	10
$A(x)$										

نشاط 3: دوال معرفة باستعمال حاسبة

تجد على ملمس حاسبة علمية أو حاسبة بيانية للлемسة \ln التي تعني "اللوغاريتم النبيري"، وهي الدالة التي ترافق بعدد حقيقي x العدد $\ln x$. نسمى العدد $\ln x$ صورة x بالدالة "اللوغاريتم النبيري".

1. أ) أحسب $\ln x$ من أجل بعض قيم x .
- ب) ماذا تظهر الحاسبة من أجل القيم السالبة للمتغير x ؟
- ج) بالتجربة على عدة أعداد، ضع تخمينا حول قيمة x التي تكون من أجلها الدالة معرفة.


2. a و b عداد حقيقيان موجبان تماماً.

قارن $\ln b$ و $\ln a$ ثم $\ln(a \times b)$ و $\ln(a + b)$ من أجل بعض قيم a و b .

ماذا تلاحظ؟

نشاط 4: شفعية دالة

لتكن الدالة المعرفة على المجال $[2 ; -2]$ بالشكل: $f(x) = x^4 - 2x^2$. في الشكل الآتي يبيّن التمثيل البياني لهذه الدالة في معلم متعدد المستوى.



1. قارن بيانيا وبالحساب $f(1)$ و $f(-1)$ ثم $f(2)$ و $f(-2)$.
2. من أجل $x \in [-2; 2]$ ، اشرح لماذا $f(x) = -x$ وقارن $f(x)$ و $f(-x)$.
3. ما هي الخاصية الهندسية التي يحققها المنحني؟
4. نعتبر النقطة M من المنحني ذات الفاصلة x والنقطة ' M' من المنحني ذات الفاصلة $-x$ ، بين أن M و ' M' متاظرتان بالنسبة إلى محور التراتيب.
5. استخلص.

نشاط 5: الدوال التألفية

لقياس درجة الحرارة، نستعمل سلم الدرجات المئوية (${}^\circ\text{C}$) أو سلم درجات فاهرنهيات (${}^\circ\text{F}$). يذوب الجليد عند ${}^\circ\text{C} 0$ ويقابل ذلك ${}^\circ\text{F} 32$ ويغلي الماء عند ${}^\circ\text{C} 100$ ويقابل ذلك ${}^\circ\text{F} 212$. نقبل بأنَّ الظاهرة يمكن ترجمتها بدالة تألفية.

1. في معلم متعدد $(O; I, J)$ للمستوي، علم النقطتين $A(0; 32)$ و $B(100; 212)$. أرسم المستقيم (AB) .

2. عَيْنَ، بِيَانِيَا، الْمُقَابِلُ فِي سُلْطَنِ درَجَاتِ الْأَرْضِ لِكُلِّ مِنَ الدَّرَجَتَيْنِ 37 °C، 40 °C

1. مفهوم الدالة

تعريف 1

جزء من \mathbb{R} . نعرف دالة f على D عندما نرقق بكل عدد حقيقي x من D عددا حقيقيا وحيدا، نرمز إليه بالرموز (x)

تعابير وأصطلاحات

- نرمز عادة إلى الدوال بالرموز f, h, g, \dots
- D جزء من \mathbb{R} و f دالة معرفة على D :
- D هي **مجموعة تعريف الدالة**.
- إذا كان x عنصرا من D ، نسمى العدد الحقيقي $f(x)$ **صورة** x **بالدالة** f .
- إذا كان العدد الحقيقي y صورة العدد الحقيقي x **بالدالة** f ، نقول إن x **سابقة للعدد** y **بالدالة** f .
- للتعبير عن الدالة f ، نكتب:
$$f : D \rightarrow R$$

$$x \mapsto y = f(x)$$

في هذه الكتابة، x يمثل **المتغير** و y **مرتبط** **بالمتغير** x .

أمثلة

• دالة معرفة بـدستور

- العبارة: " f هي الدالة المعرفة على المجال $[2; -2]$ بالشكل: $f(x) = x^2 + 2x + 1$ " تعني:
- مجموعة تعريف الدالة f هي المجال $[2; -2]$.
 - بكل عدد حقيقي x من المجال $[2; -2]$ نرقق العدد $x^2 + 2x + 1$: هكذا نرقق بالعدد 2 - العدد $2(-2)^2 + 2(-2) + 1 = 1$ ونقول أيضا أن 1 هو صورة 2 - بالدالة f .
 - ولدينا كذلك $f(0) = 1$.
 - أي أن العددين 2 - و 0 لهما نفس الصورة **بالدالة** f .

ملاحظة

لا يمكن أن يكون لعدد حقيقي عدّة صور لكن، يمكن أن يكون لعدد حقيقي عدّة سوابق.


عندما تعرف دالة بـدستور، يمكن إعطاء جدول لبعض قيمها:

X	Y1
0	ERROR
1	1
2	.5
3	.33333
4	.25
5	.2
6	.16667
Y1	$\frac{1}{X}$

إذا كانت g الدالة حيث $g(x) = \frac{1}{x}$ ، فتكون مجموعة تعريفها D المجال $[0; +\infty) \cup (-\infty; 0]$ باعتبار أن كل عدد حقيقي باستثناء 0 يقبل مقلوبا.

تسمح أغلبية الحاسوبات باظهار جدول لقيم دالة وذلك باستعمال اللمسة **TABLE**.

• دالة معرفة بتمثيل بياني



المنحي البياني المقابل يمثل دالة h معرفة على المجال $[-2; 2]$.

نقرأ على التمثيل البياني:

$$h(-2) = -2, \quad h(1) = -2, \quad h(0) = 0$$

• دالة معرفة بإجراء حساب

الجدول المقابل مأخوذ من تعريفات بريد الجزائر للسنة 2005.

نعرف على دالة P معرفة على المجال $[0; 30]$. وهكذا نجد صورة 12 بالدالة P هي 62 . العدد 10 ليس له سوابق بالدالة P . سوابق العدد 83 هي كل الأعداد الحقيقية من المجال $[15; 20]$.

الطرود البريدي	
الوزن بالكيلوغرام	التعريفية (ج)
إلى غالية 5	25,00
$]5; 10]$	40,00
$]10; 15]$	62,00
$]15; 20]$	83,00
$]20; 30]$	110,00

2. التمثيل البياني لدالة

تعريف 2

المستويي منسوب إلى معلم $(O; I, J)$. f دالة معرفة على جزء D من \mathbb{R} . التمثيل البياني (أو المنحي الممثل) للدالة في المعلم $(O; I, J)$ هو مجموعة النقط $M(x; y)$ حيث:

$$y = f(x) \quad x \in D$$

إذا رمزنا إلى منحي الدالة f بالرمز (\mathcal{C}_f) ، نقول أن $y = f(x)$ هي معادلة (\mathcal{C}_f) في المعلم $(O; I, J)$.

مثال

لتكن الدالة f المعرفة على $[-2; 2]$ بالشكل التالي في المعلم $(O; I, J)$ بعدة طرق:


• باستعمال جدول لبعض قيم الدالة:

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-1	-3	-3	-1	3

نعلم النقاط الموافقة في المعلم ونصل بينها باليد.


تنبيه

إن إعطاء مجموعة من القيم لا يكفي للحصول على المنحي الممثل للدالة. هناك العديد من الكيفيات للمرور من نقطة إلى أخرى. فمن




الضروري إذن أن تعطى معلومات أخرى حول سلوك الدالة.

• باستعمال حاسبة بيانية



بعد حجز الدالة التي يراد تمثيلها باستعمال اللمسة **Y=** نختار النافذة تبعاً للمجال الذي نرغب إظهار المنحني فيه باستعمال اللمسة **WINDOW** ونحصل على المنحني الممثل للدالة باستعمال اللمسة **GRAPH**.



• باستعمال مجدول

نشكل جدول لبعض قيم الدالة ثم نستعمل المساعد

البياني للمجدول للحصول على المنحني الممثل للدالة.

يسمى التمثيل البياني **لدلالة بيان الدالة**.

3. تغيرات دالة معرفة على مجال

تعريف 3

f دالة معرفة على مجال I من \mathbb{R} .

f متزايدة تماماً على I يعني:


من أجل كل x_1 و x_2 من I ، إذا كان $x_1 < x_2$ فإن $f(x_1) < f(x_2)$

f متناقصة تماماً على I يعني:

من أجل كل x_1 و x_2 من I ، إذا كان $x_1 < x_2$ فإن $f(x_1) > f(x_2)$


f ثابتة على I يعني:

من أجل كل x_1 و x_2 من I ، $f(x_1) = f(x_2)$



دالة متناقصة تماماً

$f(x_1)$ و $f(x_2)$ ليسا في نفس ترتيب x_1 و x_2 .



دالة متزايدة تماماً


$f(x_1)$ و $f(x_2)$ في نفس ترتيب x_1 و x_2 . الدالة تحفظ الترتيب.

| الدالة تعكس الترتيب.

ملاحظة

نعرف كذلك اتجاه تغير دالة كالتالي:

- **f متزايدة على I** يعني: من أجل كل x_1 و x_2 من I ، إذا كان $x_1 < x_2$ فإن $f(x_1) \leq f(x_2)$.
- **f متناقصة على I** يعني: من أجل كل x_1 و x_2 من I ، إذا كان $x_1 < x_2$ فإن $f(x_1) \geq f(x_2)$.



مثال

الدالة المعرفة بالبيان المقابل متزايدة تماما على كل من المجالين $[I ; 3]$ ، $[-2 ; 0,5]$ وثابتة على $[-0,5 ; I]$.

نقول أيضا إنها متزايدة على المجال $[3 ; -2]$.


- نعني بدراسة **اتجاه تغير** دالة، تعين المجالات التي تكون فيها هذه الدالة متزايدة تماما أو متناصقة تماما أو ثابتة.
- تلخص نتائج هذه الدراسة في جدول يسمى **جدول التغيرات**.

مثال

الدالة الممثلة بالمنحنى المقابل معرفة على المجال $[-2 ; 2]$ ، هي متزايدة تماما على المجالين $[-1 ; -2]$ و $[1 ; 2]$ ومتناصقة تماما على المجال $[-1 ; 1]$.

جدول التغيرات

x	-2	-1	1	2
$f(x)$	-1	3	-1	3



4. القيم الحدية لدالة

تعريف 4


دالة معرفة على مجال I من \mathbb{R} .

- **القيمة الحدية العظمى** للدالة f على I هي أكبر صورة $f(x)$ تبلغها f من أجل عدد a من I .

من أجل كل x من I ، $f(x) \leq f(a)$.

- **القيمة الحدية الصغرى** للدالة f على I هي أصغر صورة $f(x)$ تبلغها f من أجل عدد b من I .

من أجل كل x من I ، $f(x) \geq f(b)$.





ملاحظة

يمكن أن تبلغ دالة قيمتها الحدية العظمى أو الصغرى على مجال أكثر من عنصر واحد من المجال.
والقيمة الحدية تكون دائماً عدداً حقيقياً (بمعنى إن $+\infty$ أو $-\infty$ لا يمكن أن يكونا قيمة حدية).

5. شفعية دالة

تعريف 5

- **نقول إن f دالة معرفة على D** إذا كان D متاظراً بالنسبة إلى 0 وكان لكل x من D ، $f(-x) = f(x)$
- **نقول إن f دالة فردية** إذا كان D متاظراً بالنسبة إلى 0 وكان لكل x من D ، $f(-x) = -f(x)$



بيان الدالة الزوجية في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد يكون متاظراً بالنسبة إلى محور التراتيب.

أمثلة

1. الدالة f المعرفة على \mathbb{R} بالعبارة $f(x) = 2x^2 + 1$ دالة زوجية، لأن مجموعه تعريفها \mathbb{R} متاظرة بالنسبة إلى 0 (بمعنى، لكل $x \in \mathbb{R}$ ، $-x \in \mathbb{R}$)

ولكل x من \mathbb{R} ، $f(-x) = 2(-x)^2 + 1 = 2x^2 + 1 = f(x)$

2. الدالة g المعرفة على \mathbb{R}^* بالعبارة $g(x) = -\frac{2}{x}$ فردية، لأنّ:

مجموعه تعريفها \mathbb{R}^* متاظرة بالنسبة إلى 0

$\cdot g(-x) = -\frac{2}{(-x)} = -\left(-\frac{2}{x}\right) = -g(x)$ ولكل x من \mathbb{R}^*

3. الدالة h المعرفة على $[0; +\infty]$ بالعبارة $f(x) = 2x^2 + 1$ ليست زوجية ولا فردية، لأن المجال غير متاظر بالنسبة إلى 0.

4. الدالة u المعرفة على \mathbb{R} بالعبارة $u(x) = x + 3$ ليست زوجية ولا فردية، لأنه بالرغم من أن مجموعه تعريفها \mathbb{R} متاظرة بالنسبة إلى 0، لكن $u(-x) = -x + 3$ لا يساوي $u(x)$ ولا يساوي $-u(x)$.

ملاحظة


للبرهان على أن f ليست دالة زوجية (أو دالة فردية)، يكفي إيجاد عنصر a من مجموعة تعريفها حيث $f(-a) \neq f(a)$ (أو $f(-a) \neq -f(a)$). ويعتبر التمثيل البياني للدالة وسيلة للتحقق من شفعية الدالة.

6. حل معادلات ومتراجحات بيانيا

f و g دالتان معرفتان على مجموعه D ، (\mathcal{C}_1) و (\mathcal{C}_2) منحنياهما في معلم المستوى.


<ul style="list-style-type: none"> • حل المتراجحة $f(x) > g(x)$ ببيانا يعني: تعين فوائل نقط المنحني (\mathcal{C}_1) الواقعه فوق المنحني (\mathcal{C}_2). 	<ul style="list-style-type: none"> • حل المعادلة $f(x) = g(x)$ ببيانا يعني: تعين فوائل النقط المشتركة لـ (\mathcal{C}_1) و (\mathcal{C}_2).
---	---

أمثلة



- نعرف الدالة f بالمنحني (C_f) المقابل.
حل المعادلة $0 = f(x)$ بيانياً يؤول إلى تعين
فوائل نقط تقاطع المنحني C_f مع محور
الفوائل.
المنحني (C_f) يقطع ثلث مرات محور الفوائل.

حلول المعادلة $0 = f(x)$ هي فوائل هذه النقط:
 $S = \{-1; 1; 3\}$



- f, g دالتان معرفتان بالمنحنين (C_f) و (C_g) (الشكل المقابل).
حل المتراجحة $f(x) \geq g(x)$ بيانياً يؤول إلى تعين
فوائل نقط المنحني (C_f) الواقع فوق المنحني
 (C_g) وفوايل نقط المشتركة.

$$S =]-\infty; -1] \cup [0; +\infty[$$

7. الدالة التالية

تعريف 6

نسمى دالة **تالية** كل دالة f معرفة على \mathbb{R} بالشكل $f(x) = ax + b$ حيث a و b عددين حقيقيان مفروضان.

أمثلة

- الدالة $x \mapsto 2x - 3$ هي دالة تالية حيث $a = 2$ هو المعامل الذي يضرب فيه x و $b = -3$ هو صورة 0 بالدالة f ، بمعنى $f(0) = -3$.
- في حالة $b = 0$ ، الدالة $x \mapsto ax$ هي دالة **خطية** ذات معامل التناصية a .
- الدالة $x \mapsto \frac{1}{2}x$ دالة خطية حيث $a = \frac{1}{2}$.
- في حالة $a = 0$ ، $x \mapsto b$ هي دالة ثابتة.


الخاصية المميزة للدوال التالية

مبرهنة 1

تكون الدالة f تالية، إذا وفقط إذا كان، من أجل كل عددين حقيقيين مختلفين x و x' :

النسبة $\frac{f(x) - f(x')}{x - x'}$ ثابتة (معنى أنَّ تزايد الصورة متناسب مع تزايد المتغير).

التمثيل البياني




التمثيل البياني لدالة تألفية في معلم هو المستقيم (D) الذي معامل توجيهه a ويشمل النقطة $B(0; b)$.

b هي الترتيب إلى المبدأ.


$y = ax + b$ هي المعادلة المبسطة للمستقيم (D) .

أمثلة

3. في حالة دالة ثابتة $b \mapsto b$ المستقيم (D) الذي معادلته $y = b$ يوازي محور الفوائل.




2. في حالة دالة خطية $x \mapsto ax$ ، المستقيم (D) الذي معادلته يمر من مبدأ المعلم.



1. الدالة f المعرفة على \mathbb{R}


بالشكل : $f(x) = -\sqrt{2}x + 1$
تمثل بالمستقيم (D) الذي
معادلته $y = -\sqrt{2}x + 1$
 $B(0; 1)$ يمر من النقطة (D)
ومعامل توجيهه $a = -\sqrt{2}$




القراءة البيانية لمعامل توجيه دالة تألفية

أمثلة

• حالة $a > 0$



• حالة $a < 0$



$$a = \frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = \frac{3 - 1}{1} = 2$$

$$a = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{1 - 2}{2} = -\frac{1}{2}$$

اتجاه تغير دالة تألفية

مبرهنة 2

f دالة تألفية معرفة على \mathbb{R} بالشكل $f(x) = ax + b$

- إذا كان $a < 0$ ، فإن f متناقصة تماما.

- إذا كان $a > 0$ ، فإن f متزايدة تماما.

برهان

لتكن f الدالة التألفية المعرفة على \mathbb{R} بالشكل $f(x) = ax + b$.

نعتبر عددين حقيقيين x و x' حيث $x' < x$.

بضرب طرفي المتباينة في العدد a ، نجد:

- إذا كان $a < 0$ ، يتغير اتجاه المتباينة، أي أن $ax > ax'$.

وبإضافة b إلى الطرفين، نحصل على $ax + b > ax' + b$ ، بمعنى $f(x) > f(x')$.

وكون العددين الحقيقيين $f(x)$ و $f(x')$ غير مرتدين في نفس ترتيب x و x' ، نستخلص أن الدالة f متناقصة تماما على \mathbb{R} .

- إذا كان $a > 0$ ، لا يتغير اتجاه المتباينة، أي أن $ax < ax'$.

وبإضافة b إلى الطرفين، نحصل على $ax + b < ax' + b$ ، بمعنى $f(x) < f(x')$.

وكون العددين الحقيقيين $f(x)$ و $f(x')$ مرتدين في نفس ترتيب x و x' ، نستخلص أن الدالة f متزايدة تماما على \mathbb{R} .

جدول تغيرات دالة تألفية

$a > 0$ •

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$		

$a < 0$ •

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$		

ملاحظة: في الحالة $a = 0$ ، تكون الدالة ثابتة.

أمثلة

1. الدالة $x \mapsto -2x + 1$: g متناقصة تماما على \mathbb{R} ، لأن -2 سالب.

2. الدالة $x \mapsto 3x + 2$: f متزايدة تماما على \mathbb{R} ، لأن 3 موجب.


8. التمثيل البياني وإشارة دالة

خاص

f دالة معرفة على مجال I من \mathbb{R} .

- تكون دالة f **موجبة تماما** على I إذا وفقط إذا كان تمثيلها البياني على I يقع **فوق** محور الفواصل.

- تكون دالة f سالبة تماماً على I إذا وفقط إذا كان تمثيلها البياني على I يقع تحت محور الفواصل.
- تتعذر f من أجل x_0 من I إذا وفقط إذا كان تمثيلها البياني يقطع محور الفواصل عند x_0 .



نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[4;5]$ والتي تمثلها البياني معطى كما في الشكل المقابل. يقع التمثيل البياني فوق محور الفواصل على المجالين $[-4;-1]$ و $[3;5]$ ؛ هو تحت محور الفواصل على المجال $[-1;3]$ ويقطع محور الفواصل عند -1 و 3 . منه، الدالة f :

- موجبة تماماً على $[-1;3]$ و $[3;5]$.
- سالبة تماماً على $[-1;3]$.
- تتعذر عند -1 و 3 .

ونلخص ذلك في الجدول التالي:

x	-4	-1	3	5
$f(x)$	+	0	-	+

• إشارة $(a \neq 0) ax + b$

نعلم أنَّ التمثيل البياني للدالة f المعرفة على \mathbb{R} بالعبارة $f(x) = ax + b$ حيث $a \neq 0$ هو مستقيم معادلته $y = ax + b$.

من جهة أخرى، لدينا $ax + b = 0$ يكفي أي $x = -\frac{b}{a}$ لدینا $f(x) = 0$. هذا يعني أنَّ المستقيم الممثل للدالة f يقطع محور الفواصل عند $-\frac{b}{a}$. لدراسة إشارة $ax + b$ ، نحل المتراجحة $ax + b > 0$. نميز عند حالتين:

$$a < 0$$


$x < -\frac{b}{a}$ تكافئ $ax + b > 0$ المستقيم الذي معادلته $y = ax + b$ يقع فوق محور الفواصل من أجل $x < -\frac{b}{a}$. منه جدول إشارة $ax + b$:

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
إشارة $ax + b$	+	0	-

$$a > 0$$

$x > -\frac{b}{a}$ تكافئ $ax + b > 0$ المستقيم الذي معادلته $y = ax + b$ يقع فوق محور الفواصل من أجل $x > -\frac{b}{a}$. منه جدول إشارة $ax + b$:

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
إشارة $ax + b$	-	0	+



• إشارة جداء أو حاصل قسمة

خاصية

جداء و حاصل قسمة عددين غير معدومين ومن نفس الإشارة هو عدد موجب تمام.
جداء و حاصل قسمة عددين غير معدومين ومن إشارتين متعاكستين هو عدد سالب تمام.

مثال

لدرس إشارة $f(x) = (2x+3)(1-x)$ على \mathbb{R} .
إن $2x+3$ هي عبارة دالة تألفية، تمثلها البياني مستقيم معادلته $y = 2x+3$ ومعامل التوجيه له 2 موجب تماماً. ولدينا كذلك $2x+3 = 0 \Rightarrow x = -\frac{3}{2}$ يكفي .
كما أن $1-x$ هي عبارة دالة تألفية، تمثلها البياني مستقيم معادلته $y = -x+1$ ومعامل التوجيه له -1 سالب تماماً. ولدينا كذلك $1-x = 0 \Rightarrow x = 1$ يكفي .
منه :

x	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	1	$+\infty$
إشارة $2x+3$	-	0	+	+
إشارة $1-x$	+	+	0	-
إشارة $(2x+3)(1-x)$	-	0	0	-

طائق وتمارين محلولة

• تعريف دالة

الدوال التالية معرفة كلما كان حساب الصورة ممكنا على R ، عين مجموعة التعريف لكل منها:

$$h : x \mapsto \sqrt{x} + \frac{1}{x} . \quad 3 \quad g : x \mapsto \sqrt{x+1} . \quad 2 \quad f : x \mapsto \frac{2x+1}{x(x+1)} . \quad 1$$

حل	تعالق
<p>1. العبارة $f(x) = \frac{2x+1}{x(x+1)}$ تكون معرفة عندما يكون مقامها $x(x+1)$ غير معدهم . لكن ، $x \neq 0$ يكافيء $x \neq -1$.</p> <p>وبالتالي تكون مجموعة تعريف f هي $D_f = R - \{-1; 0\}$. ونكتب أيضا $D_f =]-\infty; -1[\cup]0; +\infty[$.</p>	<p>يوجد نوعان من القيم الممنوعة، أي القيم التي يكون من أجلها حساب الصورة غير ممكن:</p> <ul style="list-style-type: none"> - القيم التي تعد المقامات. - القيم التي يجعل المقاييس تحت الجذر سالبة.
<p>2. العبارة $g(x) = \sqrt{x+1}$ تكون معرفة عندما يكون المقدار الموجود تحت الجذر موجبا . لكن ، $x+1 \geq 0$ يكافيء $x \geq -1$.</p> <p>وبالتالي تكون مجموعة تعريف g هي $D_g = [-1; +\infty[$.</p>	
<p>3. العبارة $h(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{x}$ تكون معرفة عندما يكون المقدار الموجود تحت الجذر موجبا ويكون المقام x غير معدهم . تكون إذن ، العبارة $h(x)$ معرفة عندما يكون $x \geq 0$ و $x \neq 0$.</p> <p>منه مجموعة تعريف h :</p> $D_h =]0; +\infty[$	

طريقة

عند تعريف مجموعة تعريف دالة ، نتعمق في الدستور المعرف للدالة:

- الدستور يتضمن مقاما يظهر فيه المتغير x ، يجب رفض قيمة x التي تعد المقام.
- الدستور يتضمن جزرا تربيعيا يظهر تحته المتغير x ، يجب رفض قيمة x التي يجعل العبارة تحت الجذر سالبة تماما.

• حساب صورة أو سابقة

بفرض f الدالة المعرفة لكل عدد حقيقي يختلف عن 2 - بالشكل:

1. أ) احسب صورة العدد $-0,5$.
 - ب) احسب ، في حالة وجودها ، سابقة (أو سوابق) العدد 3 .
2. احسب باستعمال حاسبة قيما مقربة إلى 10^{-2} لصور الأعداد $\sqrt{3}$ ، $\frac{1}{2}$ ، $-3,5$.

تعاليق

حل

أ) لتعيين صورة العدد $-0,5$ ، نُعوض في الدستور المعرف للدالة f المتغير x بالقيمة $-0,5$:

$$f(-0,5) = \frac{-0,5}{-0,5 + 2} = -\frac{1}{3}$$

صورة العدد $-0,5$ بالدالة f هي العدد الحقيقي $-\frac{1}{3}$.

X	Y1
-2	ERROR
-1	-1
0	0
1	0,33333
2	0,5
3	0,66667
4	

$X = -2$

ب) لتعيين سوابق العدد 3 بالدالة f ، نحل المعادلة $f(x) = 3$

$$\text{لدينا } x = 3x + 6 \text{ أي } \frac{x}{x+2} = 3$$

$$\text{نجد } x = -3$$

العدد 3 يقبل -3 كسابقة وحيدة بالدالة f .

2. نظهر على الشاشة حجز وتذكرة الدوال ونكتب عبارة f

في السطر **Y1** ونصدق :

ENTER Plot1 Plot2 Plot3
Y1 $\times / (X+2)$

نعود إلى شاشة الحساب:

نبت عن Y_1 في المتغيرات: [Y-VARS] 1

نكتب بعد Y_1 وبين قوسين العدد الذي نريد حساب صورته ونصدق. ونحصل، على الشاشة، على الصور المطلوبة:

$Y_1(5)$	4641016151
$Y_1(1/2)$	0,2
$Y_1(-3,5)$	2,333333333

الدالة f غير معرفة من أجل العدد -2 ، فالعدد -2 لا يقبل صورة بالدالة f .

جدول قيم الدالة يشير على ذلك بالعبارة " error " التي تعني " خطأ":

يمكن أن يكون للعدد 3 أكثر من سابقة واحدة بالدالة f كما يمكن أن يقبل سوابق وذلك حسب وجود عدد حلول المعادلة $f(x) = 3$.

للحصول على صور أعداد أخرى، يمكن إعادة كتابة نفس العبارة السابقة باستعمال **2nd ENTER** ثم تعديلها.


طريقة

- لحساب صورة عنصر a من مجموعة تعريف دالة، نُعوض في عبارة الدالة المتغير x بالقيمة a .
- لتعيين السوابق الممكنة لعنصر b ، نحل المعادلة $f(x) = b$ ولا نحتفظ إلا بالحلول التي تتنمي إلى مجموعة تعريف الدالة.
- لحساب صور عناصر من مجموعة تعريف دالة بالحاسبة ولتجنب كتابة وحجز عدة مرات نفس برنامج حساب صورة عدد حقيقي بالدالة f ، نحجز عبارة الدالة ونضعها في ذاكرة الحاسبة ثم نطلب حساب صورة كل من الأعداد المفروضة. في الحاسبة، يرمز للدوال بالشكل: Y_1 , Y_2 , ...

• استعمال التمثيل البياني لدالة

1. قراءة صورة عنصر وفق دالة


طريقة



لقراءة صورة عنصر a وفق دالة f باستعمال التمثيل البياني لهذه الدالة، نضع العدد a على محور الفواصل، نرسم من النقطة $A(a ; 0)$ الموازي لمحور التراتيب. هذا المستقيم يقطع المنحني عند نقطة M ترتيبها $(f(a), 0)$ صورة a وفق الدالة f .

2. قراءة سوابق عنصر وفق دالة

طريقة



لقراءة السوابق الممكنة لعنصر b وفق دالة f باستعمال التمثيل البياني لهذه الدالة، نضع العدد b على محور التراتيب، نرسم من النقطة $B(b; 0)$ الموازي لمحور الفواصل. فوائل نقاط التقاطع (في حالة وجودها) لهذا المستقيم والمنحني هي سوابق b .

• دراسة اتجاه تغير دالة

بفرض الدالة f المعرفة على R بالشكل:

1. بين أن f متزايدة تماماً على المجال $[-1 ; +\infty]$. ما هو اتجاه تغيرها على المجال $[-\infty ; -1]$ ؟
2. شكل جدول تغيرات f . ما هي القيمة الحدية القصوى للدالة f ؟

الحل

تعاليق

1. ليكن a و b عددين حقيقيين من $[-1 ; +\infty)$ حيث $a < b$.

نطبق خواص المتباينات.

لدينا $-1 \leq a < b$ ، لنقارن $f(a)$ و $f(b)$ حيث:

$$f(b) = (b+1)^2 - 3$$
 و $f(a) = (a+1)^2 - 3$
 بما أن $-1 \leq a < b$ فإن $0 \leq a+1 < b+1$.
 ونجد $(a+1)^2 < (b+1)^2$ لأن العددين الموجبين
 مرتبان في نفس ترتيب مربعيهما.

وبإضافة 3 - إلى طرفي المتباينة، نحصل على:

$$(a+1)^2 - 3 < (b+1)^2 - 3$$

إذن، من أجل كل a و b من $[-1; +\infty]$

$$\cdot f(a) < f(b), \quad a < b$$

نستنتج أن f متزايدة تماماً على المجال $[-1; +\infty]$.

■ إذا كان a و b من $[-\infty; -1]$ حيث $a < b$ ، فيكون

$$a < b \leq -1$$

$$\text{منه } a+1 < b+1 \leq 0$$

لكن العددين السالبين يرتبان في عكس ترتيب مربعيهما، وبالتالي $(a+1)^2 > (b+1)^2$.

وبإضافة 3 - إلى طرفي المتباينة، نحصل على:

$$(a+1)^2 - 3 > (b+1)^2 - 3$$

إذن، من أجل كل a و b من $[-\infty; -1]$

$$\cdot f(a) > f(b), \quad a < b$$

نستنتج أن f متناقصة تماماً على المجال $[-\infty; -1]$.

2. جدول تغيرات f :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f(x)$		-3	

ونقرأ على الجدول أن f تبلغ قيمتها الحدية الصغرى وهي (-3) عند القيمة (-1) .

لاحظ أننا نطبق بعض المبرهنات الواردة في درس الترتيب

لاحظ أن الخطوات التي اتبعناها في المجال $[-1; +\infty]$ هي نفسها المتبعة في المجال $[-\infty; -1]$

حاول ان تعرّف على نمط البرهان الذي استعملناه في هذا الحل

طريقة
لتعيين اتجاه تغير دالة على مجال I ، يمكن أن نفرض أن $a < b$ و نقارن بين $f(a)$ و $f(b)$ عبر سلسلة من الاستنتاجات المتواالية معتمدين في ذلك على الفرض الذي انطلقنا منه.

تطبيق

لتكن الدالتان f و g الممثلتان كما في الشكل المقابل.
باستعمال المعلومات الواردة في الشكل، أجب على الأسئلة التالية:

1. عين مجموعة التعريف لكل من f و g .

2. ما هي صورة 0 بكل من f و g ؟


3. ما هي سوابق 0 بكل من f و g ؟

4. ما هي القيمة الحدية الصغرى للدالة f ومن

أجل أي قيمة للمتغير x تتحقق عليها؟

5. أعط جدول تغيرات f على المجال $[1; -3]$.

6. حل المعادلة $f(x) = g(x)$.



7. عين المحالات حيث تكون g سالية تماما.

• إيجاد الدالة التاليفية المعرفة بعدين مختلفين وصورتيهما

أوجد الدالة التاليفية f حيث $f(-4) = 2$ ، $f(1) = -3$. حل

▪ طريقة 1: الدالة التاليفية f تكتب على الشكل $f(x) = ax + b$

x	1	-4
$f(x)$	-3	2

عندما يتغير x بـ 5 ، يتغير $f(x)$ بـ 5 .
لكن $a = -1$ ، منه $a = -1$. وبالتالي

و بما أن $b = -2$ ، نكتب $f(1) = -3 = -1 + b$ أي $b = -2$

وهكذا نجد من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(x) = -x - 2$

▪ طريقة 2: الدالة التاليفية f تكتب على الشكل $f(x) = ax + b$

نحل الجملة:

$$\begin{aligned} -3 &= a + b \\ 2 &= -4a + b \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} f(1) = -3 \\ f(-4) = 2 \end{array} \right\}$$

نجد: $b = -2$ ، $a = -1$

بالتعمipض في الشكل العام للدالة التاليفية، نجد:

من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(x) = -x - 2$

نترجم المعطيات بجدول تناسية.

نستعمل الخاصية المميزة للدوال التاليفية لتعيين a .

إحداثيا كل من نقطتين $M'(1; -3)$ ، $M(-4; 2)$ يحققان المعادلة $y = ax + b$ لل المستقيم الممثل للدالة f .

طريقة

لإيجاد الدالة التاليفية المعرفة بعدين مختلفين وصورتيهما:

▪ حسب معامل التوجيه والترتيب إلى المبدأ.

▪ أو نحل جملة معادلتين.

• تمثيل دالة تاليفية

مثل في المعلم $(O; I, J)$ الدالة f المعرفة على R بالشكل: $f(x) = 2x - 3$

حل


تعاليق

التمثيل البياني للدالة f هو مستقيم معادلته $y = ax + b$

▪ طريقة 1: لرسم هذا المستقيم، يجب معرفة نقطتين.

x	0	1
y	-3	-1

لذلك، نختار قيمتين للمتغير ونحوّل في المعادلة:



▪ طريقة 2: لدينا $a = 2$. نعتبر نقطة $A(1; -1)$ ، مثلاً،

إحداثياها يتحقق المعادلة $y = 2x - 3$.

إذا أضفنا 1 إلى المتغير وأضفنا a إلى الصورة نحصل على نقطة جديدة من المستقيم الممثل للدالة f ، نجد

$B(2; 1)$

لتسهيل الحسابات، يمكن اختيار نقطتي التقاطع مع محور الاحداثيات

اعتمدنا على الخاصية المميزة للدوال التاليفية.

طريقة

تعلم البرهنة

للممثل دالة تألفية، نستعمل نقطتين أو نقطة ومعامل التوجيه.

- برهان على التكافؤ المنطقي والتمييز بين الاستلزم واستلزم العكسي الاستلزم نص رياضي يعني أن فرضية ① تستلزم (أو تؤدي إلى) نتيجة ②.

مثال: إذا كان ① a و b عددين حقيقيين حيث $a \times b = 0$ ، فإن ② $a = 0$ أو $b = 0$ ونكتب ذلك على الشكل: $(a \times b = 0 \text{ حيث } a \text{ و } b \text{ عددان حقيقيان}) \Rightarrow (a = 0 \text{ أو } b = 0)$ في حالات معينة، يكون الاستلزم ② يستلزم ① صحيحا أيضا. نسمى ② يستلزم ① الاستلزم العكسي للاستلزم ① ① يستلزم ② . نقول عندئذ أن النصين ① و ② متكافئان ونكتب ① يكافي ② كما نستعمل أحيانا عبارات مثل "إذا وفقط إذا ... ، يعني" ، ...

دراسة مثال

الخاصية المميزة للدوال التألفية مبرهنة

تكون دالة f تألفية، إذا وفقط إذا كانت، النسبة $\frac{f(x) - f(x')}{x - x'}$ ثابتة من أجل كل عددين حقيقيين مختلفين x و x' .

(يعني أن تزايده الصورة متناسب مع تزايد المتغير).
- أعد صياغة المبرهنة السابقة على شكل استلزم واستلزم عكسي (أي مبرهنة ومبرهنة عكسية).

أولا، نبرهن الاستلزم إذا كانت الدالة f تألفية فإن النسبة $\frac{f(x) - f(x')}{x - x'}$ ثابتة.

من أجل ذلك نفرض f دالة تألفية ، x و x' عددين حقيقيين مختلفين.
لدينا، كون f دالة تألفية، $f(x) = ax + b$ و $f(x') = ax' + b$. وبالتالي $f(x) - f(x') = a(x - x')$.

منه، كون $x \neq x'$ ، $\frac{f(x) - f(x')}{x - x'} = \frac{a(x - x')}{x - x'} = a$

ثانيا، نبرهن الاستلزم إذا كانت f دالة من R في R حيث $\frac{f(x) - f(x')}{x - x'} = a$ ، فإن هذه الدالة تألفية.

إرشاد: هذا الاستلزم يمثل المبرهنة العكسية للمبرهنة المعطاة في الجزء الأول.
للبرهان على المبرهنة العكسية، نفرض دالة f معرفة على R والتي من أجلها "تزايده الصورة متناسب مع تزايد المتغير" نسمى k معامل التناصبية.

1. عدد حقيقي كيقي، أكتب بدلالة k تزايده الصورة بين 0 و x .
2. أستنتج أن الدالة f تألفية.

إعادة استثمار

نسمى الدالة "مربع"، الدالة f المعرفة بالشكل $x^2 = f(x)$. هل التكافؤ الآتي صحيح؟

استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال

- الهدف من هذا النشاط هو التدرب على استعمال الحاسبة البيانية لجز دالة، تمثيلها بيانياً وحل معادلة بيانية.

• حجز دالة

بعد تحديد في البرنامج **MODE** الاختيارات المرغوبة (**Fct** و **Relié**)، نجز الدالة المعرفة بالشكل:


$$f(x) = x^3 - 3x$$

كما يلي:

Plot1 Plot2 Plot3
Y1=X^3-3X
Y2=


Y= X,T,Θ,n MATH 3 - 3
X,T,Θ,n

• إظهار بيان دالة على شاشة حاسبة بيانية




يعطي البرنامج **ZOOM** (أو 6) تمثيلاً بيانياً أول للدالة، يسمح بضبط نافذة إظهار الحاسبة (قصد استغلال الشاشة بشكل جيد) وفق الاختيارات المقابلة.

بواسطة **TRACE**، نتحصل على التمثيل البياني المقابل. نقرأ، في أعلى الشاشة، عبارة الدالة (تبعاً لاختيارات برنامج **FORMAT**).



باستعمال الاختيار 2 للبرنامج **CALC** (**2nd** **CALC**) يمكن تعين قيمة مقربة لأحد جذور $f(x) = 0$.



ملاحظة

يمكن التتحقق من أن $\sqrt[3]{3}$ مثلاً، حل للمعادلة $f(x) = 0$ وذلك باستعمال الإختيار **VALEUR** للبرنامج **CALC** (1).


الهدف من هذا النشاط هو استغلال المنحنى المعطى بحاسبة بيانية ودراسة قيم حدية للدالة الممثلة.

• جدول التغيرات الدالة المعرفة بالشكل: $f(x) = x^3 - 3x$

- باستغلال التمثيل البياني للدالة f ، استنتج جدول تغيرات f .
تبين الدراسة السابقة أن الدالة تقبل قيمة حدية عظمى على المجال $[0; 2]$ ، سنحاول تعين قيمتها.

```
WINDOW
Xmin=-2
Xmax=0
Xscl=1
Ymin=-3
Ymax=3
Yscl=1
Xres=1
```

نغير نافذة الإظهار في WINDOW كما على الشاشة المقابلة.



```
Normal Sci Eng
Float 0123456789
Radian Degree
Fund Par Pol Seq
Connected Dot
Sequential Simul
Real ab/c re^a/bi
Full Horiz G-T
```

في السطر الأخير للبرنامج ،
نختار G-T لنتمكن من إظهار المنحنى
جدول قيم الدالة في آن واحد.
وبواسطة **TRACE** ، نتحصل على الشاشة


- بالتنقل على المنحنى بواسطة وملاحظة التقل على جدول القيم في نفس الوقت، تتحقق من أن الدالة تقبل قيمة حدية عظمى على المجال $[0; 2]$ عند $x=1$ هي $f(1)=2$.

• تمثيل دالة تالفية بحاسبة بيانية

لتمثيل الدالة التالفية f المعرفة على R بالشكل $f(x) = \frac{2}{7}x - \frac{11}{7}$ باستعمال حاسبة بيانية، نتبع

الخطوات التالية:

```
Plot1 Plot2 Plot3
Y1=2/7*X-11/7
Y2=
```



▪ ندخل العبارة باستعمال اللمسة

ZOOM **ENTER** : TI 83

V.WINDOW INIT EXE DRAW : Casio

تسمح بالتنقل على
المسات المنحنى الممثل للدالة.


▪ يمكن أن نبحث مثلا، إن كان المنحنى يمرّ من نقاط ذات إحاثيات صحيحة. من أجل ذلك نستعمل جدول القيم واستعراض مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية:

نختار 2- قيمة صغيرة و **TBLSET** ثم **Tbl=1** للحصول على قيم من 10- إلى 10 .

X	Y1
-3	-2.429
-2	-2.143
-1	-1.857
0	-1.571
1	-1.286
2	-1
3	-0.7143

حل مسألة إدماجية

نريد إحاطة حقل مستطيل الشكل مساحته $450 m^2$ يحده واد من جهة أحد أضلاعه (الشكل).



المطلوب تعين بعدي الحقل الذي يكون من أجله طول السلك الضروري لإحاطته أصغر ما يمكن.

1. باستعمال البيانات الواردة على الشكل، بين أن طول السلك الضروري لإحاطة الحقل L هو:

$$L = x + \frac{900}{x}$$

2. نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[0; +\infty)$

$$f(x) = x + \frac{900}{x}$$

أ) بين أن f متزايدة على المجال $[0; 30]$ ومتناقصة على المجال $[30; +\infty)$.

ب) استنتاج القيمة الحدية الصغرى للدالة f على المجال $[0; +\infty)$ وعند أي قيمة للمتغير x تبلغ f هذه القيمة الحدية.

3. عين عندئذ بعدي الحقل وطول السلك الضروري.


حل

نستنتج أن لكل x و x' عددين حقيقيين من المجال $[0; 30]$ ، $f(x') - f(x) \leq 0$

معنی ذلك، أن f متناقصة على المجال $[0; 30]$.

ولكل x و x' عددين حقيقيين من المجال $[30; +\infty)$ ، $f(x') - f(x) \geq 0$ ،

معنی ذلك، أن f متزايدة على المجال $[30; +\infty)$.



منه جدول تغيرات f :

(الخط الأسود في جدول تغيرات f يعني أن f غير معرفة من أجل $x = 0$).

ب) يتضح على الجدول أن الدالة f تقبل، على المجال $[0; +\infty)$ ، قيمة حدية صغرى على $x = 30$ ، عند $f(30)$.

ج طول الحقل $30 m$ وعرضه $15 m$.

1. بفرض x طول المستطيل، فيكون عرضه $\frac{450}{x}$ (وحدة الطول m) .

عندئذ يكون طول السلك الضروري لإحاطة الحقل L هو:

$$L = x + 2 \times \left(\frac{450}{x} \right)$$

$$L = x + \frac{900}{x}$$

أي:

2. أ) لتكن x و x' عددين حقيقيين من المجال $[0; 30]$. لحسب $f(x') - f(x)$.

لدينا:

$$\begin{aligned} f(x') - f(x) &= x' + \frac{900}{x'} - x - \frac{900}{x} \\ &= \frac{x'^2 x + 900 x - x^2 x' - 900 x'}{xx'} \\ &= \frac{xx'(x'-x) - 900(x'-x)}{xx'} \\ &= \left(\frac{x'-x}{xx'} \right) (xx' - 900) \end{aligned}$$

نلاحظ أن إشارة $f(x') - f(x)$ هي من إشارة

$$\left(\frac{x'-x}{xx'} \right) (xx' - 900) .$$

لأن $\frac{x'-x}{xx'}$ موجب كون $x' > x$.

تمارين وسائل

6. منحني الدالة g :

يقطع محور
الفواصل مرتين

لا يقطع محور
الفواصل مرة
واحدة

أكثر من
سابقتين

7. العدد 0 له:

سابقة واحدة

8. على المجال $[-4; -2]$ ، الدالة g :
سالبة موجبة
ومرة موجبة

9. القيمة الحدية الصغرى للدالة g على $[5; 4]$ هي:

4 -1 -3


10. صورة العدد 4 :
سالبة موجبة

لا نعرف

مفهوم دالة

11. من بين المحننات التالية، بين تلك
التي يمكن أن تمثل دالة:

(1)




(2)



أسئلة متعددة الاختيارات

اختر التأكيد المناسب في كل مما يأتي.

- الأسئلة من 1 إلى 5 تتعلق بالمثلث البياني لدالة (الشكل الموالي). الدالة f ممثلة على المجال الذي يتضمن قيمة ممنوعة.



1. القيمة الممنوعة هي:

1 0 -1

2. للعدد 3 :

صورتان

صورة واحدة

3. للعدد 5 :

سابقتان

سابقة واحدة


4. على المجال $[-2; 1]$ ، الدالة:
ليست متناقصة تماماً متزايدة تماماً
وليس متزايدة

5. على المجال $[-5; 0]$ ، الدالة:

سالبة موجبة
مرة سالبة
ومرة موجبة

- الأسئلة من 6 إلى 10 تتعلق بجدول تغيرات دالة g معطى كما يلي:

x	-4	-2	3	5
	3		4	




13. الجدول التالي يعطي وزن وقامة بعض الفراد:

القامة cm	1,5	1,55	1,6	1,68	1,7	1,6
الوزن kg	50	55	59	60	65	55

1) هل يمكن أن يُعبر عن وزن فرد بدلالة قامته؟ بره.

2) هل يمكن أن يُعبر عن قامة فرد بدلالة قامته؟ بره.

14. علبة بدون غطاء قاعدتها مستطيل أبعادها كما في الشكل:




12. عين مجموعة تعرّف كل من الدوال الممثلة كما يلي:

(1)

1) عبر عن المساحة S للعلبة بدلالة L و h .

2) إذا كانت $L = 10\text{cm}$ و $S = 180\text{cm}^2$ عبر عن h بدلالة L .



الصورة - السابقة

22. لتكن f الدالة المعرفة من أجل كلّ عدد حقيقي x بالشكل:

$$f(x) = 5x^2 - 8x + 3$$

1) احسب صور $3, 1, 0, -4$ بدلالة f .

2) احسب $f(\sqrt{3}), f\left(\frac{2}{3}\right), f(-1), f(4)$

23. لتكن f الدالة المعرفة على المجال $[-5; 4]$ بالشكل:

$$f(x) = \frac{2x+3}{x-5}$$

1) احسب صور $-5,5, -4, -1,5$

2) احسب $f\left(\frac{4}{3}\right), f\left(\frac{1}{2}\right)$

24. بفرض: $x \mapsto f(x) = 2x^2 + 5x - 3$

1) ما هي صور $\sqrt{2}, 0, 5, -3$ ؟

2) ما هي السوابق الممكنة للعدد -3 ؟

25. لتكن f الدالة المعرفة من أجل كلّ عدد حقيقي x بالشكل:

$$f(x) = -7x + 5$$

1) احسب السوابق الممكنة

ببدلالة f للأعداد

$5, -4, 0, 3$

2) حل المعادلتين: $f(x) = \frac{4}{3}, f(x) = -2$

26. لتكن f الدالة المعرفة من أجل كلّ عدد حقيقي x بالشكل:

$$f(x) = x^2 + 6x - 16$$

1) بيّن أنّ: $f(x) = (x+3)^2 - 25$

2) حلّ المعادلة $f(x) = 11$

27. لتكن f الدالة المعرفة على R بالشكل:

$$f(x) = -2x + 3$$

15. أعط الدستور المعرف للدالة: بكلّ عدد حقيقي، نرافق مقلوب مجموع هذا العدد والعدد 3.

16. نفس السؤال من أجل: بكلّ عدد حقيقي، نرافق حاصل قسمة مجموع هذا العدد و 2 على مربعه.

17. أكتب برنامج حجز كلّ من الدوال التالية:

$$x \mapsto f(x) = x^2 - 2x + 1 \quad (1)$$

$$x \mapsto g(x) = \frac{x-1}{x} + 2 \quad (2)$$

$$x \mapsto h(x) = \sqrt{x^2 - 1} - \frac{1}{x} \quad (3)$$

18. أكتب العبارات الموافقة لعبارات الدوال المحوسبة في الحاسبة:

```
Plot1 Plot2 Plot3
\Y1\Box X/(X+2)
\Y2\Box\sqrt(X)-2
\Y3\Box 2X^2-2X+3
\Y4\Box abs(1-X)
\Y5\Box X^2-1/X^2
```

19. عيّن، في \mathbb{R} ، أكبر مجموعة تعريف ممكنة لكلّ من الدوال التالية:

$$x \mapsto f(x) = x^2 - 1 \quad (1)$$

$$x \mapsto g(x) = \frac{2x-1}{-x+3} \quad (2)$$

$$x \mapsto h(x) = \sqrt{2-3x} \quad (3)$$

20. نفس السؤال.

$$x \mapsto f(x) = 2x - \frac{1}{x+1} \quad (1)$$


$$x \mapsto g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \quad (2)$$

- (1) ما هي صورة $-\frac{1}{3}$ ؟ $0,25$ ؟
- (2) ما هي السوابق الممكنة للأعداد:
 $\frac{4}{3}, -\frac{4}{3}, 0$
- (3) هل لكل عدد حقيقي سابق بالدالة f ؟

$C(1; 2)$; $B(-1; 0,5)$; $A(1; 0,5)$
(2) ما هو ترتيب النقطة من C التي فاصلتها 0 ؟

[32]. نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[2; -3]$:


بتمثيلها البياني التالي:



- باستعمال القراءة البيانية، عين عناصر $[2; -3]$:
- التي صورها هي نفسها.
 - الأصغر من صورها.
 - الأكبر من صورها.

[33]. f و g دالتان معرفتان على المجال $[3; -5]$:

بتمثيليهما البيانيين.



حل بيانيا:

$$f(x) \geq g(x) \quad \blacksquare \quad f(x) = g(x) \quad \blacksquare$$

[34]. نعتبر الدالة f المعرفة بالشكل:

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x}{x - 1}$$

- (أ) عين مجموعة تعريف f .
(ب) احسب $f(\sqrt{3})$ ، $f(2)$ (تعطى

$$x \mapsto h(x) = \frac{x - 2}{\sqrt{x^2 - 1}} \quad (3)$$

نفس السؤال.


$$x \mapsto f(x) = \frac{3 - x}{|x| + 2} \quad (1)$$

$$x \mapsto g(x) = \frac{3 - x}{|x| - 2} \quad (2)$$

التمثيل البياني لدالة


[28]. لتكن f الدالة المعرفة على \mathbb{R} والممثلة كما

يليه:





- (1) ما هي صور $-1, 0, 1, 3$ ؟
(2) ما هي السوابق الممكنة للأعداد $1, 0, -1$ ؟

[29]. الدالة f معرفة بتمثيلها البياني، أكمل جدول القيم:




x	-2,5		0	1,5	
$f(x)$		-1			2,5

[30]. أرفق التمثيل البياني بجدول القيم المناسب.



النتائج مدورة إلى 10^{-2}).
ج) احسب السوابق الممكنة للعدد 0 بالدالة f .

(2) أ) أعط، بحسبية بيانية، التمثيل البياني للدالة f
على المجال $[6; -3]$ باختيار نافذة ملائمة.
ب) حل بيانيا $f(x) = 0$.



(2) اقترح مثال لدالة معرفة بواسطة تمثيلها البياني
وأعط جدول تغيراتها

37. ارسم تمثيلاً بيانياً لدالة f تقبل جدول
التغيرات التالي:

x	-1	0	2	4	5
$f(x)$	-2	0	-1	3	0

38. الجدول التالي يمثل تغيرات دالة f
على المجال $[4; -3]$ ، ضع العلامة
 \times في الخانة المناسبة:

x	-3	-2	1	4
$f(x)$	5	0	2	-1

لا نعلم	ص	خ	
			f متزايدة على $[1; 4]$
			$f(3) > 0$
			إذا كان $f(x) = 3$ فإن $x \in [-3; -2]$
			إذا كان $x \in [1; 4]$ فإن $f(x) > 0$

x	-1	0	1
$f(x)$	-1	0	1




x	-0,5	0	1
$f(x)$	0,5	0	0,5

31. ليكن \mathcal{C} المنحني الممثل للدالة f المعرفة

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + 1} \quad \text{على } \mathbb{R} \text{ بالشكل:}$$

1) من بين النقاط التالية، ذكر تلك التي تتنمي
إلى \mathcal{C} :
تغيرات دالة

35. صف، باستعمال عبارات مناسبة تغيرات
الدوال الممثلة كما يلي:




39. المنحني الآتي يمثل دالة f معرفة على $[-5; 4]$.

صف تغيرات الدالة f بإتمام العبارات الآتية:
 "متناقصة على المجال ...".
 "متزايدة على المجال ...".

أرسم منحنى يمكن أن يمثل الدالة f ، علماً أنّ:

- f معرفة على المجال $[-3; 3]$.
- f متناقصة على $[-3; -1]$.
- f متزايدة على $[-1; 3]$.
- $-1 \leq f(x) \leq 4$ ، $x \in [-3; 3]$.

40. الدالة f معطاة بتمثيلها البياني الآتي:



1. عين جدول تغيرات f .

2. عين جدول إشارات f .

3. حلّ بيانيا المتراجحة $f(x) \geq 0$

45. أدرس تغيرات الدالة f المعرفة

على $[1; +\infty)$ بالشكل:


$$f(x) = (x-1)^2 - 1$$

46. استعمل الحاسبة البيانية لتمثيل الدالة f المعرفة على R بالشكل:

$$f(x) = 2x^2 - 2x + 1$$


ما هي القيم الحدية الممكنة للدالة f
 وقيمة المتغير x التي تبلغ عندها هذه
 القيم الحدية؟
 تحقق من ذلك.

36. 1) أعط جدول تغيرات كلّ دالة من الدوال المعرفة بالتمثيلات البيانية أدناه.




" f تقبل قيمة حدية عظمى على المجال $[-5; 4]$ عند ...، تساوي ...".

" f تقبل قيمة حدية صغرى على المجال $[-5; 4]$ عند ...، تساوي ...".



40. المنحني الآتي يمثل دالة f على المجال $[-4; 4]$.



اختر العبارات المناسبة لوصف تغيرات الدالة f :

1. الدالة متزايدة تماماً على المجال $[-4; 2]$.

ومتناقصة تماماً على المجال $[2; 4]$.

2. الدالة متزايدة على المجال $[-4; 2]$ ومتناقصة تماماً على المجال $[2; 4]$.

41. أرسم منحنى يمكن أن يمثل الدالة f ، علماً أنّ:

- f معرفة على المجال $[0; 6]$.

• f متزايدة وسالبة على هذا المجال.


47. نعتبر الدالة f المعرفة على \mathbb{R} بالشكل:

$$f(x) = x^3 + 3x^2 - 2$$

يبين أن الدالة f تقبل قيمة حدية صغرى على المجال $[0; +\infty)$ عند 0.

54

في المعلم المقابل، نعتبر المستقيمات d_1 ، d_2 ، d_3 . أرفق بكل مستقيم دالة التاليفية.



55. المستوى مزود بمعلم (O, I, J) .

(1) عين الدالة التاليفية f الممثلة بالمستقيم الذي معامل توجيهه $-2,5$ - والمار بالنقطة $M(-1; 3)$.

(2) عين الدالة التاليفية g الممثلة في نفس المعلم السابق بالمستقيم الذي يمر بال نقطتين $A(1; 2)$ و $B(4; 4)$.

(3) أعط، باستعمال التمثيل البياني السابق، قيمة مقربة لحل المعادلة $f(x) = g(x)$ في R .

تحقق من ذلك بالحساب.

56. لتكن الدالتان f و g المعرفتان على \mathbb{R} بالشكل:

$$g(x) = x^2 + 5x - 3 \quad f(x) = 2x - 3$$

نسمي C_g و C_f المنحنيين الممثلين لهما في معلم متعمد $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) ما هي طبيعة C_f ؟

(2) عين، باستعمال حاسبة بيانية، نقاط تقاطع المنحنيين.

(3) عين، باستعمال حاسبة بيانية، المجالات حيث:

$$f < g$$

$$f > g$$

(4) قارن جبريا f و g بحسب عباره

الدالة $f - g$. استنتج الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (C_g) .

57. هي الدالة الممثلة كما في الشكل الآتي:

42. أرسم منحنى يمكن أن يمثل الدالة f ، علماً أن:

f معرفة على المجال $[-3; 4]$.

f تقبل قيمة حدية صغرى عند -1 - وقيمة

حدية عظمى عند 2.

$f(-3) = 2$

المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حللين مختلفين.

شفعية دالة

48. هل يمكن أن تكون دالة زوجية وفردية في آن واحد؟

49. أدرس شفعية الدوال الآتية المعرفة على \mathbb{R} :

$$g : x \mapsto x^2 + 3x \quad ; \quad f : x \mapsto x^2 - 1$$

$$t : x \mapsto -x^3 + x \quad ; \quad h : x \mapsto \frac{x}{x^2 + 1}$$

50. أدرس شفعية الدوال الآتية المعرفة على \mathbb{R}^* :

$$g : x \mapsto x + \frac{1}{x} \quad ; \quad f : x \mapsto -\frac{1}{x^2}$$


$$t : x \mapsto x^2 + \frac{1}{x^2} \quad ; \quad h : x \mapsto x + \frac{1}{x^2}$$

51. الشكل المقابل يمثل جزءا من المنحنى الممثل لدالة f معرفة على \mathbb{R} .

أكمل الرسم، بفرض:

f فردية

f زوجية



52. لتكن f دالة معرفة على مجال $[-a; a]$.

على هذا المجال، نعرف الدالتين g و h حيث:

$$g(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}$$


و

$$h(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

1. عين الدالتين g و h تبعا لشفعية الدالة f .

2. ادرس شفعية كل من الدالتين g و h .

الدوال التألفية




- .1 احسب حجم العلبة في حالة $x = 2$.
- ب) عَبَرْ عن الحجم V بدلالة x . نضع (x)
- د) ما هي القيمة الممكنة للعدد x ؟
استنتج D_f مجموعة تعريف f .
- د) ما هو الشرط على x يكون الحجم معادلاً؟
2. أنقل ثم أكمل الجدول الآتي:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$f(x)$										

باستعمال ورق ميليمترى، علم في معلم مناسب النقاط ذات الإحداثيات $((x ; f(x))$ التي يتضمنها الجدول السابق، ثم ارسم المنحني الناتج.

3. باستعمال المنحني السابق، عِين أكبر قيمة يبلغها الحجم. ما هي قيمة x المرتبطة بذلك؟

62. M نقطة متحركة على قطعة المستقيم $[AB]$.
نسمي x الطول $AM = 10 \text{ cm}$.
و $AMEF$ و $MBCD$ مربعان.



نسمي A مجموع مساحتي المربعين.
1. أنقل ثم أكمل الجدول الآتي:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MB											
$A(x)$											

2. ما هو التخمين الذي تضنه حول تغيرات A وقيمها الحدية بمحلاحة الجدول؟
3. عِين عباره $(A(x))$.
4. تتحقق من أنّ: $A(x) = 2(x-5)^2 + 50$
5. عِين جدول تغيرات الدالة A . استنتاج قيمة x التي يكون من أجلها مجموع مساحتي المربعين

53. باختيار معلم للمستوي، مثل بيانياً : \mathbb{R} الدوال التألفية الآتية والمعرفة على \mathbb{R} :

$$g : x \mapsto 3x - 5 ; \quad f : x \mapsto -2x + 3$$

$$h : x \mapsto -2x$$

$$u : x \mapsto 3 ; \quad t : x \mapsto \frac{2}{3}x + 1$$

1. عَبَرْ عن $(f(x))$ بدلالة x .

2. أدرس تغيرات f .

حل المعادلة $f(x) = -I$

58. A ، B نقطتان من المحور (O, I) فاصلتها x .
- 2 ، 3 على الترتيب و M نقطة كيقبية من المحور فاصلتها x .

هي الدالة التي ترافق بكل عدد حقيقي x المجموع $.AM + BM$

$$f(x) = |x+2| + |x-3|$$

1. تتحقق من أنّ $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

2. أكتب $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

3. مثل الدالة f .

مسائل

59. حجم مخروط الدوران ارتفاعه h ومساحة

$$V = \frac{1}{3}bh \text{ هو:}$$



نفرض أنّ h ثابت
ونصف قطر القاعدة x متغير.

عَبَرْ بدلالة x عن الحجم.

60. ABC مثلث متوازي الأضلاع، ضلعه x

و $MNPQ$ مستطيل أحد أضلاعه y .

نسمي f الدالة التي ترافق بالعدد x مساحة المثلث

ABC والدالة g التي ترافق بالعدد y مساحة

المستطيل $MNPQ$.

1. ما هو مجال تعريف f ؟ احسب $f(x)$ بدلالة x .


2. ما هو مجال تعريف g ؟ احسب $g(x)$ بدلالة y .

61. نريد صنع علبة بالطبي انطلاقاً من ورقة


مقوية مربعة ضلعها 18 cm . لذلك نقطع من كل

أصغر ما يمكن.

63. نعتبر f الدالة المعرفة على المجال $[4;4]$ بالشكل: $f(x) = x^2 + x - 6$ التمثيل البياني (C_f) لهذه الدالة معطى كالتالي:





66. $(AB) \parallel (CD)$ شبه منحرف قائم حيث $\hat{B}AD = 90^\circ$ ، $AD = 4$ ، $DC = 5$ ، $AB = 8$



1. احسب مساحة شبه المنحرف $ABCD$.
2. لتكن M نقطة من $[DC]$ ، نضع $x = DM$.
نقطة تقاطع العمود النازل من M و (AB) .
 - (أ) ما هي القيم الممكنة للعدد x ؟
 - (ب) نسمي $f(x)$ مساحة المستطيل $ADMF$. احسب $f(x)$ بدلالة x .
 - (ج) أرسم المنحني الممثل للدالة f .
3. نسمي $g(x)$ مساحة شبه المنحرف $BCMF$.

ركن للورقة مربعاً ضلعه x .



1. بقراءة بيانية، عين:
 - (أ) صورة كلّ من 0 و 2 .
 - (ب) السوابق الممكنة لكلّ من 7 و 4 .
2. حلّ المعادلة $f(x) = 10$
3. في هذا السؤال، المطلوب تبرير النتائج بالحساب:

- (أ) الدالة تبلغ قيمة حدية صغيرة عند $\frac{1}{2}$.

ما هي قيمتها؟


- (ب) احسب السوابق الممكنة للعدد 6 .

$$(f(x) = (x-2)(x+3))$$


- (ج) بين أنّ $f(x) \leq 0$. هل النتيجة منسجمة مع المنحني؟

64. في كلّ من الشكلين الآتيين، $ABCD$ مربع ضلعه 1، M نقطة من $[AB]$. نضع $x = AM$.
ما هي قيم x الممكنة؟

2. يمثل كلّ تمثيل بياني تغيرات المساحة الملونة بدلالة x ، أرفق كلّ منها بالشكل الموافق.



- أ) أوجد عبارة $g(x)$ بدلالة x .
 ب) أرسم، في نفس المعلم السابق، المنحني المماثل للدالة g .
 4. حلّ بيانيا المعادلة $f(x) = g(x)$.



- ح) تحقق من وجود موضعين للنقطة M حيث تكون مساحة المستطيل متساوية $\frac{55}{4} \text{ cm}^2$.
4. باختيار العبارة المناسبة لـ $f(x)$:
 أ) برهن أن $f(x) \leq 16$.
 ب) برهن أن مساحة المستطيل $AMNP$ تساوي $\frac{55}{4} \text{ cm}^2$ عندما يكون:

$$x = \frac{11}{2} \quad \text{أو} \quad x = \frac{5}{2}$$

69. نعتبر الدالة g المعرفة على R بالشكل:


$$g(x) = x^2 - x - 1$$

- احسب، باستعمال حاسبة بيانية، $f(x)$ من أجل كلّ قيم المجال $[-5; 5]$ بالخطوة 0,5.
- باستعمال المعطيات السابقة، أرسم التمثيل البياني للدالة f على المجال $[5; 5]$.
- بالاستعانة بالمنحني السابق، عين عدد حلول المعادلات:

$$f(x) = 5$$

$$f(x) = -1,25$$
; $f(x) = 0$ ؛ $f(x) = -2$ ؛ $f(x) = 4$.
- ما هي القيم الحدية الصغرى والعظمى للدالة f على المجال $[-5; 5]$ ؟
- بملاحظة المنحني، المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًا α في المجال $[1; 2]$. احسب $f(1,6)$ و $f(1,7)$. ماذا تستنتج؟
- احسب قيمة $f\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)$. أعط قيمة مقربة إلى 10^{-3} للعدد

65. من بين التمثيلات البيانية الآتية، بين الذي يترجم مسار متوج " انطلق من مسكنه ومشي مدة ثلاثة ساعات وتوقف مدة ساعة للاستراحة وواصل السير لساعة أخرى، ليرجع إلى نقطة الانطلاق في الحافلة".
67. إناء أسطواني الشكل، ارتفاعه 10 cm ونصف قطر قاعدته $3,5 \text{ cm}$.
 نملاً الإناء بسائل إلى ارتفاع x . نعرف هكذا دالة، هي سعة الإناء V بدلالة x .
 1. عين عبارة $V(x)$.




2. أنقل ثم أكمل الجدول الآتي:
- | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|----|----|
| x | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| $V(x)$ | | | | | | | |
3. أنشئ، في معلم مناسب، المنحني المماثل للدالة.
68. $ABCD$ شبه منحرف قائم، قاعداته $AB = 6 \text{ cm}$ ، $CB = 3 \text{ cm}$ ، $AD = 8 \text{ cm}$ نقطة تقاطع العمود النازل من C و (AD) . نقطة متغيرة من $[AB]$ ، نضع x المار من $[CD]$ في النقطة N و المار من AB في النقطة P .
 1. أ) برهن أن المثلث CHD قائم ومتقابض الضلعين.
 ب) برهن أن $AMNP$ مستطيل وأن المثلث NPD قائم ومتقابض الضلعين.

2. نسمي $f(x)$ مساحة المستطيل $AMNP$ عندما يتغير x في المجال $[0; 6]$.
 أ) عين عبارة $f(x)$ وتحقق أن:
- $$f(x) = 16 - (x-4)^2$$

- ب) أنقل ثم أكمل الجدول الآتي:
- | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| x | 0 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 6 |
| $f(x)$ | | | | | | | | |

$$\cdot \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

7. احسب φ^3 , φ^2 , $\varphi+1$, $1+\frac{1}{\varphi}$ ماذا تستنتج؟




3. المنحني المقابل يمثل الدالة f على المجال $[0 ; 6]$.
- (أ) ما هي مساحة $AMNP$ عندما $AM = 5$ حيث M هو موضع M حيث تكون المساحة أكبر ما يمكن؟

4

الدوال المرجعية

الكفاءات المستهدفة

- تحديد اتجاه التغير و التمثيل البياني لكل من الدوال : $x \mapsto x^2$ ، $x \mapsto \frac{1}{x}$ ، $x \mapsto \sqrt{x}$ ، $x \mapsto \sin x$ و $\cos x$.
- استعمال الدوال المرجعية لمقارنة أعداد أو لحصرها.
- توظيف الدوال المرجعية لدراسة بعض الدوال الأخرى.
- استعمال الدوال المرجعية في حل المشكلات.
- معرفة تحويل الدرجة إلى الرadian و الرadian إلى الدرجة .
- تعليم نقطة على الدائرة المثلثية.
- معرفة العددان $\sin x$ و $\cos x$.
- تحديد اتجاه تغير الدالة "جيب تمام" و الدالة "جيب" على مجال معطى.
- تمثيل الدالة "جيب تمام" و الدالة "جيب" على مجال معطى.



نحتاج في الرياضيات إلى وضع أدوات واصطلاحات تساعدنا على بناء مفاهيم رياضية و التعبير عنها وتبليغها. فالبحث عن مربع عدد أو مقلوبه وتعظيم ذلك إلى عدة أعداد يؤول إلى إيجاد علاقة بين العدد ومربيعه أو بين العدد ومقلوبه ويمكن التعبير عن كل من هاتين العلاقاتين بدالة المربع و دالة المقلوب ومن ثم تمثيل ذلك بيانيًا، والتعمق أكثر في البحث مثلاً عن مقلوب مربعات الأعداد الطبيعية غير المعدومة يؤدي بما إلى الرابط بين هاتين الدالتين مما يعطي دالة جديدة مركبة منها وهو ما يوحى بأهمية دراسة الدوال

المرجعية كدوال أولية تتربّك منها بقية الدوال. ويمدنا تاريخ الرياضيات بشواهد كثيرة على أهمية هذه الدوال، منها استخدامها من طرف بعض الرياضيين في حل بعض المعادلات كما هو شأن أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيام النيسابوري المعروف باسم عمر الخيام نسبة إلى حرفة صنع الخيام والتي امتهنها في صغره (1048م – 1131م) عندما حلَّ المعادلة $x^3 = 2$ ، بطريقتين مختلفتين وظُف في كلٍّ منها دوالاً مرجعية. وفي الطريقة الأولى اعتمد على الدالة المرجعية $y = x^2$ و الدالة $y = \frac{2}{x}$ التي يمكن اعتبارها دالة المقلوب مضروبة في اثنان، إذ بينــ بالتعبير الرياضي الحديثــ أنــ حل هذه المعادلة هو فاصلة نقطة تقاطع منحني هاتين الدالتين. أما في الطريقة الثانية، افترض وجود قطعين مكافئين معادلتها $y = x^2$ و $y = 2x^2$ ويرجع أصل تسمية "القطع المكافئ" الذي يطلق على منحنى دالة المربع وتسمية "القطع الزائد" الذي يطلق على منحنى دالة المقلوب إلى أبولونيوس (262ق.م - 180ق.م) الذي أعطى تسمية قطع مكافئ و قطع زائد إلى بعض المقاطع المستوية لمخروط.

أنشطة

نشاط 1: الدالة "مربع"

اقترحت سلطات منطقة سياحية بيع أراضي لا تفوق مساحتها $3600m^2$ وسعر كل متر مربع هو 1 وحدة (الوحدة هي مليون سنتيم).

قال حميد لشريكه عثمان : " سعر القطعة الأرضية يزداد كلما يزداد طول ضلعها ! " وأضاف عثمان "... و كذلك ينقص كلما ينقص الضلع ".

نرمز x لطول القطعة الأرضية المربعة (الحدة هي المتر) و $f(x)$ لسعرها الحدة هي مليون سنتيم).

1) عين مجموعة تعريف الدالة f باعتبار شروط النص ثم عبر عن $f(x)$ بدلالة x .

2) لخص أقوال حميد و عثمان باستعمال الدالة f .

3) اتمم الجدول الآتي:


x	0	10	20	30	40	50
$f(x)$						

4) استعمل معلم متعمد(O,I,J) و اختر $1cm$ من أجل $10m$ و $2cm$ من أجل 10^9 مليون سنتيم لتمثيل بيانيا الدالة f .

نشاط 2: جيب تمام وجيب زاوية في مثلث قائم

عين جيب تمام و جيب كل من 30° و 45° و

60° باستعمال الشكلين المقابلين



نشاط 3: جيب تمام وجيب زاوية في ربع دائرة

ABC مثلث قائم في A و متقايس الساقين حيث $AB=AC=1$. (C) هي الدائرة التي مركزها A و نصف قطرها AB .

M هي نقطة من القوس الصغيرة BC حيث $\widehat{AMB} = \alpha$.


1) عين إحداثي النقطة في المعلم (A,B,C) .

2) نفرض أن M تتحرك من B نحو C .

- كيف يتغير α ؟

- كيف تتغير فاصلة M ؟

- كيف تتغير ترتيبة M ؟



نشاط 4: زوايا و أقواس على الدائرة المثلثية

نعتبر في معلم متعامد و متجانس ($O; I, J$) الدائرة (C) التي مركزها O و نصف قطرها 1 .

نقطة متحركة على (C) كالتالي:

- إما في الاتجاه المباشر أو الموجب (أي عكس اتجاه دوران عقارب الساعة).

- إما في الاتجاه غير المباشر أو السالب (أي اتجاه دوران عقارب الساعة)

تسمى هذه الدائرة : دائرة مثلثية.

نعتبر النقط $I(1; 0)$ و $J(0; 1)$ و $I'(0; -1)$ و $J'(-1; 0)$.


1) ما هو طول الدائرة (C)؟ (يطلب القيمة المضبوطة).

2) ما هو طول القوس الصغيرة \widehat{IJ} ؟ ما هو طول القوس الكبيرة \widehat{JI} ؟
ما هو طول القوس $\widehat{II'}$ ؟

3) S نقطة تقع في ثلث القوس الصغيرة \widehat{IJ} . ما هو طول القوس الصغيرة \widehat{IS} ؟

4) N هي النقطة من القوس الصغيرة \widehat{IJ} حيث $\widehat{ION} = 60^\circ$ احسب طول القوس الصغيرة \widehat{IN} .

5) نتوجه الان من I نحو N في الاتجاه غير المباشر. ما هو طول القوس \widehat{IN} ؟ ما هو قيس الزاوية \widehat{ION} ؟



نشاط 5: إرافق كل نقطة من الدائرة المثلثية بعدد حقيقي

نعتبر في المعلم المتعامد و المتجانس ($O; I, J$) الدائرة المثلثية (C) و النقطتين

$I(1; 0)$ و $J(0; 1)$. (D) هو المماس للدائرة (C) في I .

A هي النقطة من (D) حيث $\overrightarrow{IA} = \overrightarrow{OJ}$.

ندرج (D) وفق المعلم ($I; A$) . نسمى ' A ' نظيره A' بالنسبة للنقطة I

نقوم بلف نصف المستقيم $[IA]$ على (C) في الاتجاه المباشر وبلف نصف

المستقيم (IA') في الاتجاه غير المباشر .

كل نقطة M_i من (D) تتطابق على نقطة m_i من (C) .

1) انشئ النقط $M_5, M_4, M_3, M_2, M_1, m_1, m_2, m_3, m_4, m_5$ من (C) التي تتطابق عليها النقط

من (D) التي فوائلها هي ، على الترتيب ، $\frac{-13\pi}{6}, \frac{7\pi}{3}, \frac{15\pi}{2}, \frac{-\pi}{4}, \frac{\pi}{4}$.

2) نقطة من (D) فوائلها α ، تتطابق على نقطة a من (C) .

عين بدلالة α ، فوائل نقط أخرى من (C) تتطابق على a .

3) نقطة من (D) فوائلها x ، تتطابق على نقطة m من (C) .

فاوائل m في المعلم ($O; I, J$) تسمى جيب تمام العدد x و نرمز لها $\cos x$.


ترتيب m في المعلم ($O; I, J$) تسمى جيب العدد x و نرمز لها $\sin x$.

4) عين $0, \sin 0, \cos 0$ ، $\sin \frac{3\pi}{2}, \cos \frac{3\pi}{2}, \sin \frac{\pi}{2}, \cos \frac{\pi}{2}, \sin \frac{\pi}{4}, \cos \frac{\pi}{4}$ (1-3)

، $\cos 4\pi, \sin 4\pi$.

5) عين في كل حالة من الحالات الآتية ثلاثة قيم للعدد x :

، $\sin x = -1, \sin x = 1, \sin x = 0, \cos x = -1, \cos x = 1, \cos x = 0$



الدرس

1. الدالة "مربع"

تعريف

الدالة "مربع" هي الدالة التي ترافق بكل عدد حقيقي x مربعه x^2 .



إذا رمنا إلى الدالة مربع بالرمز f ، نكتب $f(x) = x^2$ أو $x \xrightarrow{f} x^2$ مثال:

3 و -3 لهما نفس الصورة بالدالة مربع: $3^2 = (-3)^2 = 9$

• اتجاه التغير

برهنة 1



الدالة مربع متزايدة تماما على $[0, +\infty)$ ، ومتناقصة تماما على $(-\infty, 0]$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x^2		0	

تذكير: إذا كان $x_1 < x_2 \leq 0$ فإن $x_1^2 < x_2^2$ و إذا كان $0 \leq x_1 < x_2$ فإن $x_1^2 > x_2^2$ (حسب قواعد ترتيب الأعداد)

• التمثيل البياني

عندما نمثل في معلم $(O; I, J; x)$ النقط ذات الإحداثيات $(x^2; x)$ نحصل على المنحني الممثل للدالة "مربع".



(C) هو منحني الدالة مربع
معادلة (C) هي: $y = x^2$
يسمى (C) قطعاً مكافئاً ذروته

تمثيل بعض النقط من منحني الدالة مربع

خاصية:

من أجل كل عدد حقيقي x ، لدينا $(-x)$ عدد حقيقي و $x^2 = (-x)^2$ أي $f(-x) = f(x)$.
نستنتج أن الدالة مربع زوجية.

ملاحظة

في معلم متعامد يكون بيان الدالة مربع متاظراً بالنسبة إلى محور التربيع.

2. الدالة "مقلوب"

تعريف

الدالة "مقلوب" هي الدالة المعرفة على المجموعة $[0, +\infty) \cup (-\infty, 0]$ ، والتي ترافق بكلّ عدد حقيقي

$$x \text{ غير معروف مقلوبه } \frac{1}{x}$$

إذا رمزنا إلى الدالة مقلوب بالرمز f ، نكتب أو $x \rightarrow \frac{1}{x}$.


$$\text{مثال: } f\left(-\frac{2}{5}\right) = -\frac{5}{2} \text{ و } f(2) = \frac{1}{2}$$



• إتجاه التغيير

مبرهنة 2

الدالة "مقلوب" متناقصة تماماً على كلّ من المجالين $[0, +\infty)$ و $(-\infty, 0]$




الخط المضاعف في الجدول يعني
أنَّ الدالة "مقلوب" غير معرفة عند 0

تذكير : إذا كان $x_2 < x_1 < 0$ فإن $\frac{1}{x_2} > \frac{1}{x_1}$

وإذا كان $0 < x_2 < x_1$ فإن $\frac{1}{x_2} < \frac{1}{x_1}$ (حسب قواعد ترتيب الأعداد)

• التمثيل البياني

بما أنَّ 0 ليس له صورة بالدالة مقلوب ، فإنَّ منحنيها لا يقطع محور التراتيب .
يسمى المنحنى الممثل للدالة "مقلوب" قطعاً زائداً.



خاصية: من أجل كلّ عدد حقيقي x غير معروف لدينا ($-x$) عدد حقيقي

$$\cdot f(-x) = -f(x) \quad \text{أي } \frac{1}{-x} = -\frac{1}{x}$$

نستنتج أنَّ الدالة مقلوب فردية.

ملاحظة

في كلّ معلم يكون منحنى الدالة مقلوب متاظراً بالنسبة إلى مبدأ هذا المعلم.

3. الدالة "الجذر التربيعى"

تعريف

الدالة "الجذر التربيعى" هي الدالة المعرفة على المجال $[0, +\infty]$ والتي ترافق بكل عدد حقيقي x جذر التربيعى \sqrt{x} .

إذا رمزا إلى الدالة "الجذر التربيعى" بالرمز f ، نكتب $f(x) = \sqrt{x}$ أو $\sqrt{x} \rightarrow f$.

$$\text{مثال: } f\left(\frac{7}{9}\right) = \sqrt{\frac{7}{9}} = \frac{\sqrt{7}}{3} \quad f(0,49) = \sqrt{0,49} = 0,7$$



• إتجاه التغير

الدالة "الجذر التربيعى" متزايدة على المجال $[0, +\infty]$.

x	0	$+\infty$
\sqrt{x}	0	$\nearrow +\infty$

برهان


x_1, x_2 عدوان حقيقيان كييفيان من المجال $[0, +\infty]$ حيث $0 \leq x_1 < x_2$.

$$\text{لدينا} \quad \sqrt{x_1} - \sqrt{x_2} = \frac{(\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2})(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2})}{\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}} = \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}}$$

بما أن $x_1 - x_2 < 0$ و $\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} > 0$ (لأن $x_1 < x_2$) فإن $\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2} > 0$ أي $\sqrt{x_1} < \sqrt{x_2}$ ، إذن الدالة "الجذر التربيعى" متزايدة على $[0, +\infty]$.


• التمثيل البياني

بما أن الدالة "الجذر التربيعى" معرفة فقط على المجال $[0; +\infty]$ فإن منحنيتها يقع في الربع الأول من المعلم كما هو موضح في الشكل المقابل



4. الدالة "جيب" ، الدالة "جيب التمام"

• الدائرة المثلثية




- نقول عن دائرة (C) إنها موجّهة إذا اخترنا عليها اتجاهها للحركة.
- نصطلح على أن **الاتجاه المباشر** (أو الموجب) هو الاتجاه المخالف لاتجاه دوران عقارب الساعة و **الاتجاه غير المباشر** (أو السالب) هو الاتجاه الموافق لاتجاه دوران عقارب الساعة.
- $(O; I, J)$ معلم متعامد ومتجانس للمستوي.

الدائرة الموجّهة التي مركزها O و نصف قطرها I تسمى **دائرة مثلثية**.

• المستقيم العددي والدائرة المثلثية

لتكن الدائرة المثلثية (C) في المعلم المتعامد والمتجانس $(O; I, J)$.
 (D) هو المماس للدائرة (C) في I . K هي النقطة من (D) حيث $\overrightarrow{IK} = \overrightarrow{OJ}$.



* ترافق بكل عدد حقيقي x النقطة m من (D) التي فاصلتها x في المعلم الخطى $(I; K)$ و بلف (D) على (C) ، تطبق النقطة m على نقطة M من (C) .


* كلّ عدد حقيقي x تقابلها نقطة وحيدة M على (C)
 نقول إن M هي صورة x ، ونقول كذلك إن x هو قيس لزاوية الموجة $(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OM})$.

العدد الحقيقي x يسمى قيسا بالراديان لزاوية الموجة $(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OM})$ و نكتب: $(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OM}) = x \text{ rad}$

ملاحظات:

- طول القوس \widehat{IM} هو طول القطعة $[Im]$ و هو $|x|$.
- عندما تتحرك m على (D) انطلاقا من I في اتجاه الشعاع \overrightarrow{IK} : M تتحرك على (C) في الاتجاه المباشر (هنا x عدد موجب) .
- ندما تتحرك m على (D) انطلاقا من I في الاتجاه المعاكس لاتجاه الشعاع \overrightarrow{IK} : M تتحرك على (C) في الاتجاه غير المباشر (هنا x عدد سالب) .
- عبر عن قيس القوس \widehat{IM} و قيس الزاوية الموجة $(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OM})$ بنفس العدد الحقيقي x .
- لـ موضع للنقطة M من الدائرة المثلثية (C) يقابلها لانهاية من الأعداد الحقيقة x من الشكل . $(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OM}) = \alpha \text{ rad}$ حيث: $x = \alpha + k(2\pi)$.

مثال



- دائرة مثلثية ، إذن نصف قطرها r هو 1 ومحيطها $2\pi r$ أي 2π .
- صور النقط J ، I' ، J' هي على الترتيب $\frac{\pi}{2}$ ، π ، $\frac{3\pi}{2}$ ، 0 .
- للعددين $\frac{-\pi}{2}$ و $\frac{3\pi}{2}$ نفس الصورة التي هي J' .
- للأعداد 0 ، 2π ، π - نفس الصورة التي هي I .
- $\left(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ}\right) = \frac{\pi}{2} \text{ rad} : \left(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ}\right) = \frac{\pi}{2}$.


تعريف

- عدد حقيقي x النقطة المرفقة بالعدد x من الدائرة المثلثية .
- في المعلم $(O; I, J)$:
- نسمى جيب تمام العدد الحقيقي x ، فاصلة النقطة M ونرمز إليه $\cos x$. الدالة \cos هي الدالة التي ترافق بكل عدد حقيقي x العدد $\cos x$.
- نسمى جيب العدد الحقيقي x ، ترتيب النقطة M ونرمز إليه بالرمز $\sin x$.

أمثلة

صورة العدد $\frac{\pi}{2}$ هي النقطة $J(0,1)$ إذن $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ و $\sin \frac{\pi}{2} = 1$
 للعددين $\frac{3\pi}{2} = \sin\left(\frac{-\pi}{2}\right) = -1$ و $\cos \frac{3\pi}{2} = \cos\left(\frac{-\pi}{2}\right) = 0$ إذن $J'(0,-1)$ نفس الصورة
 صورة العدد π هي النقطة $I'(-1,0)$ إذن $\cos \pi = -1$ و $\sin \pi = 0$

مبرهنة



برهان

عند حقيقة كافي. $\sin x$ و $\cos x$ هما إحداثيا نقطة M من الدائرة المثلثية (مركزها O ونصف قطرها 1).

- لدينا $OM^2 = 1$ إذن $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
- بما أن $1 = \cos^2 x + \sin^2 x$ فإن $\cos^2 x \leq 1$ لأن $\sin^2 x \geq 0$ و بالتالي $-1 \leq \cos x \leq 1$. بنفس الكيفية نبرهن على أن $-1 \leq \sin x \leq 1$.

الصورتان M و M' للعددين x و $-x$ ، على الترتيب متاظرتان بالنسبة لمحور الفوائل، إذن نقطتين M و M' نفس الفاصلة وترتيبان معاكسان.

• اتجاه تغير الدالتين "جيب تمام" و "جيب" على المجال $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$


خاصية 1

في الشكل المقابل :

العدنان الحقيقيان x و x' ينتميان إلى المجال $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

وصورتاهم M و M' تتغيران على ربع الدائرة من I إلى J
 إذا كان $x < x'$ فإن $\cos x > \cos x'$ و $\sin x < \sin x'$.
 نستنتج أن:

• الدالة $\cos x$ متزايدة تماما على المجال $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ • الدالة $\sin x$ متناقصة تماما على المجال $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$



خاصية 2

في الشكل المقابل :



العدنان الحقيقيان x و x' ينتميان إلى المجال $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ و

صورتاهم M و M' تتغيران على ربع الدائرة من J إلى I' .


إذا كان $x' < x$ فإن $\cos x' > \cos x$ و $\sin x' > \sin x$ نستنتج :

- الدالة \cos متناقصة تمام على المجال $\left[\frac{\pi}{2}, \pi \right]$
- الدالة \sin متناقصة تماما على المجال $[0; \pi]$


- جدول تغيرات الدالتين "جيب تمام" و "جيب" على المجال $[0; \pi]$ نستنتج من الخاصية 1 و من الخاصية 2 :



• التمثيل البياني





• ننشئ التمثيل البياني للدالة \cos على المجال $[0, \pi]$ انطلاقا من جدول تغيراتها.
نتم هذا الرسم على $[-\pi, 0]$ بالتناظر بالنسبة للمبدأ لأن الدالة \cos زوجية.



• ننشئ التمثيل البياني للدالة \sin على المجال $[0, \pi]$ انطلاقا من جدول تغيراتها.
نتم هذا الرسم على $[-\pi, 0]$ بالتناظر بالنسبة للمبدأ لأن الدالة \sin فردية.

ملاحظة: بيان الدالة "جيب تمام" و بيان الدالة "جيب" على \mathbb{R} هما



لاحظ انه يمكن استنتاج أي جزء من بيان الدالة "جيب تمام" (أو الدالة "جيب") من الجزء الملون بالأحمر وذلك بانجاز "دوريا" مثيلات له لأن من أجل كل عدد حقيقي x لدينا $\cos(x + 2\pi) = \cos x$ و $(\sin(x + 2\pi) = \sin x)$ نقول إن الدالة "جيب تمام" (الدالة "جيب" أيضا) دورية ودورها 2π .

طرائق وتمارين محلولة




1. الدالة "مربع"

• إيجاد حصر للعدد x^2 إنطلاقاً من حصر العدد x

جد حسراً للعدد x^2 في كل حالة من الحالات الآتية:

$$x \in [-2,1] \rightarrow$$

$$(a) -2 \leq x \leq -1; \quad (b) 1 \leq x \leq 2;$$



حل	تعليق
	<ul style="list-style-type: none"> لاحظ أن $(-x)^2 = x^2$ و x^2 مختلفان.
	<ul style="list-style-type: none"> عندما يعطى $a \leq x \leq b$ حيث $a < b$ فإنه يمكن حصر x^2 باستعمال القطع المكافئ الممثل بـ ملاحظ أكبر قيمة وأصغر قيمة للعدد x^2 من أجل $x \in [a,b]$.
	<p>الدالة المربع متزايدة على $[0, +\infty[$. المجال $[1, 2]$ محتواة في المجال $[0, +\infty[$ ومنه: إذا كان $1 \leq x \leq 2$ فإن $1^2 \leq x^2 \leq 2^2$ أي $1 \leq x^2 \leq 4$</p> <p>الدالة المربع متناقصة على $(-\infty, 0]$ غير محتوى في $[0, +\infty[$ أو في $(-\infty, 0]$. نرى في التمثيل البياني أنه إذا كان $-2 \leq x \leq -1$ فإن $(-1)^2 \leq x^2 \leq (-2)^2$ أي $1 \leq x^2 \leq 4$</p>

طريقة

يمكن حصر مربع عدد حقيقي معطى باستعمال اتجاه تغير الدالة مربع أو باستغلال تمثيلها البياني

• حل معادلات ومتراجحات باستعمال التمثيل البياني للدالة $f : x \rightarrow x^2$

أ) حل المعادلتين : $x^2 = 4$ ، $x^2 = -2$. ب) حل المتراجحتين : $x^2 \leq 4$ ، $x^2 \geq 4$.


حل	تعليق
	<p>عندما نحل معادلة بيانيًا، نتحصل في غالب الأحيان على قيمة مقربة للحلول.</p>
	<p>لا يوجد أي عدد حقيقي x حيث $x^2 = -2$. مجموعه حلول المعادلة هي Φ (أي المجموعة الخالية).</p>

يوجد عددين يحققان $x^2 = 4$ وهما 2 و -2 .


مجموعه حلول المعادلة $x^2 = 4$ هي $\{-2, 2\}$.

من أجل كل عدد حقيقي x ، $x^2 \geq 0$

(ب)



مجموعة الأعداد الحقيقية x حيث $x^2 \geq 4$ هي $[-\infty, -2] \cup [2, +\infty]$ أي مجموعة حلول المترابحة $x^2 \geq 4$ هي $. [-\infty, -2] \cup [2, +\infty]$.



مجموعة الأعداد الحقيقية x حيث $x^2 \leq 4$ هي $[-2, 2]$ أي مجموعة حلول المترابحة $x^2 \leq 4$ هي $[-2, 2]$.

نستغل الوضع النسبي للمنحنى الممثل للدالة "مربع" والمستقيم الذي معادلته $y = 4$

طريقة

حل المعادلة $x^2 = m$ بيانيا:

نشئ التمثيل البياني (C) للدالة $f(x) = x^2$ ، والمستقيم (D) الذي معادلته $m = y$. حلول المعادلة في حالة وجودها، هي فوائل نقط تقاطع (C) و (D).

• توظيف الدالة مربع لدراسة اتجاه تغير الدالة $f : x \mapsto (x+a)^2 + b$ وتمثيلها بيانيا

ادرس اتجاه تغير الدالة $f : x \mapsto (x+2)^2 + 3$ ثم مثملها بيانيا.

حل

تعاليق

1) دراسة اتجاه تغير f

- الدالة التالية $x \mapsto x+2$ متزايدة و سالبة في المجال $[-\infty, -2]$ و متناقصة و موجبة في المجال $[-2, +\infty]$.
- دراسة اتجاه تغير الدالة f في المجال $[-\infty, -2]$:
 - x_1 و x_2 عدادان حقيقيان حيث $-2 < x_1 < x_2 < \dots$
 - نضيف 2 لأطراف (أ) و نجد $0 < x_1 + 2 < x_2 + 2$
 - إذن $(x_1 + 2)^2 > (x_2 + 2)^2 \dots$ لأن الدالة مربع متناقصة على $[-\infty, 0]$
- نضيف 3 لطيفي (أ) و نجد $3 > (x_2 + 2)^2 + 3 > (x_1 + 2)^2 + 3 \dots$ أي $f(x_1) > f(x_2)$
- الخلاصة : إذا كان $x_1 < x_2$ فإن $f(x_1) > f(x_2)$ أي f متناقصة على $[-\infty, -2]$

- لاحظ أن القيمة -2 التي ت عدم المقدار $x+2$ هي القيمة التي تقسم \mathbb{R} إلى المجالين المعتمدين في هذه الدراسة.

- لاحظ أيضاً أن إضافة العدد 3 لا يغير من اتجاه المتباينات المستعملة.

- دراسة اتجاه تغير الدالة f في المجال $[-2, +\infty)$:
 - x_1 و x_2 عدادان حقيقيان حيث $-2 < x_1 < x_2 < \dots$ (ب)
 - نضيف 2 لأطراف (ب) و نجد $0 < x_1 + 2 < x_2 + 2$
 - إذن $(x_1 + 2)^2 < (x_2 + 2)^2 \dots$ لأن الدالة مربع متزايدة على $[-2, +\infty)$

نضيف 3 لطيفي (ب ب) و نجد $(x_1 + 2)^2 + 3 < (x_2 + 2)^2 + 3$ أي $f(x_1) < f(x_2)$.
الخلاصة: إذا كان $x_1 < x_2$ فإن $f(x_1) < f(x_2)$ أي f متزايدة على $[-2, +\infty]$.

- يمكن دراسة اتجاه تغيير الدوال من الشكل $x \rightarrow m(x+a)^2 + b$ بنفس الكيفية.


• نستنتج جدول تغيرات الدالة f على \mathbb{R} :

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
f		↘ 3	↗

2) تمثيل f بيانياً

نسمى (C) التمثيل البياني للدالة f و (P) التمثيل البياني للدالة $x \rightarrow x^2$.

$y = (x+2)^2 + 3$ تتنمي إلى (C) إذا و فقط إذا كان



أي $y - 3 = (x+2)^2$.
النقطة $N(x+2, y-3)$ تتنمي إلى
القطع المكافئ (P) إذن نمر من
إلى (C) بالانسحاب الذي
شعاعه $\vec{V}(-2, 3)$.

- يمكن استنتاج جدول تغيرات الدالة f انطلاقاً من تمثيلها البياني (C).

طريقة

لدراسة تغيرات الدالة $f : x \rightarrow (x+a)^2 + b$:

• نحدد اتجاه تغيير الدالة التالية $x \rightarrow x+a$ و إشارتها على المجالين $[-\infty, -a]$ و $[-a, +\infty]$.

• نحدد اتجاه تغيير الدالة $x \rightarrow (x+a)^2$ على المجالين $[-\infty, -a]$ و $[-a, +\infty]$ ثم نستنتج جدول تغيرات الدالة f .

يمكن تمثيل f بيانياً كالتالي:

(C) هو التمثيل البياني للدالة f و (P) هو القطع المكافئ الذي يمثل الدالة مربع.

• نبين أن نقطة $M(x, y)$ تتنمي إلى (C) إذا و فقط إذا كانت النقطة $N(x+a, y-b)$ تتنمي إلى (P).

• نعين شعاع الانسحاب الذي يسمح بالمرور من (P) إلى (C) و هكذا نستنتج إنشاء (C).

إعادة استثمار

أ) ادرس اتجاه تغيير الدالة $f : x \mapsto -2(x-3)^2 + 1$ ، ثم استنتاج اتجاه تغيير الدالة $g : x \mapsto 2(x-3)^2 + 1$.



ب) خمن نتائج تعطي فيها اتجاه تغيير الدالة $h : x \mapsto m(x-3)^2 + 1$ ؟ ثم تحقق من صحتها.

→ بصفة عامة خمن اتجاه تغيير الدالة $a(x+b)^2 + c$ حيث $a, b, c \in \mathbb{R}$ أعداد حقيقة و غير معروفة. برهن صحة المخمنة التي وضعتها.

2. الدالة "مقلوب"

• حصر $\frac{1}{x}$

ماذا يمكن أن نستنتج فيما يخص $\frac{1}{x} \leq -\frac{1}{2}$ في كل حالة: (أ) $x \leq -\frac{1}{2}$ ، (ب) $0 < x \leq 2$

حل	تعليق
 $\text{المجال } [0, +\infty[\text{ محتواة في }]0, 0,2] \text{ و الدالة مقلوب متاقصة على } [0, +\infty[.$ $\text{إذا كان } x \leq 2 \text{ فإن } \frac{1}{x} \geq \frac{1}{2} \text{ أي } \frac{1}{x} \geq -\frac{1}{2} \text{ فإذا كان } -2 \leq x \leq -\frac{1}{2} \text{ فإن } -2 \leq \frac{1}{x} < 0$	<p>• إذا كان: $a \geq b > 0$ فإن: $0 < \frac{1}{a} \leq \frac{1}{b}$</p>
 $\text{المجال }]-\infty, 0[\text{ محتواة في }]-\infty, -\frac{1}{2}[\text{ و الدالة مقلوب متاقصة على }]-\infty, 0[.$ $\text{إذا كان } -2 \leq x \leq -\frac{1}{2} \text{ فإن } -2 \leq \frac{1}{x} < 0$	<p>• إذا كان: $0 > a \geq b$ فإن: $\frac{1}{a} \leq \frac{1}{b} < 0$</p>

طريقة

لمقارنة مقلوبات أعداد حقيقية لها نفس الإشارة، يمكن استعمال تناظر الدالة مقلوب على $]-\infty, 0[$ أو على $[0, +\infty[$.

• دراسة اتجاه تغير الدالة $f : x \mapsto a + \frac{b}{x+c}$

درس تغيرات الدالة $f : x \mapsto 3 - \frac{2}{x+1}$

حل	تعليق
 $\text{(1) الدالة } f \text{ تكون معرفة من أجل } x \neq -1 \text{ إذن مجموعة تعريفها هي } \mathbb{R} \text{ ماعدا } -1 \text{ أي }]-\infty, -1[\cup]-1, +\infty[.$ $\text{(2) تخمين تغيرات الدالة } f: \text{ يظهر ان } f \text{ متزايدة على }]-\infty, -1[\text{ و متزايدة على }]-1, +\infty[.$ $\text{(3) لنبرهن المخمنة في المجال }]-\infty, -1[:$ $\text{نفرض: } x_1 \text{ و } x_2 \text{ عددين حقيقيان ينتميان إلى }]-\infty, -1[\text{ أي } x_1 < x_2 < -1 \text{ أي } x_1 + 1 < x_2 + 1 < 0.$ <p>نضيف 1 لطرفي (i) و نجد $0 < x_1 + 1 < x_2 + 1 < 0$</p> <p>العددان $x_1 + 1$ و $x_2 + 1$ سالبان تماماً لأن الدالة مقلوب متاقصة على $]-\infty, 0[$.</p>	<p>لتخمين تغيرات f يمكن استخدام الحاسبة البيانية أو البرمجية المناسبة</p>

- نضرب طرفي (ii) في -2 و نجد $\dots \frac{-2}{x_1+1} < \frac{-2}{x_2+1}$
 - نضيف 3 لطرفي (iii) و نجد $3 - \frac{2}{x_1+1} < 3 - \frac{2}{x_2+1}$ أي $f(x_1) < f(x_2)$
 - الخلاصة: إذا كان $f(x_1) < f(x_2)$ فإن $x_1 < x_2$ إذن f متزايدة على $[-\infty, -1]$
- (لبرهن المخمنة في المجال $[-1, +\infty]$:
- بإتباع نفس الخطوات نجد أن من أجل كل x_1 و x_2 حيث لدينا $f(x_1) < f(x_2)$ أي f متزايدة على $[-1, +\infty]$.

طريقة

لدراسة تغيرات الدالة : $f : x \mapsto a + \frac{b}{x+c}$

• نعيّن مجموعة تعريف الدالة f : نجد $]-\infty, -c[\cup]c, +\infty[$


• نخمن النتيجة .

• نبرهن المخمنة باستعمال خواص المتباينات واتجاه تغير الدالة مقلوب .

• مقارنة x و x^2 و x^3 و \sqrt{x} من أجل $x \geq 0$

قارن بين الأعداد x و x^2 و x^3 و \sqrt{x} من أجل $x \geq 0$.

الحالات



لتخمين نتيجة
لقارنة
الأعداد
 x و x^2 و x^3 و \sqrt{x} : يمكن
استغلال
منحنيات
الدوال f ، g و h و k و h
تحصل على
هذه
المنحنيات
مستقيدين في
ذلك مما
توفره
الحسابية
البيانية

طريقة

لمقارنة الأعداد x و x^2 و x^3 و \sqrt{x} :

- نخمن النتيجة بواسطة الحاسبة البيانية أو بواسطة برمجية.
- نستعمل قواعد الترتيب أو تغيرات دوال مرجعية.

3. الدالتان "جيب التمام" و"جيب"

• تحويل الرadian إلى الدرجة و الدرجة إلى الرadian

و 36° قيسان لزاويتين. عين قيساً للزاوية الأولى بالدرجة و عين قيساً للزاوية الثانية بالرadian.

$\frac{3\pi}{4}$	x	π	راديان
y	36	180	درجة

حل

نعلم أن $180^\circ = \pi \text{ rad}$. لإنجاز هذه التحويلات، يمكن استعمال

$$y = \frac{180}{\pi} \times \frac{3\pi}{4} = 135 \quad \text{و} \quad x = \frac{\pi}{180} \times 36 = \frac{\pi}{5}$$

π	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{\pi}{5}$	راديان
180	135	36	درجة

تعالق

• لاحظ في جدول التنسية :

$$\frac{\frac{\pi}{5}}{36} = \frac{\frac{3\pi}{4}}{135} = \frac{\pi}{180}$$

طريقة

التحويل من وإلى الدرجة والرadian تتم باستعمال التنسية و $\pi \text{ rad} = 180^\circ$.

• وضع نقط على الدائرة المثلثية

آ) وضع على الدائرة المثلثية النقاط A و B و C التي صورها $\frac{\pi}{3}$ و $\frac{2\pi}{3}$ و $-\frac{\pi}{3}$ على الترتيب.


ب) جد عدداً مختلفاً عن $\frac{\pi}{3}$ و صورته A .

ج) وضع على الدائرة المثلثية النقطة E التي صورتها $-\frac{35\pi}{4}$ ثم النقطة F التي صورتها $\frac{197\pi}{4}$.

حل

نتصور أنّ نقطة M تتحرك على الدائرة المثلثية منطلقة من النقطة $I(1,0)$.
النقط A و B و C هي وضعيات مختلفة للنقطة M .

(آ) $\frac{\pi}{3}$ و $\frac{2\pi}{3}$ عددان موجبان إذن M تتحرك في الاتجاه المباشر
لتحديد الوضعية A : ننشئ المثلث المتقايس الأضلاع IOA بالمدور.




لتحديد الوضعية B : ننقل القوس \widehat{IA} مرتين.

$\frac{\pi}{3}$ - عدد سالب إذن M تتحرك في الاتجاه غير المباشر.

لتحديد الوضعية C : ننشئ المثلث المتقايس الأضلاع IOC بالمدور

ب) لإيجاد عدد آخر يكون صورة لنقطة A نضيف 2π للعدد $\frac{\pi}{3}$.

A هي صورة $\frac{\pi}{3}$ و كذلك صورة $\frac{\pi}{3} + 2\pi$ أي $\frac{7\pi}{3}$.



تعالق

A هي

صورة العدد
ال حقيقي x .

إذا تحركت
 A في الاتجاه
المباشر و


انجزت
دورة فإنها
ترتجع إلى
وضعياتها

الأولى و
بالتالي
النقط A هي

صورة كل
عدد حقيقي
من الشكل


$x + k \times 2\pi$

(طول دورة
 2π) .



جـ) $\frac{197\pi}{4}$ عدد موجب إذن M تتحرك في الاتجاه المباشر و نقطع قوسا IE طوله $\frac{197\pi}{4} \text{ rad}$ بعد عددة دورات.

نقسم 197 على 4 و نجد $49 \times 4 + 1 = 197$ و منه $\frac{197\pi}{4} = 49\pi + \frac{\pi}{4}$. العدد 49π يعبر عن " 24 دورة و نصف دورة ". بعد 24 دورة و نصف دورة ، M تتطبق على I' و يبقى لها قطع القوس EJ' الذي طوله $\frac{\pi}{4}$ هي منتصف القوس EJ .



ـ $\frac{-35\pi}{4}$ عدد سالب إذن M تتحرك في الاتجاه غير المباشر و نقطع قوسا طوله $\frac{35\pi}{4}$. و وبالتالي M تنطلق من I و نقطع $\frac{35\pi}{4} = 8\pi + \frac{3\pi}{4}$ و منه F تتطبق على E . 4 دورات و قوس طوله $\frac{3\pi}{4}$ ، منه F تتطبق على E .

طريقة

نعين الصورة M لعدد حقيقي x على دائرة المثلثية كالتالي:

- إذا كان $x \geq 0$: نقطع قوسا طولها x في الاتجاه المباشر و في الحالة $x \geq 2\pi$ ، نكتب x على الشكل $x = k \times 2\pi + \alpha$ باستعمال القسمة (k هو عدد دورات M و α عدد حقيقي ينتمي إلى $[0, \pi]$).
- إذا كان $0 \leq x < 2\pi$: نقطع قوسا طولها $|x|$ في الاتجاه غير المباشر و في الحالة $2\pi \geq |x| \geq 0$ ، نكتب $|x|$ على الشكل $|x| = k \times 2\pi + \alpha$ باستعمال القسمة (k هو عدد دورات M و α عدد حقيقي ينتمي إلى $[0, \pi]$).

• جيب تمام و جيب قيم شهرة

(1) احسب جيب تمام و جيب القيم الشهرة 0 و $\frac{\pi}{2}$ و π .

حل

تعالق

نعين الصورة M على الترتيب، صور النقاط $I(1,0)$ و $J(0,1)$ و $I'(-1,0)$ و $J'(-1,0)$ هي ، على الترتيب، صور النقاط $(0,0)$ و $(0,1)$ و $(-1,0)$ و $(-1,0)$

$\cos \pi = -1 \quad \left. \begin{array}{l} \cos \frac{\pi}{2} = 0 \\ \sin \frac{\pi}{2} = 1 \end{array} \right\}$ و $\left. \begin{array}{l} \cos 0 = 1 \\ \sin 0 = 0 \end{array} \right\}$ و في دائرة المثلثية. نستنتج أن

$$\left. \begin{array}{l} \cos\left(-\frac{3\pi}{2}\right) = 0 \\ \sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right) = 1 \end{array} \right\}$$

طريقة


لحساب $\cos x$ و $\sin x$ نقرأ إحداثي الصورة M للعدد x .

2) احسب جيب تمام و جيب القيم الشهيرة: $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{4}$.


حل

تعاليق

- في مثلث ABC قائم في A و متقايس الساقين لدينا: $BC = AB\sqrt{2}$




M هي صورة العدد $\frac{\pi}{4}$ هي منتصف القوس \widehat{IJ} . بما أن $\widehat{MOI} = 45^\circ$ فإن المثلث MOH القائم في H يكون متقايس الساقين. باستعمال مبرهنة فيتاغورس نجد: $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ أي $OH = OL = \frac{\sqrt{2}}{2}$



M' هي صورة العدد $\frac{\pi}{3}$ هي تقاطع القوس \widehat{IJ} مع الدائرة التي مركزها I و نصف قطرها 1 . لدينا $OI' = OM'$ إذن المثلث $M'OI$ متقايس الأضلاع.

■ H' هي منتصف $[OI]$ إذن $OH' = \frac{OI}{2} = \frac{1}{2}$ أي $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$.

■ باستعمال مبرهنة فيتاغورس نجد $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \sqrt{3}$ أي $M'H' = \frac{\sqrt{3}}{2}$



M'' هي صورة العدد $\frac{\pi}{4}$ هي منتصف القوس $\widehat{I'M'}$.

لدينا $\widehat{JOM''} = 60^\circ$ و $OJ = OM'' = 1$ إذن المثلث JOM'' متقايس الأضلاع و منه L'' هي منتصف $[OJ]$.

نستنتج $OH'' = L''M'' = \frac{\sqrt{3}}{2}$ و $OL'' = \frac{OJ}{2} = \frac{1}{2}$ أي

$\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ و $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$

- في مثلث متقايس الأضلاع ضلعه c و ارتفاعه h لدينا: $h = c \frac{\sqrt{3}}{2}$

طريقة


نحسب جيب تمام و جيب القيم $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{4}$ باستعمال المكتسبات في الهندسة.

• حساب حيب تمام و حيب لقيم مستنيرة من قيم شهيرة.


احسب حيب تمام و حيب القيم $\frac{5\pi}{4}$, $\frac{3\pi}{4}$ و $\frac{\pi}{4}$.

حل


تعاليل



الصورة M للعدد $\frac{\pi}{4}$ و الصورة N للعدد $-\frac{\pi}{4}$ متناظرتان بالنسبة لمحور الفواصل و بالتالي $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ و $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$



الصورة M للعدد $\frac{\pi}{4}$ و الصورة N' للعدد $\frac{3\pi}{4}$ متناظرتان بالنسبة لمحور التراتيب و بالتالي $\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = -\cos\frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ و $\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$



الصورة M للعدد $\frac{\pi}{4}$ و الصورة N'' للعدد $\frac{5\pi}{4}$ متناظرتان بالنسبة لمبدأ المعلم و بالتالي $\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) = \cos\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = -\cos\frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ و $\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right) = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = -\sin\frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

نقسم 201π على 4 و نجد $201 = 4 \times 50 + 1$ و منه $\frac{201\pi}{4} = 50\pi + \frac{\pi}{4}$

لتكن P صورة العدد $\frac{201\pi}{4}$. P تحركت انطلاقاً من النقطة $I(1,0)$ و قطعت 25 دورة

و قوس طوله $\frac{\pi}{4}$ وبالتالي P تتطابق على النقطة M صورة $\frac{\pi}{4}$. نستنتج

$$\sin\frac{201\pi}{4} = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \cos\frac{201\pi}{4} = \cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

أن :

لحساب
جيب تمام و
جيب قيمة غير
شهيرة مثل
 $\frac{\pi}{11}$ ، $\frac{\pi}{7}$
نكتفي
بقيم مقربة
تحصل عليها
بواسطة
الحاسبة.

طريقة



حساب جيب تمام وجيب قيمة x يؤول إلى حساب جيب تمام و جيب عدد حقيقي محصور بين 0 و $\frac{\pi}{2}$

$\cos(\pi + x) = -\cos x \quad \cos(\pi - x) = -\cos x \quad \cos(-x) = \cos x$ يمكن استعمال :
 $\sin(\pi + x) = -\sin x \quad \sin(\pi - x) = \sin x \quad \sin(-x) = -\sin x$

(العدد الطبيعي k هو عدد الدورات). $\cos(x + k \times 2\pi) = \cos x \quad \sin(x + k \times 2\pi) = \sin x$

• مقارنة العددين x و $\sin x$

قارن بين العددين x و $\sin x$ إنطلاقاً من قراءة بيانية

حل	تعاليم
<p>• عندما $0 \leq x \leq 1$ نقرأ على الشكل المقابل:</p>  <p>$MH \leq MI \leq \widehat{MI}$ و بما أن : $\widehat{MI} = x$ و $MH = \sin x$ فإن : $\sin x \leq x$</p>	<ul style="list-style-type: none"> • نقارن بين x و $\sin x$ من أجل $0 \leq x \leq 1$ لأن من أجل كل عدد حقيقي x لدينا $-1 \leq \sin x \leq 1$. • حذار! يجب أن يكون x بالراديان. • يمكن مقارنة x و $\sin x$ بدراسة الوضع النسبي لمنحني الدالتين $y = x$ و $y = \sin x$.
<p>• عندما $0 \leq -x \leq 1$: يكون $-1 \leq x \leq 0$ إذن $\sin(-x) \leq -x$ (حسب النتيجة السابقة). الدالة \sin فردية و منه $\sin(-x) = -\sin x$. نستنتج $\sin x \geq x$ أي $\sin x \leq -x$.</p> <p>الخلاصة: إذا كان $0 \leq x \leq 1$ فإن $\sin x \leq x$ إذا كان $-1 \leq x \leq 0$ فإن $\sin x \geq x$</p>	
طريقة نستعمل دائرة المثلثية أو التمثيل البياني للدالة $x \rightarrow x$ و التمثيل البياني للدالة $\sin x$	

تعلم البرهنة

الهدف : حل مسألة وجود بياناً

هل يوجد مستطيل مساحته $153m^2$ و محیطه $52m$ ؟

- **المرحلة الأولى:** ترجمة المعطيات

في حالة وجود مستطيلاً من هذا النوع، نحاول البحث عن بعديه x و y .

$$\text{نترجم المعطيات بالجملة } \begin{cases} x + y = 26 \\ xy = 153 \end{cases} \text{ أي } \begin{cases} 2(x+y) = 52 \\ xy = 153 \end{cases} \quad (1)$$

مرفقة الشرطين $x > 0; y > 0$

- **المرحلة الثانية:** إيجاد فكرة لتوظيف الجملة أعلاه

يمكن الاستفادة من الدالة التالية والدالة مقلوب لأننا نستطيع أن ننظر إلى المعادلة $x + y = 26$ على أنها معادلة مستقيم وبالنسبة للمعادلة $xy = 153$ نستفيد من الدالة مقلوب، باعتبار أنها يمكن أن تكتب على الشكل $y = \frac{153}{x}$. فتحوّل مسألة البحث عن وجود مستطيل معطى بدالة بمساحته و محیطه إلى مسألة بيانية تستغل فيها المنحنيات و يصبح عندئذ البحث عن إحداثيات نقط تقاطع المنحنيين هو المرحلة الموالية للحل.

- **المرحلة الثالثة:** تتفيد الفكرة توصلنا إليها أعلاه


$$\left. \begin{array}{l} y = 26 - x \\ y = \frac{153}{x} \end{array} \right\} \text{نكتب الجملة (1) على الشكل}$$

يوجد مستطيل يحقق الشروط المعطاة يعني يوجد عدد حقيقي x يحقق $\frac{153}{x} = 26 - x$ (ب)

نسمي (C_f) بيان الدالة f المعرفة على $[0; +\infty)$ بالشكل $f(x) = \frac{153}{x}$
و (C_g) بيان الدالة g المعرفة على $[0; +\infty)$ بالشكل $g(x) = 26 - x$
نرسم (C_f) و (C_g) في نفس المعلم باختيار الوحدات المناسبة باستعمال حاسبة بيانية أو كمبيوتر.

بالنسبة للحاسبة نستعمل المسة **WINDOW** و نضبط النافذة كالتالي:

ثم بواسطة المسة **Y=** نجز الدالتين f و g و نحصل على



وبعد ذلك نطلب الرسم بواسطة

Plot1 Plot2 Plot3
Y1: 153/X
Y2: 26-X

اللمسة نلاحظ أن (C_f) و (C_g) متتقاطعان في نقطتين


بساستعمال **TRACE** نقرأ قيمة مقربة لقيميتي x .

و باستعمال **CALC TRACE** و باستعمال **2nd** نجد قيمتي x :

نجد قيمتي $x = 9$ ، $x = 17$ و أخيراً نتأكد من أن 17 و 9 يحققان المعادلة (ب)

استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال

الهدف: استعمال حاسبة بيانية لتخمين نتيجة



. $AB=AC$ مثلث متقابلين الساقين حيث H هي منتصف $[CB]$ ويعطى $BC=2AH=6$. M هي نقطة متغيرة على $[AH]$ و (Δ) هو المستقيم الذي يشمل M و يوازي (CB) .

. يقطع (Δ) في I و J في $[AC]$. و L نقطتان من (CB) حيث $IJKL$ مستطيل.

1) نضع $AM=x$. ما هو المجال الذي يمسحه x ؟

2) ما هي وضعية M التي تكون من أجلها مساحة $IJKL$ أكبر مما يمكن ؟

• حل

1) دراسة النص و تحليله :

• لنعبر عن مساحة $IJKL$ بدلالة x .

. لدينا $(IJ) \parallel (BC)$ لأن $\frac{AM}{AH} = \frac{IJ}{BC}$ (خاصية طاليس) أي $\frac{x}{3} = \frac{IJ}{6}$.
 مساحة $IJKL$ هي $IJKL = 2x(3-x)$ أي $IJKL = 2x(3-x) = -2x^2 + 6x$.
 نسمي $f(x) = -2x^2 + 6x$ مساحة $IJKL$ إذن

• المواقع الممكنة للنقطة M على القطعة $[AH]$:

نعلم أن M هي نقطة من $[AH]$.

إذا كان $M = H$ أي $x = 0$ تكون مساحة $IJKL$ معدومة . $(f(0) = 0)$


. إذا كان $M = A$ فإن $x = 3$ و $M = A = I = J$ ومنه تكون مساحة $IJKL$ معدومة $(f(3) = 0)$.
 إذن M تتغير على $[AH]$ ولا تنطبق على H ولا على A .
 أي $x \in [0;3]$.

2) وضع مخمنة :

نستعمل على سبيل المثال الحاسبة TI-83 Plus .

• أولاً : تمثيل f بيانيا




• ثانياً : ضبط الرسم

GRAPH  فنشاهد :	WINDOW $X_{\min} = -1$ $X_{\max} = 4$ $X_{\text{sc}} = 1$ $Y_{\min} = -2$ $Y_{\max} = 5$ $Y_{\text{sc}} = 2$ $X_{\text{res}} = 1$	نضغط على WINDOW و نختار مثلاً :
---	---	--

• ثالثاً : تعين قيمة مقربة لأكبر قيمة y_0 للدالة f

• 

نحدد نقطتين على المنحني إحداهما تقع على يسار ذروته فاصلتها x_1 والأخرى تقع على يمين ذروته فاصلتها x_2 حسب التعليمات الآتية:

	1. نحرك الزالق باللمسة  ونتوقف في نقطة من المنحني فاصلتها x_0 أصغر من x_1 ثم نضغط على  فتظهر الحاسبة على الشاشة النافذة المقابلة.
	2. نحرك الزالق باللمسة  ونتوقف في نقطة من المنحني فاصلتها أكبر من x_0 ثم ننقر على  فتظهر الحاسبة على الشاشة النافذة المقابلة. هاتان التعليمتان تسمحان لنا باختيار المجال $[x_1; x_2]$ الذي نبحث فيه على القيمة x_0 التي تمثل سابقة y_0 .
	و أخير نضغط على  لنقرأ قيمة مقربة للعدد x_0 و قيمة مقربة للعدد y_0 .

(3) برهان المخمنة :

$$f(x) = -2(x^2 - 3x) = -2 \left[x^2 - 2 \times \left(\frac{3}{2} \right)x + \left(\frac{3}{2} \right)^2 - \left(\frac{3}{2} \right)^2 \right]$$

$$f(x) = -2 \left(x - \frac{3}{2} \right)^2 + \frac{9}{2} \quad \text{أي } f(x) = -2 \left[\left(x - \frac{3}{2} \right)^2 - \left(\frac{3}{2} \right)^2 \right]$$

إذن أي $x = \frac{3}{2}$. العدد الموجب يكون أكبر ما يمكن إذا كان $f(x) = \frac{9}{2} - 2 \left(x - \frac{3}{2} \right)^2$

تكون مساحة IJKL أكبر ما يمكن من أجل $AM = 1,5$.


خلاصة: • نترجم معطيات المسألة بدلالة f للمتغير x .

• نمثل f بيانياً باستعمال حاسبة بيانية و نخمن وجود قيمة قصوى للدالة f .

• نبرهن وجود قيمة قصوى للدالة f .

حل مسألة إدماجية

تمرين:



[AB] قطعة مستقيمة حيث $AB = 7\text{cm}$ ، M نقطة من [AB].
نرسم مربعين ضلعاهم AM و BM كما في الشكل المقابل.
نضع x ، $A_1(x)$ ، $A_2(x)$ مساحتي المربعين.

1. أ) ما هي القيم الممكنة لـ x ؟

ب) احسب بدلالة x كلا من $A_1(x)$ ، $A_2(x)$.

ح) تحقق من أن $49 - 14x + x^2 = 0$.

2. لنبحث عن قيمة x حيث يكون مجموع المساحتين 37cm^2 .

أ) بيّن أن ذلك يؤول إلى حل المعادلة $x^2 - 7x + 6 = 0$ مع $0 < x < 7$ (م).

ب) باستعمال ورقة ميليمترية وفي نفس المعلم المتعامد ($O; I, J$) حيث الوحدة $0,5\text{cm}$ على محور الفواصل ، $0,1\text{cm}$ على محور الترتيب، أرسم المنحنيين للممتئن f ، g المعرفتين بالشكل:

$$g(x) = 7x - 6 \quad , \quad f(x) = x^2$$

ح) هل يتقاطع المنحنيان؟ في حالة الإيجاب، ما هو عدد نقط التقاطع؟

د) اشرح لماذا تكون فواصل نقط المشتراك حلول المعادلة (م)؟

بقراءة بيانية، عيّن هذه الحلول ثم استخلص.

1. أ) النقطة M تتغير على القطعة [AB] وبالتالي $0 < x < 7$.

ب) لدينا $MB = 7 - x$ ، $AM = x$

$$A_2(x) = (7 - x)^2 \quad , \quad A_1(x) = x^2$$


ح) ننشر عبارة $A_2(x)$ ، نجد: $A_2(x) = 49 - 14x + x^2$

بالجمع، نجد:

$$\begin{aligned} A_1(x) + A_2(x) &= x^2 + 49 - 14x + x^2 \\ &= 2x^2 - 14x + 49 \end{aligned}$$

2. أ) مجموع مجموع المساحتين يساوي 37cm^2 يعني $37 = 2x^2 - 14x + 49$ مع $0 < x < 7$ أي $2x^2 - 14x + 12 = 0$ أي $x^2 - 7x + 6 = 0$.

وبالتالي البحث عن قيمة x حيث يكون مجموع المساحتين 37cm^2 يؤول إلى حل المعادلة $x^2 - 7x + 6 = 0$ مع $0 < x < 7$.



ب) الشكل المقابل يعطي التمثيلين البيانيين (C_f) ، (C_g) للدالتيين f ، g .

ح) نلاحظ أن المنحنيين يتقاطعان في نقطتين.

د) فاصلة كل نقطة مشتركة بين المنحنيين هي حل للمعادلة (م)، لأن إحداثي كل نقطة مشتركة تتحقق معادلة كل من المنحنيين.

$$x = 6 \quad , \quad x_1 = 1$$

التحقيق: $6^2 - 7 \times 6 + 6 = 0$ ، $1^2 - 7 \times 1 + 6 = 0$


تمارين وسائل

ج) ما هي مجموعة سوابق -2؟ ما هي
مجموعة سوابق $5 - 2\sqrt{6}$ ؟

7. (C) هو التمثيل البياني للدالة f المعرفة على $[-50;50]$ بالعبارة: $f(x) = x^2$. أنشئ (C) في معلم متعدد (نمث 10 بـ: 1cm في محور الفواصل و نمثل 500 بـ: 1cm في محور التراتيب).

8. $OI = 2\text{cm}$ معلم متعدد حيث $OJ = 1\text{cm}$ و (C) هو التمثيل البياني للدالة f هي الدالة المعرفة على $I = [-3;3]$ بـ: $f(x) = x^2$. أنشئ (C). هل (C) يقبل مركز تنازلي؟ محور تنازلي؟ ب) نفس السؤال آ) من أجل $I = [-3;1]$.

9. إليك التمثيل البياني لدالة f من الشكل $x \rightarrow ax^2 + b$



استعمل هذا الشكل :

- أ) لتعيين $f(-2)$, $f(0)$, $f(1)$.
- ب) لتشكل جدول تغيرات f .
- ت) لتعيين إشارة و عدد حلول المعادلة $f(x) = 1$.
- ث) لحل المعادلة $f(x) = 5$.

استعمال اتجاه التغير

10. قارن بين :
- أ) $7,002^2$ و $7,003^2$ ؛ ب) $(-1,99)^2$ و $(-2,01)^2$
 - ج) $(-7,463)^2$ و $(-7,4629)^2$ ؛ د) -47^2 و $-43,14^2$.
 - (لأنجز أي حساب باليد أو بالحاسبة)

الدالة "مربع"

أصحيح أم خطأ؟

1. إذا كان $x > 2$ فإن $x^2 > 4$.
- إذا كان $x^2 > 4$ فإن $x > 2$.
- إذا كان $x \leq -2$ فإن $x^2 \leq 4$.
- إذا كان $x \in [-7;-5]$ فإن $x^2 \geq 9$.
- إذا كان $-3 \leq x \leq 3$ فإن $x^2 \leq 9$.
- إذا كان $9 \leq x \leq 25$ فإن $5 \leq x \leq -3$.
- إذا كان $2 \leq x \leq 6$ فإن $4 \leq x^2 \leq 36$.
- إذا كان $x \in [4,9]$ فإن $x \in [-2,3]$.

2. مربع كل عدد حقيقي x يكون أكبر من a^2 أكبر قيمة لدالة مربع على $[a;b]$ هي أو b^2 .

3. أ) الدالة "مربع" متناقصة على $[-3;-1]$.
ب) الدالة "مربع" متزايدة على \mathbb{R} .

4. إذا كان $\alpha^2 < \beta^2$ فإن $\alpha < \beta$.
إذا كان $\alpha < \beta$ فإن $\alpha^2 < \beta^2$.
إذا كان $\alpha^2 > \beta^2$ فإن $\alpha > \beta$.

صور و سوابق

5. اتمم الجدول الآتي:

x	3	-2	$2\sqrt{3}$	$-\frac{1}{5}$	2×10^{-2}	0,3
x^2						
$-x^2$						
$(-x)^2$						


6. f هي الدالة المعرفة على \mathbb{R} بـ:
 $f(x) = x^2$

- أ) عين صور $\sqrt{2} - \sqrt{3}$, $2 - \frac{\sqrt{7}}{2}$, -4 , 2 .
ب) قارن بين صورة $\sqrt{3} - 2$ و صورة $2 - \sqrt{3}$.

19. (C) هو التمثيل البياني لدالة المربع و (E) هو التمثيل البياني للدالة f المعرفة على \mathbb{R} بـ : $f(x) = (x-2)^2 - 1$.
 أ) انشئ (C) .

ب) اشرح كيف يمكن استنتاج (E) إنطلاقاً من (C) . انشئ (E) .

20. J نقطة لا تنتهي إلى المستقيم (Δ) و هي مسقطها العمودي على (Δ) . I هي نقطة من (Δ) حيث $OI = OJ$. نعتبر في المعلم المتعامد و ($O; I, J$) نقطة متغيرة $M(x, y)$.



عين مجموعة النقط M المتتساوية البعد عن J و (Δ) .

الدالة "مقلوب"

أصحيح أم خطأ؟

21. أ₁) مقلوب كل عدد موجب هو عدد سالب
 أ₂) مقلوب عدد حقيقي غير معروف وأصغر من 7 يكون أكبر من 7 .

أ₃) مقلوب $7 - 4\sqrt{3}$ أكبر من $7 - 4\sqrt{3}$.

أ₄) إذا كان $x > 5$ فإن $\frac{1}{x} < \frac{1}{5}$.

أ₅) a و b عدوان غير معروفين .

إذا كان $a < b$ فإن $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$.

أ₆) إذا كان $-5 < x$ فإن $\frac{1}{x} > -\frac{1}{5}$ لأن الدالة مقلوب متناقصة .

أ₇) بما أن الدالة مقلوب متناقصة و

و $-6 > -5$ فإن $-\frac{1}{6} < -\frac{1}{5}$.

أ₈) بما أن الدالة مقلوب متناقصة و

11. قارن بين :
 أ) $(x+2)^2$ و $(x-3)^2$ إذا علمت ان $x \geq 0$.
 ب) $(1-x)^2$ و $(2-x)^2$ إذا علمت ان $x \geq 1$.

التمثيل البياني

12. جد حصراً للعدد الحقيقي x^2 في كل حالة من الحالات الآتية:

أ) $x \in [-3; 0,1]$; ب) $x \in [-4; -2]$;
 $x \in [-0,2; 0,1]$

13. f هي الدالة المعرفة على $[-7; 20]$. عين جدول تغيرات f وثم قيمها الحدية .

14. عين اتجاه تغير كل دالة من الدوال الآتية

أ) الدالة f المعرفة على $[2; 3]$ بالعبارة:

$$f(x) = 4(x-3)^2 + 1$$

ب) الدالة g المعرفة على $[-\infty; -1]$ بالعبارة:

$$g(x) = -2(x+1)^2 + 7$$

ج) الدالة h المعرفة على $[-\infty; -1]$ بالعبارة:

$$h(x) = 3(x+1)^2 - 7$$

القيم الحدية

15. f هي الدالة المعرفة على \mathbb{R} بالعبارة:

$$f(x) = (x-4)^2 + 5$$

بين ان من اجل كل عدد حقيقي x :
 $f(x) - f(4) \geq 0$ و استنتج أكبر قيمة ممكنة للدالة f .

16. f هي الدالة المعرفة على \mathbb{R} بالعبارة:

$$f(x) = 3x^2 - 12x - 11$$

حل $f(x) + 15$. ما هي أكبر قيمة ممكنة للدالة f .

17. استعمل الحاسبة البيانية لتمثل بيانياً الدالة

f المعرفة على \mathbb{R} بـ : $f(x) = x^2 + 2x - 3$.

نريد تعين أكبر قيمة ممكنة للدالة f .

ماذا تلاحظ على شاشة الحاسبة؟ برهن .

18. ادرس تغيرات الدالة f المعرفة على \mathbb{R}

$$f(x) = -\sqrt{2}(x - \sqrt{2})^2 - 2$$

.27) معلم متعمد .

(أ) نفرض $OI = OJ = 1\text{cm}$. أنشئ المنحني البياني (C) لدالة المقلوب من أجل

$$\cdot x \in \left[-3; -\frac{1}{2} \right] \cup \left[\frac{1}{2}; 3 \right]$$

هل (C) يقبل مركز تناظر؟ محور تناظر؟

(ب) نفس الأسئلة عندما نفرض $OI = 1\text{cm}$ و $OJ = 4\text{cm}$

.28) f هي الدالة المعرفة على

$$\cdot f(x) = \frac{2}{x} \quad]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$$

(أ) ادرس تغيرات f و شكل جدول تغيراتها.

(ب) مثل ببيانيا f على المجال [-3; 3] في معلم متعمد و متجانس.

.29) f هي الدالة المعرفة على


$$\cdot f(x) = \frac{-3}{x} \quad]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$$

(أ) ادرس تغيرات f و شكل جدول تغيراتها.

(ب) مثل ببيانيا f على المجال [-4; 4] في معلم متعمد و متجانس.

.30) استعمل الحاسبة البيانية لإنجاز مثيلاً

للشكل:



.31) f هي الدالة المعرفة على

$$\cdot f(x) = \frac{3}{x+2} \quad]-\infty; -2[\cup]2; +\infty[$$

(أ) ادرس تغيرات الدالة f و شكل جدول تغيراتها.

(ب) مثل ببيانيا f في معلم متعمد.

.32) f هي الدالة المعرفة على

$$\cdot f(x) = \frac{2x+1}{x+1} \quad]-\infty; -1[\cup]-1; +\infty[$$

و $6 > 5$ فإن $\frac{1}{5} < \frac{1}{6}$.

أ9) بما أن الدالة مقلوب متناقصة و $-6 > 5$

فإن $\frac{1}{5} < -\frac{1}{6}$.

• $x \geq \frac{11}{2}$ يكافيء $\frac{1}{x} \leq \frac{2}{11}$ (10)

.22) أ) إذا كان $\frac{1}{x} \in \left[-\frac{4}{3}; 0 \right]$ فإن $x \in \left[-\frac{3}{4}; 0 \right]$

ب) إذا كان $\frac{1}{x} \in [0; 8]$ فإن $x \in \left[\frac{1}{8}; +\infty \right]$

صور و سوابق

.23) f هي الدالة مقلوب.

(أ) أحسب صور الأعداد: $-1, -\frac{1}{3}, 10^{-2}$,

$$-3, 3, -\frac{7}{5}, \frac{7}{5}, 10^2$$

(ب) أحسب سوابق الأعداد: $-3, 5, 10^4$,

$$-\frac{6}{5}, \frac{5}{6}, 10^{-4}$$

.24) هل يمكن أن يشكل جدول القيم الآتي الدالة مقلوب؟

x	0,4	10^{-1}	$\sqrt{2}-1$	1	$\frac{2}{\sqrt{2}}$
$f(x)$	2,5	0,1	$\sqrt{2}+1$	1	$\frac{1}{\sqrt{2}}$

التمثيل البياني

.25) مثل ببيانيا الدالة مقلوب على المجال $[0; 50]$

في معلم متعمد حيث: 10 تمثل 1cm على محور الفواصل و 1 يمثل 10cm على محور التراتيب.

.26) مثل ببيانيا الدالة مقلوب من أجل x يتغير بين -1 و 1 ويختلف عن 0.

نأخذ $0,1\text{cm}$ لتمثيل 1 على محور الفواصل و 1cm لتمثيل 5 على محور التراتيب.

. 37. f هي دالة .

$$(a) \text{ أحسب صور الأعداد: } 10^{-6}, (-a-b)^2, 6000^2 + 8000^2.$$

$$(b) \text{ أحسب سوابق الأعداد: } 7, 10^{-6}, 10^3, 7 - \sqrt{37}, (-1)^2.$$

التمثيل البياني

38. مثل بيانيا على المجال $[0;50]$ دالة "الجذر التربيعي" في معلم متعمد حيث: تمثل $2cm$ على محور الفواصل و $10cm$ على محور التراتيب.

39. f هي الدالة المعرفة على $[0;+\infty)$ بـ:

$$f(x) = \sqrt{2x}$$

- (a) ادرس تغيرات f و شكل جدول تغيراتها.
 (b) مثل بيانيا f على المجال $[0;8]$ في معلم متعمد و متجانس.

40. f هي الدالة المعرفة على $[-\infty;0]$ بـ:

$$f(x) = \sqrt{-2x}$$

- (a) ادرس تغيرات f و شكل جدول تغيراتها.
 (b) مثل بيانيا f على المجال $[-8;0]$ في معلم متعمد و متجانس.

41. (C) هو التمثيل البياني للدالة f المعرفة

$$f(x) = 1 + \sqrt{x+2} \quad \text{على } [-2;+\infty).$$

و (H) هو التمثيل البياني لدالة الجذر التربيعي.

(a) ادرس تغيرات الدالة f و شكل جدول تغيراتها

- (b) بين أنه يمكن استنتاج (C) انطلاقاً من (H) بانسحاب يطلب تعين شعاعه. أنشئ (C) .

42. (أ) مثل بيانيا على المجال $[0;+\infty)$

$$\text{الدالتين: } x \rightarrow x \text{ و } x \rightarrow \sqrt{x}$$

- (ب) حمن ترتيب x و \sqrt{x} باستعمال السؤال الأول ثم برهن النتائج المحصل عليها.

(أ) برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي x حيث

$$x \neq -1 : f(x) = 2 - \frac{1}{x+1}$$

(ب) ادرس تغيرات f و شكل جدول تغيراتها.

33. (C) هو التمثيل البياني للدالة f المعرفة على $[-\infty;-1] \cup [1;+\infty)$ بـ:

$$f(x) = \frac{3x+4}{x+1} \quad (H) \text{ هو القطع الزائد الذي يمثل دالة المقلوب.}$$

(أ) برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي x حيث $x \neq -1$ لدينا:

$$f(x) = 3 + \frac{1}{x+1}$$

(ب) بين أنه يمكن استنتاج (C) انطلاقاً (H) بانسحاب يطلب تعين شعاعه.

دالة "الجذر التربيعي"

صحيح أو خطأ؟

34. (أ) إذا كان x عدداً حقيقياً حيث $4 < x < 2$ فإن $\sqrt{x} < 4$.

(ب) إذا كان $0 \leq x \leq 1$ فإن $0 \leq \sqrt{x} \leq 1$.

(ج) من أجل كل عدد حقيقي موجب x لدينا $x \geq \sqrt{x}$.

(د) إذا كان $x^2 \leq 25$ فإن $x \leq 5$.

(هـ) إذا كان $x \in \left[\frac{1}{2};2\right]$ فإن $x \in \left[\frac{1}{4};4\right]$

35. (أ) x عدد سالب. العبارة $\sqrt{-x}$ ليس لها معنى.

(ب) من أجل كل عدد حقيقي لدينا $x\sqrt{3} = \sqrt{3x^2}$.

صور و سوابق

36. اتمم الجدول الآتي:

x	1	$(-5)^2$	$\sqrt{\frac{3}{4}}$	$(1-\sqrt{2})^2$
\sqrt{x}				

أصحىح أم خطأ؟

43. لا يوجد أي عدد حقيقي x حيث

$$\cos x = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

44. إذا كان $a < b$ فإن $\cos a < \cos b$ و $\sin a < \sin b$

$$\sin \frac{\pi}{7} > \sin \frac{\pi}{5} \text{ و } \cos \frac{\pi}{7} > \cos \frac{\pi}{5}. 45$$

46. a و b عناصران من المجال $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

$$\cos \frac{1}{a} < \cos \frac{1}{b} \text{ فإن } a < b \text{ (إذا كان)}$$

$$\sin \frac{1}{a} > \sin \frac{1}{b} \text{ فإن } a < b \text{ (إذا كان)}$$

47. بما أن A و B نقطتان من دائرة

مركزها O و نصف قطرها 1cm فإن قطعة $\widehat{AOB} = 10^\circ$ هو

الزوايا والأقواس

48. قوس من دائرة مركزها O و نصف قطرها 5cm . عين AOB بالرديان ثم الدرجة إذا علمت أن طول القوس AB هو $2,5\text{cm}$

49. تعطى دائرة نصف قطرها 10cm . احسب أطوال الأقواس التي تحصراها الزوايا

المركزية التي أقياسها :

$$120^\circ, 75^\circ, 90^\circ, \frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\text{ rad}, \frac{\pi}{3}\text{ rad}$$

50. آ) حول إلى الرadian : $10^\circ, 35^\circ, 150^\circ$

ب) حول إلى الدرجة : $\frac{\pi}{5}\text{ rad}, \frac{3\pi}{8}\text{ rad}$

51. ضع على الدائرة المثلثية النقط التي صورها

$$\begin{aligned} & \frac{-7\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{133\pi}{3}, \frac{11\pi}{3}, \frac{15\pi}{4}, \frac{7\pi}{6}, \frac{\pi}{6} \\ & -\frac{23687\pi}{6}, -\frac{16\pi}{3}, -\frac{13\pi}{4} \end{aligned}$$

صور و سوابق
52. احسب القيم المضبوطة لجيب تمام و جيب الأعداد الآتية :

$$\begin{aligned} & \frac{4\pi}{3}, \frac{-7\pi}{6}, \frac{-5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{-\pi}{6}, \frac{\pi}{6} \\ & -789\pi, -128\pi, 213\pi, 120\pi \\ & -\frac{115\pi}{4}, \frac{115\pi}{4}, -\frac{193\pi}{3}, \frac{193\pi}{3} \end{aligned}$$

53. عين في كل حالة من الحالات الآتية العدد x من المجال $[0; \pi]$:

$$\begin{aligned} & \cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \sin x = \frac{1}{2}, \cos x = 0 \\ & \cos x = \frac{1}{\sqrt{2}}, \sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ & \text{(لا تستعمل الحاسبة)} \end{aligned}$$

54. عين في كل حالة من الحالات الآتية العدد x من المجال $\left[\frac{-\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$:

$$\begin{aligned} & \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \cos x = \frac{1}{2}, \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ & \text{(لا تستعمل الحاسبة)} \end{aligned}$$

55. x عنصر من $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ حيث

$$\cos x \cdot \sin x = \frac{2}{3} \text{ احسب}$$

56. x عنصر من $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ حيث

$$\cos x \cdot \sin x = -\frac{3}{5} \text{ احسب}$$

57. x عنصر من $[-\pi, 0]$ حيث

$$\cos x \cdot \sin x = -\frac{1}{3} \text{ احسب}$$

58. آ) عين الأعداد الحقيقية x من المجال

$$\cos x \geq 0 \text{ حيث } \left[-\frac{\pi}{2}; 2\pi\right]$$





ب) عين الأعداد الحقيقية من المجال

$$\sin x \leq \frac{1}{2} \text{ حيث } [-2\pi; 3\pi]$$

63. المطلوب في هذا التمرين هو إرفاق كل دالة من الدوال الآتية بتمثيلها البياني.

$$g : x \rightarrow \frac{-3}{x}, f : x \rightarrow x^2 + 2x + 2$$

$$k : x \rightarrow |x|, h : x \rightarrow -\sqrt{-x+2}$$



64. f هي الدالة المعرفة على R كالتالي:

$$x \leq 0 \quad f(x) = x^2$$

$$0 < x \leq 1 \quad f(x) = \sqrt{x}$$

$$x > 1 \quad f(x) = \frac{1}{x}$$

(آ) مثل بياني الدالة f .

(ب) حل بيانيا ثم جبريا المترادفة $f'(x) \leq \frac{1}{4}$


65. بين ان من أجل كل عدد حقيقي x :

$$(\sin x + \cos x)^2 = 1 + 2 \sin x \cos x$$

$$\cdot (1 + \sin x + \cos x)^2 = 2(1 + \cos x)(1 + \sin x)$$

66. نقطة متغيرة على نصف دائرة M

مرکزها O وقطرها $[AB]$ حيث $AB = 4$ نسمى H المسقط العمودي للنقطة M على $AH = y$ و $AM = x$. نضع $[AB] = z$



اتجاه التغير - التمثيل البياني

57. آ) ادرس تغيرات الدالة "جيب تمام" على المجال $[0;2\pi]$ ثم مثّلها بيانيا لاستنتاج حلول كل معادلة من المعادلات الآتية :

$$\cos x = -1, \cos x = 1, \cos x = 0$$

استنتج كذلك عدد حلول المعادلة

$$\cos x = -\frac{5}{7}$$

ب) نفس الأسئلة بالنسبة للدالة \sin .

58. ادرس تغيرات الدالة "جيب" على المجال $[\pi;3\pi]$ و مثّلها بيانيا.

59. انشئ البيان (C_f) للدالة "جيب" على المجال $[0;\pi]$. اشرح كيف نستنتج بيان هذه الدالة على المجال $[0;2\pi]$.

مسائل

60. آ) مثل بيانيا الدالتين:

$$x \rightarrow x^2 - 3x + 2 \quad x \rightarrow -x + 2$$

باستعمال الحاسبة البيانية أو الكمبيوتر .

ب) إقرأ على الشكل المنجز، مجموعة حلول المعادلة $f(x) = g(x)$ و مجموعة حلول المترادفة $f'(x) < g'(x)$ ثم تأكّد بالحساب.

61. مثل بيانيا الدالتين :

$$x \rightarrow -x + 3 \quad x \rightarrow \sqrt{x+2}$$

باستعمال الحاسبة البيانية أو الكمبيوتر ثم استنتاج

حصراً حل المعادلة $\sqrt{x+2} = -x + 3$.


62. آ) ادرس تغيرات الدالة f المعرفة

$$f(x) = 1 + \frac{3}{x} \quad x \in [0;+\infty[\cup]-\infty;0[$$

ب) قارن بين العددين:

$$x = \frac{3,9919919919}{0,9919919919} \quad \frac{9199199199}{9199199199} \quad \frac{1997}{1997}$$

$$y = \frac{3,9919919919}{0,9919919919} \quad \frac{9199199199}{9199199199} \quad \frac{1993}{1993}$$



- (1) إلى أي مجال ينتمي x ?
 (2) احسب مساحة المربع $MNPQ$ من أجل $x = 1$.

- (3) بين أن مساحة المربع $MNPQ$ هي $f(x) = 2x^2 - 8x + 16$
 (4) تأكيد أن $f(x) = 2[(x-2)^2 + 4]$. ما هي أصغر قيمة ممكنة للعدد $f(x)$. علل.
 (5) استعمل حاسبة بيانية لإنشاء بيان الدالة f المعرفة على $[0;4]$ بالشكل $f(x) = 2x^2 - 8x + 16$ وعين قيمة مقربة للعدد x الذي من أجله تكون مساحة المربع $MNPQ = 12cm^2$.
 بـ(شكل جدول تغيرات الدالة f).

68. آ) بين أن من أجل كل عدد حقيقي موجب

$$\text{تماما لدينا } 2 + \frac{1}{x} \geq 0.$$

- بـ(أنشئ في نفس المعلم المتعامد و المتجانس بيان الدالة f المعرفة على $[0;+\infty]$ بالشكل $f(x) = \frac{1}{x}$) و بيان الدالة $g(x) = x$ المعرفة على $[0;+\infty]$ بالشكل $g(x) = x$ ثم انتتج إنشاء البيان (C_h) للدالة الدالة h المعرفة على $[0;+\infty]$ بالشكل $h(x) = f(x) + g(x)$.
 (يتم إنشاء (C_h) نقطة ب نقطة انطلاقا من البيانات السابقتين).
 جـ) من بين المستطيلات التي مساحتها $1m^2$ ما هو الذي يقبل أصغر مساحة.

- 1) بين أن x ينتمي إلى المجال $[0;4]$.
 2) آ) احسب MH^2 بطريقتين مختلفتين (باعتبار المثلث AMH ثم باعتبار المثلث OMH).
 نميز حالتين: H بين A و O ؛ H بين B و O .

- بـ(استنتج أن $y = \frac{1}{4}x^2$).

3) f هي الدالة المعرفة على $[0;4]$ بالشكل:

$$f(x) = \frac{1}{4}x^2$$

- آ) ادرس تغيرات f على $[0;4]$.

- بـ(اتم الجدول الآتي):

x	0	1	2	3	4
$f(x)$					

جـ) مثل بيانيا f في معلم متعامد و متجانس.

- 4) g هي الدالة المعرفة على $[0;4]$ بالشكل $g(x) = x$.

آ) مثل بيانيا g في المعلم السابق.

- بـ(استنتاج من البان السبق انه من أجل كل عدد حقيقي من $[0;4]$ لدينا $g(x) \geq f(x)$).

- 5) آ) استعمل السؤال 4) كي تبين انه توجد قيمة x_0 للعدد x تجعل $AM - AH$ أكبر ما يمكن. جـ) قيمة مقربة للعدد x_0 .

$$\text{بـ(تأكد أن } AM - AH = x - \frac{1}{4}x^2 \text{)}.$$

بين ان الدالة $h: x \rightarrow x - \frac{1}{4}x^2$ المعرفة على

- [0;4] متزايدة تماما على $[0;2]$ و متناقصة على $[2;4]$. استنتاج ان $AM - AH$ أكبر ما يمكن من أجل $x = 2$.
 حدد وضعية M .

67. $ABCD$ مربع طول ضلعه $4cm$. النقط

- Q, P, N, M تتنميء على الترتيب، إلى $[DA], [CD], [BC], [AB]$ حيث $AM = BN = CP = DQ = x$

المعادلات والمتراجحات

الكافئات المسندفة

- التعرف على مختلف الصيغ لنفس العبارة الجبرية (صيغة مختصرة، صيغة محللة،).
- تحويل كتابة عبارة (نشرها، تحليلها، اختصارها) و اختيار الصيغة المناسبة تبعاً للهدف المنشود.
- كتابة العبارة $ax^2 + bx + c$ على الشكل النموذجي ($a \neq 0$).
- تحليل العبارة $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$).
- استعمال الممّيز لحلّ المعادلة: $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$.
- توظيف المعادلات والمتراجحات من الدرجة الأولى و المعادلات من الدرجة الثانية لحلّ مشكلات.
- استعمال جدول الإشارات لحلّ متراجحة.
- حلّ، جبرياً، معادلات ومتراجحات من الشكل:

$$f(x) < k , f(x) < g(x) , f(x) = k , f(x) = g(x)$$



قبل ظهور الحساب الحرفي، استعملت عدة إجراءات تجريبية وهندسية لحل مشاكل من الحياة تسد الاحتياجات العملية للناس تتعلق بالميراث وتقسيم الممتلكات والتجارة ومسح الأراضي. فكان هذا الأمر يحتاج إلى تبسيط التعامل معه وهو ما شجع الخوارزمي (أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي) (780-850 م) على البحث ومن ثم تأليف كتاب يعالج فيه حل المعادلات في الجبر هو كتاب "المختصر في الجبر والمقابلة" وجاء في مقدمته: "...على أني أفت من كتاب الجبر والمقابلة كتاباً مختصراً، حاصراً للطيف الحسابي وجليلاً، لما يلزم الناس من الحاجة إليه في مواريثهم ووصاياتهم وفي مقاساتهم وأحكامهم وتجارتهم وفي جميع ما يتعاملون به من مساحة الأرضي وكري الأنهر والهندسة ...". ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية تحت عدة عنوانين.

صنف الخوارزمي في الكتابه هذا المعادلات إلى ستة أصناف هي بالترميز الحديث هذه: $ax = b$ ؛ $ax^2 = b$ ؛ $ax^2 = bx$ ؛ $ax^2 + c = bx$ ؛ $ax^2 + bx = c$

واستعمل أدوات ووسائل خاصة لحلها، فسمى المجهول جذراً

ومربعه مالاً واعتبر في كل الحالات a ؛ b ؛ c أعداداً موجبة وعند الحل يرد الأموال إلى مال واحد واستعمل إجراءين اشتهر بهما هما الجبر (النحو) والمقابلة (النقيب) فكان بذلك أول من أدخل ما يسمى حديثاً بالخوارزميات الحسابية أي طرق وقواعد حسابية تتم عبر مراحل متدرجة وفق نظام معلوم تتكرر عده مرات إلى أن يتحقق الهدف المطلوب. وقد أشار الدكتور الباحث في تاريخ الرياضيات، أحمد جبار في محاضرة له بمناسبة المؤتمر الثاني عشر لمعاهد البحث في تعليم الرياضيات بفرنسا المنعقد أيام 15-16 ماي 1998 حول الفكر الجبري إلى هذا الكتاب حيث أكد على أنه من المتفق عليه لدى جميع المؤرخين في الرياضيات أن الميلاد الرسمي للجبر كفرع في الرياضيات هو نشر كتاب محمد ابن موسى الخوارزمي المعروف "المختصر في الجبر والمقابلة"

أنشطة

نشاط 1: الأشكال المختلفة لعبارة جبرية

1. أ) أنقل ثم أكمل الجدول كما في السطر الأول.

العبارة الجبرية	النص
$ab + cd$	مجموع جداءين
	جداء مجموع وفرق
$\frac{ab}{c+d}$	حاصل قسمة مجموع على فرق
$\frac{I}{a+b}$	فرق مربعين
	فرق حاصل قسمة
$(a+b)^2$	

ب) ما هي الشروط التي يجب أن تتحققها الأعداد الحقيقية a, b, c, d حتى يكون للعبارات الواردة في العمود الثاني من الجدول أعلاه معنى؟

2. عين، من بين العبارات الآتية، المجاميع والجداءات وحاصلات القسمة.

$$\frac{2x^2 - x + 3}{x - 1} \quad (د)$$

$$2 - x(x+1) \quad (أ)$$

$$\frac{5x - 2}{3} - \frac{1}{2} \quad (ه)$$

$$3(2x-1)^2 \quad (ب)$$

$$(1-x)\sqrt{x} \quad (و)$$


$$\frac{I}{x-3}(x+1)-2 \quad (ح)$$

3. أكتب عبارة مجموع الحدود $-5x^2, 2x, -1, x$ في جداء العاملين $x-3$.

نشاط 2: المتطابقات الشهيرة

1. تحقق باستعمال الأشكال الهندسية الآتية من صحة المتطابقات الشهيره:

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2 \quad , \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad , \quad (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$



2. أ) ما هي قيمة العدد $? 85\ 987\ 586\ 750^2 - 85\ 987\ 586\ 749 \times 85\ 987\ 586\ 751$

ب) احسب، دون استعمال حاسبة، المربعين 399^2 ، 401^2 .

نشاط 3: المعادلات عند الخوارزمي

من المشكلات التي طرحتها الخوارزمي في "كتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة"، ذكر:


فاما الأموال والعدد التي تعدل الجذور، فمثل قولك مال وواحد وعشرون من العدد يعدل عشرة، فباه أن نصف الأجذار فتكون خمسة، فتضطربها في مثلها تكون خمسة وعشرين، فتنقص منها الواحد والعشرين التي ذكرناها مع المال، فيبقى أربعة، فخذ جذرها وهو اثنان، فأنقصها من نصف الأجذار وهو خمسة، فيبقى ثلاثة وهو جذر المال الذي تريده والمال تسعة. وإن شئت فردد الجذر على نصف الأجذار فيكون سبعه وهو جذر المال الذي تريده والمال تسعة وأربعون.

وهو ما يمكن ترجمته بالشكل: "المربع و واحد وعشرون يساوي عشرة جذوره" ، بمعنى:
أوجد x حيث $x^2 + 21 = 10x$.

في النص المقتبس، يعني بالمال x^2 وبجذر المال x ويدرك في نصوص أخرى الدرهم يعني بها الأعداد.

المعادلة السابقة من الشكل: $ax^2 + c = bx$ ويوافق الصنف الخامس لتصنيف الخوارزمي.

ولحلها استعمل إجراء يرتكز على سند هندسي ويصفه كالتالي:
نرسم قطعة مستقيم $[AG]$ طولها x ونكمّل المربع $ABDG$ وتكون مساحته x^2 . نمد $[AG]$ إلى النقطة C حيث $GC = 10$ ، ونرسم مستطيلاً عرضه x وطوله GC نسميه $GCND$ ، تكون مساحته $10x$ (ونحصل بذلك على الطرف الثاني للمعادلة).



• تحقق من أن مساحة المستطيل $ACNB$ هي 21.

نضع H منتصف $[GC]$ ($HC = GH = 5$) $[GC]$
نرسم قطعة مستقيم $[HT]$ مثل $[HT]$ $[HT] \parallel [GD]$
 $(HT = x)$ ، إذن $(GD = HT) \parallel (GD)$
بعد ذلك نعيّن على (TH) النقطة K حيث $K = GH$ ، إذن $TK = 5$
 $\therefore TK = \frac{10}{2} = 5$

نكمّل المربع $TKMN$ ، وتكون مساحته $5 \times 5 = 25$ ، ونعيّن على $[KM]$ النقطة L حيث $KL = HK$ ، إذن $LK = KH = 5 - x$.
 $ML = HT$. ينتج $(KL = 5 - x)$.
نكمّل المربع $KLZH$.

• قارن بين مساحتي المستطيلين $MLZC$ و $TBAH$.

نجد مما سبق أن مساحة $KLZH$ تساوي 4 .
وعلماً أن $x = 3$ ، $GH = 5 = x + 2$.
وإذا زدنا 2 على GH وهو نصف الأجذار بلغ سبعة $(5 + 2 = 7)$.

1. ترجم النص الآتي بالتعبير الرياضي المتداول:

"مال وعشرة أجذاره يعدل تسعة وثلاثين درهما".

2. حلّ، باستعمال طريقة الخوارزمي المعروضة أعلاه، المعادلة: $x^2 + 40 = 14x$


نشاط 4: هرم خوف

يعد هرم خوف من العجائب السبعة. بُني هذا الهرم المنتظم الذي قاعدته مربع في حوالي 2600 ق.م.

يقول المؤرخ الإغريقي هيرودوت واصفاً هذا الهرم ما يلي :

"يتميز الهرم الكبير بالبعدين المختارين لضلع قاعدته وارتفاعه بحيث تعادل مساحة المربع الذي طول ضلعه يساوي ارتفاع الهرم مساحة كل وجه من الأوجه المثلثية الجانبية".

ويعني ذلك، في الشكل أدناه، أن مساحة المثلث المتقابضين الضلعين SCD تساوي مساحة المربع الذي ضلعه $[OS]$.



نضع I منتصف $[CD]$ ، $CI = a$ ، $SI = h$ ، $OI = a$ ثم مساحة المثلث SCD .

1. احسب SI ، OI ثم مساحة المثلث $.SCD$.

2. بفرض صحة فرضية هيرودوت، أوجد العلاقة بين a و h .

3. نضع $\phi^2 - \phi - 1 = 0$. بذن أن $\phi = \frac{SI}{OI}$

4. تحقق أن $\left(\phi - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{4} = \phi^2 - \phi - 1$ ثم احسب قيمة ϕ .

نسمّي الشكل النموذجي للعبارة $\left(\phi - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{4} = \phi^2 - \phi - 1$.

5. أصلاً وحسب المختصين، أبعاد هرم خوف هي كالتالي:

ضلع القاعدة المربعة: 440 ذراعاً ملكياً، الارتفاع: 280 ذراعاً ملكياً.

(يُقدر الذراع الملكي المستعمل في مصر القديمة بحوالي 0,52 m).

هل الفرضية السابقة محققة؟

الدرس

1. العبارات الجبرية

• المعاني المختلفة للحرف في عبارة جبرية

دور الحرف x	أمثلة
x متغير	$x \mapsto f(x)$ سعر التنقل بسيارة بدلالة المسافة المقطوعة
x مجهول	$x^2 = 4$ حيث \mathbb{R} أوجد x في
x مقدار غير معين	$E(x) = 2x^2 - 3x + 5$ عبارة حيث

• الأشكال المختلفة لعبارة جبرية

عبارات جبرية A, B, C .

التسمية	الشكل	مثال	ملاحظات
مجموع	$A + B$	$2x^2 + 3x - 1$ مجموع حدوده هي: $2x^2, 3x, -1$	العبارة تتضمن عمليات جمع أو طرح. يتشكل المجموع من عدة حدود.
جداء	$A \times B$	$x(x-2)$ جداء عاملان، $x, (x-2)$	العبارة لا تتضمن عمليات جمع أو طرح. يتشكل الجداء من عدة عوامل.
حاصل قسمة	$\frac{A}{B}$	$\frac{x+2}{2x-1}$ حاصل قسمة بسطه $x+2$ ومقame $(2x-1)$ مقامه $(x+2)$	يتتشكل حاصل قسمة من بسط ومقام.

• القيمة العددية لعبارة جبرية

تعريف

القيمة العددية لعبارة جبرية هي العدد الذي نتحصل عليه، في حالة وجوده، عندما نوّض الحروف بأعداد.

أمثلة

- القيمة العددية للعبارة $I = x^2 + 3x - 1$ من أجل $x = -1$ هي $-1 - 3 + 3(-1) = -3$ أي -3 .
- القيمة العددية للعبارة $A = 2x - y$ من أجل $x = 0$ و $y = 1$ هي $0 - 1 = -1$ أي -1 .

ملاحظة

يمكن ألا يكون لعبارة جبرية قيم عدديّة، من أجل بعض قيم الحروف.


مثال: العبارة $B = \frac{\sqrt{x}}{x-2}$ لا يكون لها معنى إلا من أجل $x \geq 0$ و $x \neq 2$ ، لأنّ ليست لها قيمة عدديّة من أجل كلّ القيم الممنوعة للحرف x .

2. قواعد الحساب الجبري

• معانٍ للأقواس

الأقواس ليس لها نفس الدور.

دور الأقواس	طبيعة الأقواس	
($A(x)$ يعني أنّ A يتعلّق بالمتغير x ، لا يمكن حذف مثل هذه الأقواس.)	أقواس دالة	① أقواس غير مرتبطة بالحساب
($2x(x-3)$ يعني جداء $(x-3)$ في $2x$. للتخلص من القوسين، نوزّع $2x$ على حدّي المجموع.)	أقواس متعلقة بجاء	② أقواس مرتبطة بالحساب
($-2x(3x^2)$ يعني جداء $(-2x)$ في $3x^2$. تعني تجميع حدود مجموع. يكون الاستغناء حسب القاعدة الآتية: $A + (B + C - D) = A + B + C - D$ $A - (B + C - D) = A - B - C + D$)	أقواس متعلقة بمجموع	③



مثال

$$E(x) = -3x(-1 \times 4x) - (x-2) + 2(x-1)$$

① ② ③ ②

• المتطابقات الشهيرة

مبرهنة 1

عباراتان جبريتان.

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

$$(A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$$

$$(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$$

أمثلة

$$(2x + 1)^2 = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 1 + 1^2 = 4x^2 + 4x + 1$$

$$(x - 3)^2 = x^2 - 2 \times x \times 3 + 3^2 = x^2 - 6x + 9$$

$$(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1) = (\sqrt{3})^2 - 1 = 3 - 1 = 2$$

3. تحويل عبارة جبرية

يمكن تحويل عبارة جبرية مكتوبة بصيغة معينة إلى صيغة أخرى باعتماد النشر والتبسيط أو التحليل.

• التحليل	• تبسيط عبارة	• النشر
تحليل عبارة يعني كتابتها على شكل جداء. $A = (x-1)(-2x+1)-(2x-1)^2$ مثال: $(x-1)(-2x+1)-(2x-1)^2$ نكتب: $A = -(x-1)(2x-1)-(2x-1)^2$ $A = (2x-1) [- (x-1) - (2x-1)]$ $A = (2x-1)(-x+1-2x+1)$ $A = (2x-1)(-3x+2)$ نسمي الصيغة الأخيرة للعبارة الصيغة المحللة للعبارة A .	تبسيط عبارة يعني كتابتها بأقل عدد ممكن من الحدود. $A = (x-1)(-2x+1)-(2x-1)^2$ مثال: $(x-1)(-2x+1)-(2x-1)^2$ النشر: $A = -2x^2 + x + 2x - 1 - 4x^2 + 4x - 1$ التبسيط: $A = -2x^2 - 4x^2 + x + 2x + 4x - 1 - 1$ $A = (-2-4)x^2 + (1+2+4)x - 1 - 1$ $A = -6x^2 + 7x - 2$ نسمي الصيغة الأخيرة للعبارة الشكل البسيط والمرتب للعبارة A	نشر جداء يعني كتابته على شكل مجموع. مثال: $A = (x-1)(-2x+1)-(2x-1)^2$ النشر: $A = -2x^2 + x + 2x - 1 - (4x^2 - 4x + 1)$ $A = -2x^2 + x + 2x - 1 - 4x^2 + 4x - 1$ نسمي الصيغة الأخيرة للعبارة منشور العبارة A .

النشر

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$

التحليل


ملاحظة

في المتطابقات الشهير، يظهر كل من النشر والتحليل كما في المخطط.

4. الدوال والعبارات الجبرية (ترابط الدوال المؤدية من x إلى $f(x)$)

• مثال:

$f: x \mapsto (2x-1)^2$
 f هي الدالة المعرفة على R بالشكل $(2x-1)^2$.
 للحصول على $f(x)$ ، نضرب x في 2 ونطرح 1 ثم نربع النتيجة.



ننتقل من x إلى $f(x)$ بتطبيق دالتين مرجعيتين على التوالي: الدالة التألفية u ثم الدالة مربع v

5. المساويات والمعادلات

• المساويات

أمثلة	خواص
<p>المتطابقات الشهيرة هي مساويات:</p> $(2+3)^2 = 2^2 + 2 \times 2 \times 3 + 3^2 = 25$ $(2-3)^2 = 2^2 - 2 \times 2 \times 3 + 3^2 = 1$ $(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1) = (\sqrt{2})^2 - 1^2 = 2-1=1$	<ul style="list-style-type: none"> تكون المساواة صحيحة دائماً من أجل كلّ القيم المعطاة للحروف.
<ul style="list-style-type: none"> a, b عدوان حقيقيان، $(a+b)^2 - 3ab = a^2 - ab + b^2$ من أجل الدالة f التي ترافق بكلّ عدد حقيقي x مربعه، نكتب: $x \mapsto f(x)=x^2$ <p>عبارة جبرية حيث: E</p> $E = \frac{x}{x^2 - 1}$	<ul style="list-style-type: none"> نكتب مساواة عند: <ul style="list-style-type: none"> - إجراء حساب جبري. - تعريف دالة أو عبارة.
<p>إذا كان $A=B$ ،فيمكن استبدال العبارة A بالعبارة B.</p>	<ul style="list-style-type: none"> تسمح المساواة باستعمال مبدأ التعويض في برهان.

• المعادلات

أمثلة	خواص
<p>هل يوجد عدد حقيقي x حيث $2(x+1)=3x-5$ ؟</p> <p>x هو المجهول.</p>	<ul style="list-style-type: none"> أمام معادلة يُطرح تساؤل: هل يوجد عدد (أو أعداد) x من D تحقق المساواة ... ؟ تسمى D المجموعة المرجعية للمعادلة. عندما نعوض x في معادلة بقيمة معينة من D ونجد المساواة الناتجة محققة، نقول إنّ هذه المعادلة محققة من أجل تلك القيمة. نسمى مثل هذه القيمة حلّ للمعادلة.
<p>7 حلّ للمعادلة $2(x+1)=3x-5$ لأنّه ، عند تعويض x بالعدد 7 ، تتحقق المساواة: $2(7+1)=3 \times 7 - 5$</p>	<ul style="list-style-type: none"> حلّ معادلة ذات المتغير x يعني تعين كلّ قيم x من D التي تتحققها.
<p>المعادلة $2x-3=8$ تكافئ $2x-3+3=8+3$ أي $2x=11$</p> <p>وتكافئ $x = \frac{11}{2}$ أي $2x \times \frac{1}{2} = 11 \times \frac{1}{2}$</p> <p>حلّ المعادلة $2x-3=8$ هو العدد $x = \frac{11}{2}$</p>	<ul style="list-style-type: none"> نقول عن معادلتين إنهما متكافئتان عندما يكون لهما نفس مجموعة الحلول. إذا أضفنا نفس العدد إلى طرفي معادلة نحصل على معادلة مكافئة لها. إذا ضربنا في نفس العدد غير المعدوم طرفي معادلة نحصل على معادلة مكافئة لها.

• معادلات يُؤول حلها إلى حلّ معادلات من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد

▪ "معادلة جداء"

مبرهنة 2

يكون جداء عدّة عوامل معروفاً إذا وفقط إذا كان أحد العوامل على الأقل معروفاً.
 $B(x)=0$ $A(x)=0$ تكافئ $A(x) \times B(x) = 0$

ملاحظة

مثل المعادلة $A(x) \times B(x) = 0$ ، تسمى "معادلة جداء".

مثال: حلّ في R المعادلة:

$$(I) \quad (2x-1)^2 + x(1-2x) = 4x^2 - 1$$

بعد تحليل $4x^2 - 1$ في المعادلة (I)، نلاحظ وجود عامل مشترك هو $(2x-1)$. مما يسمح لنا بكتابته (I)
 على شكل معادلة جداء:

$$\begin{aligned} (2x-1)^2 + x(1-2x) &= 4x^2 - 1 \\ (2x-1)^2 + x(1-2x) &= (2x-1)(2x+1) \\ (2x-1)^2 + x(1-2x) - (2x-1)(2x+1) &= 0 \\ (2x-1)[(2x-1)-x-(2x+1)] &= 0 \\ (2x-1)(-x-2) &= 0 \\ -x-2=0 & \text{ أو } 2x-1=0 \end{aligned}$$

$$x=-2 \quad \text{أو} \quad x= \frac{1}{2}$$

إذن، مجموعة حلول المعادلة هي:

نتيجة

عدد طبيعي غير معروف.

$$A(x) = 0 \quad \text{تكافئ} \quad [A(x)]^n = 0$$

مثال: المعادلة $x = -\frac{3}{2}$ تكافئ $2x+3=0$ أي $(2x+3)^2 = 0$

▪ "معادلة حاصل قسمة"

مبرهنة 3

$$B(x) \neq 0 \quad \text{و} \quad A(x)=0 \quad \text{تكافئ} \quad \frac{A(x)}{B(x)} = 0 \quad \text{المعادلة}$$

ملاحظة

مثل المعادلة $\frac{A(x)}{B(x)} = 0$ ، تسمى "معادلة حاصل قسمة".

مثال: حلّ، في \mathbb{R} ، المعادلة: $\frac{4x^2 - 1}{2x + 1} = 0$

المعادلة (2) تكافئ: $2x + 1 \neq 0$ و $4x^2 - 1 = 0$
 (يسمح الشرط $2x + 1 \neq 0$ بتعيين المجموعة المرجعية للمعادلة).

أي $x \neq -\frac{1}{2}$ و $x = -\frac{1}{2}$ أو $x = \frac{1}{2}$ أو $x \neq -\frac{1}{2}$ و $(2x - 1)(2x + 1) = 0$
 بما أنّ $x \neq -\frac{1}{2}$ ، ينبع $x = \frac{1}{2}$ الحلّ الوحيد للمعادلة.

إذن مجموعة حلول المعادلة (2) هي: $S = \left\{ \frac{1}{2} \right\}$

6. المتراجحتات

• إشارة العبارة $ax+b$ حيث ($a \neq 0$)
 لدراسة إشارة العبارة $ax+b$ حيث ($a \neq 0$), نحلّ، في \mathbb{R} ، إحدى المتراجحتين $ax+b \geq 0$ أو $ax+b \leq 0$ ونلخص النتائج كالتالي:

	$a < 0$			$a > 0$		
x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$	x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$
$ax+b$	+	0	-	$ax+b$	-	0

قاعدة:

يمكن تلخيص إشارة العبارة $ax+b$ كما هو موضح في الجدول المقابل:

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax+b$	a عكس إشارة	0	إشارة a

المtragحتات

▪ "متراجحة جداء"
 مبرهنة 4

عبارتان جبريتان $A(x)$ ، $B(x)$ ، $A(x) \times B(x) \geq 0$ المتراجحة من نفس الإشارة.

ملاحظة

مثل المتراجحة $A(x) \times B(x) \geq 0$ تسمى "متراجحة جداء".

مثال: حلّ في \mathbb{R} المتراجحة: $x^2 - 9 < 0$ (1)

(1) تكافئ $(x-3)(x+3) < 0$ ، لندرس إذن إشارة العبارة (1)

x	$-\infty$	-3	3	$+\infty$
$x-3$	-	-	0	+
$x+3$	-	0	+	+
$(x-3)(x+3)$	+	0	-	0

نقرأ في السطر الأخير للجدول أنّ $(x-3)(x+3) < 0$ يكون سالبا تماما على المجال $[-3; 3]$

بالتالي، (1) تكافئ $x \in [-3; 3]$.

منه مجموعة حلول المتراجحة (1) هي: $[-3; 3]$

▪ "متراجحة حاصل قسمة"

مبرهنة 5

$B(x) \neq 0$ عبارتان جبريتان.

$$\text{المتراجحة تكافئ } \frac{A(x)}{B(x)} \geq 0 \text{ و } A(x) \times B(x) \geq 0$$

ملاحظة

مثل المتراجحة $\frac{A(x)}{B(x)} \geq 0$ ، تسمى متراجحة "حاصل قسمة".

$$(2) \quad \frac{x-2}{2x+3} \geq 0$$

تكون العبارة $\frac{x-2}{2x+3}$ معرفة عندما يكون $2x+3$ غير معروف، بمعنى $x \neq -\frac{3}{2}$

لدراسة إشارة حاصل القسمة هذا، ندرس إشارة الجداء $(x-2)(2x+3)$ باستعمال جدول الإشارات:

x	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	2	$+\infty$
$x-2$	-		-	+
$2x+3$	-	0	+	+
$\frac{x-2}{2x+3}$	+		-	+

نقرأ في السطر الأخير للجدول أن $\frac{x-2}{2x+3}$ يكون موجباً (أكبر من 0 أو يساويه) على المجموعة

$$\left. \cdot \right]_{-\infty; -\frac{1}{2}} \cup [2; +\infty[. \quad \text{مجموعة حلول المتراجحة (2) هي: } \left. \cdot \right]_{-\infty; -\frac{3}{2}} \cup [2; +\infty[$$

7. العبارة ax^2+bx+c حيث $a \neq 0$

• الشكل النموذجي للعبارة ax^2+bx+c ($a \neq 0$)

من أجل كل عدد حقيقي x و a عدد حقيقي غير معروف،

$$\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} \quad \text{لكن} \quad ax^2 + bx + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right) \quad \text{لدينا:}$$

$$ax^2 + bx + c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right] = a \quad \text{ منه}$$

$$ax^2 + bx + c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right] \quad \text{نضع } \Delta = b^2 - 4ac$$

تعريف

▪ العدد $b^2 - 4ac$ هو مُميز العبارة ax^2+bx+c ($a \neq 0$) ونرمز إليه بالرمز Δ (نقرأ "دلتا").

$$\cdot (a \neq 0) \quad ax^2 + bx + c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right] \quad \bullet$$

أمثلة:

$$\begin{aligned} x^2 + 4x - 1 &= (x+2)^2 - 5 \quad \text{و نكتب:} \\ &\quad \text{الشكل النموذجي للعبارة } x^2 + 4x - 1 \text{ هو } x^2 - 5 \\ &\quad \text{و نكتب: } 3[(x-2)^2 - 16] \quad \text{و نكتب:} \\ 3x^2 - 12x - 36 &= 3(x^2 - 4x - 12) \\ &= 3[(x-2)^2 - 16] \end{aligned}$$

• حل المعادلة $(a \neq 0) \ ax^2 + bx + c = 0$

نكتب العبارة في الطرف الأول للمعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) على شكلها النموذجي، عندئذ نميز ثلاثة حالات:

$$\begin{aligned} \cdot \frac{\Delta}{4a^2} = \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right)^2 &\quad \text{نكتب } \Delta > 0 \\ ax^2 + bx + c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right] &= a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right)^2 \right] = a \left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right) \left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right) \quad \text{منه} \\ x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} &\quad \text{للمعادلة حلان هما:} \\ x_0 = \frac{-b}{2a} &\quad \text{و منه للمعادلة حل وحيد هو:} \quad \Delta = 0 \\ \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \left(-\frac{\Delta}{4a^2} \right) > 0, \quad \text{ولدينا } 0 &\quad \text{و منه المعادلة لا تقبل حلولا.} \quad \Delta < 0 \end{aligned}$$

مبرهنة

لتكن المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ مع ($a \neq 0$), Δ مميّزاً:

- إذا كان $\Delta > 0$ فإن المعادلة تقبل حلين x_2, x_1 : $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$, $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ و ينتج $ax^2 + bx + c = a(x-x_1)(x-x_2)$
- إذا كان $\Delta = 0$ فإن المعادلة تقبل حلًا مضاعفًا، حلان $x_0 = \frac{-b}{2a}$ (يعني بحل مضاعف، حلان متطابقان) و ينتج $ax^2 + bx + c = a(x-x_0)^2$
- إذا كان $\Delta < 0$ فإن المعادلة لا تقبل حلولاً و العبارة $ax^2 + bx + c$ لا تحل.

أمثلة

- في المعادلة $x^2 + 2x - 2 = 0$ لدينا $\Delta = 12 > 0$ إذن فهي تقبل حلتين هما: $x_2 = -1 + \sqrt{3}$, $x_1 = -1 - \sqrt{3}$
- في المعادلة $2x^2 - 12x + 18 = 0$ لدينا $\Delta = 0$ ، إذن فهي تقبل وحلاً مضاعفاً هو: 3
- في المعادلة $x^2 - x + 2 = 0$ لدينا $\Delta = -3 < 0$ أي $\Delta < 0$ إذن فهي لا تقبل حلولاً

طرائق وتمارين محلولة

• نشر وتبسيط وترتيب عبارة جبرية

أنشر وبسط ثم رتب العبارة $2(x^2-x+1)-x(x+2)+3$

حل	تعليق
$2(x^2-x+1)-x(x+2)+3 = 2x^2-2x+2-x^2-2x+3$ $\text{نبسط العبارة الناتجة:}$ $2x^2-2x+2-x^2-2x+3 = 2x^2-x^2-2x-2x+2+3$ $= (2-1)x^2-(2+2)x+5$ $= x^2-4x+5$	نلاحظ أن الشكل المبسط للعبارة مرتب حسب قوى x تنازلياً.

طريقة
لنشر وتبسيط وترتيب عبارة، ننشر الجداءات، إن وجدت، نحلل الحدود المتشابهة ونرتّب النتيجة حسب قوى x (الحرف) تنازلياً.

• تحليل عبارة جبرية

حل العبارات الآتية:

$$2x^2+5x-3 \quad (3) \quad 4x^2-12x+9 \quad (2) \quad x(x-2)-5(2-x) \quad (1)$$

حل	تعليق
$(1) \text{ لدينا } 2 - x = -(x - 2)$ $\cdot x(x - 2) + 5(x - 2)$ العبارة تصبح $x(x - 2) + 5(x - 2) = (x - 2)(x + 5)$ منه	• نبحث عن العوامل المشتركة بين حدود العبارة. في هذه الحالة، يكون $(x-2)$ عاملاً مشتركاً بعد إجراء التغيير $2 - x = -(x - 2)$.
$(2) \text{ العبارة على شكل مجموع ذي ثلاثة حدود: } 4x^2 - 12x + 9$ $\text{فيها: } 4x^2 \text{ مربع } 2x, 9 \text{ مربع } 3, 12x = 2 \times 2x \times 3$ $\text{وبالتالي يكون تحليلها من الشكل } (a-b)^2 \text{ مع } b=3, a=2x$ $\text{أي } 4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2$	• نتعرف على إحدى المتطابقات الشهيرة بالتمعن في حدود العبارة.
$(3) \text{ العبارة من الشكل } ax^2+bx+c \quad (a \neq 0), \text{ نكتبها على الشكل }$ النموذججي. $2x^2 + 5x - 3 = 2 \left[x^2 + \frac{5}{2}x - \frac{3}{2} \right] = 2 \left[\left(x + \frac{5}{4} \right)^2 - \frac{49}{16} \right] = 2 \left(x - \frac{1}{2} \right) (x + 3)$	• نلاحظ عدم وجود عوامل مشتركة بين حدود العبارة ولا نتعرف على إحدى المتطابقات الشهيرة.

طريقة
لتحليل عبارة جبرية، يمكن إتباع إحدى الطرائق التالية:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ نستعمل المساويتين $ab-ac=a(b-c)$ ، $ab+ac=a(b+c)$ (نتعرف على عامل مشترك) ▪ نستعمل مباشرة المتطابقات الشهيرة $a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$ ، $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$ ، $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$
$ax^2+bx+c = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right]$

• حل مترابحة

حل كلا من المتراجحتين الآتيتين:

$$\frac{4x+1}{(2x-1)^2} < \frac{1}{2x-1} \quad (2) \quad (3x-2)^2 \geq (x-1)^2 \quad (1)$$

حل

تعاليق

(1) ننقل كل الحدود إلى نفس الطرف:

$$(3x-2)^2 - (x-1)^2 \geq 0$$

نحلل الطرف الأول:

$$[(3x-2) - (x-1)][(3x-2) + (x-1)] \geq 0$$

$$(3x-2-x+1)(3x-2+x-1) \geq 0$$

$$(2x-1)(2x-3) \geq 0$$

$$:(2x-1)(2x-3)$$

ندرس إشارة

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$2x-1$	-	0	+	+
$2x-3$	-	-	0	+
$(2x-1)(2x-3)$	+	0	-	+

نستخلص، مجموعة حلول المترابحة هي:

$$S = \left] -\infty ; \frac{1}{2} \right[\cup \left[\frac{3}{2} ; +\infty \right[$$

(2) المقamat تتضمن المجهول، نبحث إذن عن الشروط:

المقامات تتضمن المجهول، وبالتالي يكون $\frac{1}{2x-1} = 0$ قيمة ممنوعة.

ننقل كل الحدود إلى نفس الطرف: $\frac{4x+1}{(2x-1)^2} - \frac{1}{2x-1} < 0$

نوّحد المقamat:

$$\frac{2x}{(2x-1)^2} < 0 \quad \text{أي} \quad \frac{4x-1-(2x-1)}{(2x-1)^2} < 0$$

$$:\frac{2x}{(2x-1)^2}$$

ندرس إشارة

x	$-\infty$	0	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$2x$	-	0	+	+
$(2x-1)^2$	+	+	0	+
$\frac{2x}{(2x-1)^2}$	-	0	+	

نستخلص، مجموعة حلول المترابحة هي:

• نتعرّف على فرق مربعين في الطرف الأول.

• عند دراسة إشارة جداء، نبني في جدول إشارة كل عامل ثم نستنتج إشارة الجداء باستعمال قاعدة الإشارات.

• عندما تتضمن مقامات حدود المترابحة المجهول، نبدأ بتعيين القيم الممنوعة ونبين ذلك في جدول الإشارات بخط متصل مضاعف.

• إشارة $\frac{A}{B}$ هي نفسها إشارة

$A \times B$ ، بشرط $A \neq 0$.

إشارة $\frac{2x}{(2x-1)^2}$ تتوقف على إشارة $2x$ فقط، باعتبار أن $(2x-1)^2 \geq 0$

طريقة

لحل مترابحة، نعيّن عند الضرورة القيم الممنوعة وننقل كل الحدود إلى نفس الطرف ليصبح الطرف الآخر معديماً. ندرس إشارة العبارة المحصل عليها باستعمال جدول الإشارات ونستخلص الحلول المطلوبة.

• اختيار الصيغة الأنسب لعبارة تبعاً للعمل المطلوب

$$x \text{ عدد حقيقي ، } E(x)=(x-1)^2-16$$

1. تحقق من أنّ:

$$E(x)=(x-5)(x+3) \quad (ب)$$

2. استعمال الصيغة الأنسب للعبارة $E(x)$:

$$E(x)=x^2-2x-15 \quad (أ)$$

(أ) احسب $E(0)$

$$E(x)=-15 \quad E(x)=9 \quad E(x)=0 \quad ; \quad ;$$

حلّ تعليق

1. (أ) ننشر العبارة $E(x)$ في صيغتها المفروضة ونجد:
 $(x-1)^2-16=x^2-2x+1-16=x^2-2x-15$

نستعمل المتطابقة الشهيرة
 $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$

(ب) نحلّ العبارة $E(x)$ في صيغتها المفروضة ونجد:
 $(x-1)^2-16=(x-1-4)(x-1+4)=(x-5)(x+3)$

نستعمل المتطابقة الشهيرة
 $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$

2. (أ) لحساب $E(0)$, نستعمل الصيغة المنشورة للعبارة ونجد:
 $E(0)=0^2-2 \times 0-15=-15$

نختار الصيغة المنشورة لأنّ
 كلّ الحدود المتعلقة بـ x^2 و $x=0$ تendum من أجل

(ب) لحلّ المعادلة $E(x)=0$ ، نستعمل الصيغة المحللة للعبارة
ونجد:

$$\begin{aligned} & (x-5)(x+3)=0 \\ & \text{نكافئ } x-5=0 \quad \text{أو} \\ & \text{أي } x=5 \quad \text{أو} \\ & x=-3 \end{aligned}$$

ومنه مجموعة حلول المعادلة: $S = \{-3 ; 5\}$

الطرف الثاني للمعادلة معروف،
 يستحسن استعمال الصيغة
المحللة.

لحلّ المعادلة $E(x)=9$, نستعمل الصيغة المفروضة للعبارة

ونجد:

$$(x-1)^2-16=9 \quad E(x)=9$$

$$(x-1)^2=25$$

$$x-1=-5 \quad x-1=5 \quad \text{أو}$$

$$x=-4 \quad x=6 \quad \text{أي}$$

ومنه مجموعة حلول المعادلة: $S = \{-4 ; 6\}$

نلاحظ أنّ $16+9=25$ ، نحلّ
المعادلة على الشكل $x^2=a$.

لحلّ المعادلة $E(x)=-15$, نختار الصيغة المنشورة للعبارة ونجد:

$$x^2-2x-15=-15 \quad E(x)=-15$$

$$x^2-2x=0$$

$$x(x-2)=0$$

$$x-2=0 \quad x=0 \quad \text{أو}$$

$$x=2 \quad x=0 \quad \text{أي}$$

ومنه مجموعة حلول المعادلة: $S = \{0 ; 2\}$

نتخلص من -15 في طرفي
المعادلة ونتحصل على معادلة
جداً.

طريقة
 لحلّ معادلة ، نكتبها على إحدى الصيغ (المبسّطة والمرتبة، المحللة) ونجري بعد ذلك الحسابات
الضرورية.

• إيجاد ترابط الدوال المرجعية المواقف لدالة معطاة

لتكن f الدالة المعرفة على R^* بالشكل $f(x) = \frac{2x-3}{x}$. من بين الاقتراحات الآتية، عين ترابط الدوال المرجعية المواقف للمرور من x إلى $f(x)$:

1. نطبق الدالة التالية g المعرفة على R بالشكل $g(x) = 2x-3$ ، ثم الدالة مقلوب h المعرفة على R^*

$$\text{بالشكل } h(x) = \frac{1}{x}$$

2. نطبق دالة المقلوب h المعرفة على R^* ثم الدالة التالية g المعرفة على R

$$\text{بالشكل } g(x) = 2x-3$$

3. نطبق دالة المقلوب h المعرفة على R^* ثم الدالة التالية k المعرفة على R

$$\text{بالشكل } k(x) = 2 - 3x$$

تعالق	حل
	<p>1 . نحسب صورة 3 بالدالة f وبالترابط " g ثم h :</p> $f(3) = \frac{2(3)-3}{3} = 1$ $3 \xrightarrow{g} 3 \xrightarrow{h} \frac{1}{3}$ <p>الصورتان مختلفتان، وبالتالي فالترابط الأول غير موافق.</p>
	<p>2 . نحسب صورة 3 بالدالة f وبالترابط " h ثم g :</p> $f(3) = 1$ $3 \xrightarrow{h} \frac{1}{3} \xrightarrow{g} 2\left(\frac{1}{3}\right) - 3 = \frac{2-9}{3} = -\frac{7}{3}$ <p>الصورتان مختلفتان، وبالتالي فالترابط الثاني غير موافق.</p>
	<p>3 . نحسب صورة 3 بالدالة f وبالترابط " h ثم k :</p> $f(3) = 1$ $3 \xrightarrow{h} \frac{1}{3} \xrightarrow{k} 2 - 3\left(\frac{1}{3}\right) = 2 - 1 = 1$ <p>الصورتان متساويتان، وبالتالي يمكن أن يكون الترابط الثالث موافقاً.</p> <p>للحض افتراض ما، يكفي إيجاد مثال مضاد.</p>
	<p>للبرهنة على ذلك: نعلم أنه من أجل كل x من \mathbb{R}^* ،</p> $f(x) = \frac{2x-3}{x} = \frac{2x}{x} - \frac{3}{x} = 2 - \frac{3}{x}$ <p>ولدينا أيضا حسب الترابط " h ثم k :</p> $x \xrightarrow{h} y = \frac{1}{x} \xrightarrow{k} z = 2 - 3y = 2 - 3\left(\frac{1}{x}\right) = 2 - \frac{3}{x}$ <p>نستنتج أن</p> $f(x) = k(h(x))$

طريقة

لإيجاد ترابط الدوال المرجعية للمرور من x إلى $f(x)$ ، نأخذ بالاعتبار الترتيب الذي نجري فيه العمليات لحساب الصورة.

• حل معادلة من الدرجة الثانية

حل كلا من المعادلات الآتية:

$$3x^2 - 2x + 1 = 0 \quad (3) \quad 9 - (x - 3)^2 = \frac{17}{2} \quad (3) \quad x^2 + 6x + 9 = 0 \quad (2) \quad x^2 + 1 = 0 \quad (1)$$

حل

1. لينا من أجل كل عدد حقيقي x ، $x^2 \geq 0$ وبالتالي $x^2 + 1 > 0$. المعادلة $x^2 + 1 = 0$ ليس لها حلول. مجموعة حلول المعادلة هي $S = \emptyset$.

تعاليق
نكتب أيضا المعادلة على الشكل $x^2 = -1$ ، ثم نقارن الطرفين.

2. المعادلة $(x + 3)^2 = 0$ تكافئ $x^2 + 6x + 9 = 0$ أي $x = -3$. مجموعة حلول المعادلة هي $S = \{-3\}$

نتعرف على متطابقة شهرة في الطرف الأول ثم نحله.

3. المعادلة $9 - (x^2 - 6x + 9) = \frac{17}{2}$ تكافئ $9 - (x - 3)^2 = \frac{17}{2}$

نتعرف على متطابقة شهرة (فرق مربعين) في الطرف الأول، لكن ذلك لا يساعدنا كثيرا باعتبار أن الطرف الثاني للمعادلة غير معروف.

لينا في هذه الحالة $c = -17$ ، $b = -12$ ، $a = -2$
وبالتالي $\Delta = (-12)^2 - 4(-2)(-17) = 8$
المعادلة لها، إذن، حلان:

$$x_1 = \frac{-(-12) - \sqrt{8}}{2(-2)} = \frac{12 - 2\sqrt{2}}{-4} = \frac{-6 + \sqrt{2}}{2}$$

$$x_2 = \frac{-(-12) + \sqrt{8}}{2(-2)} = \frac{12 + 2\sqrt{2}}{-4} = \frac{-6 - \sqrt{2}}{2}$$

مجموعة حلول المعادلة هي $S = \left\{ \frac{-6 - \sqrt{2}}{2}, \frac{-6 + \sqrt{2}}{2} \right\}$

4. لينا في هذه الحالة $c = 1$ ، $b = -2$ ، $a = 3$

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 3 = -8$$

وبالتالي، إذن، ليست لها حلول.

مجموعة حلول المعادلة هي $S = \emptyset$

طريقة


لحل معادلة من الشكل $ax^2 + bx + c = 0$ مع $a \neq 0$

▪ نتعين في إمكانية تحليل المعادلة.

▪ في الحالات الأخرى، نستعمل المميز.

• ترجمة مشكلة وحلها باستعمال معادلة

. $[CD]$ مستطيل حيث $AB = 10\text{ cm}$ ، $AD = 4\text{ cm}$ ، I منتصف $[AB]$ ، J منتصف $[CD]$ نقطة متغيرة من M عين مواضع M التي يكون من أجلها المثلث AMB قائما في M .



- نضع $MJ = x$. لدينا $0 \leq x < 5$. يمكن تبرير هذا الاختيار بالاعتماد على التخمين: الدائرة ذات القطر $[AB]$ المحيطة بالمثلث القائم AMB تقطع $[CD]$ في نقطتين متاظرتين بالنسبة إلى J تجibian عن السؤال.

- نعتبر عن DM و MC بدلالة x ، نجد:

$$MC = 5 + x , DM = 5 - x$$

حسب مبرهنة فيثاغورس، المثلث AMB قائم في M يكافي:

$$\begin{aligned} AM^2 + MB^2 &= AB^2 \\ MB^2 &= MC^2 + CB^2 , AM^2 = AD^2 + DM^2 \\ MC^2 + CB^2 + AD^2 + DM^2 &= AB^2 \\ (5+x)^2 + 4^2 + 4^2 + (5-x)^2 &= 10^2 \\ \text{بالنشر والتبسيط، نجد: } x^2 + 82 &= 100 \quad \text{أي } x^2 = 18 \end{aligned}$$

- وبما أن $x < 5$ ، فإن $x = 3$. نعيد نفس العمل عندما تكون M من JC ، نجد أيضا $x = 3$.

- توجد، إذن، نقطتان تحققان المطلوب.
لإنشائهما، نرسم الدائرة التي قطرها $[AB]$.

يتعلق الأمر في هذه الوضعية
بتبييض مسألة.

يمكن اعتبار M تتغير على كل
القطعة $[CD]$ بدلا من $[DJ]$
ونضع $DM = x$ ، ويكون في
هذه الحالة $0 \leq x \leq 10$.
فنتحصل على المعادلة

$$x^2 - 10x + 16 = 0$$

نترجم النص بمعادلة رياضية
المجهول فيها هو x .

عند حلّ المعادلة، لا نعتبر إلا
الحلول التي توافق المعطيات.

لا نكتفي بتعيين عدد النقط، يجب
إنشاءها أيضا.

طريقة

لترجمة مشكلة وحلّها باستعمال معادلة:

- نختار المجهول
- نترجم النص بمعادلة رياضية
- نحلّ المعادلة
- نستخلص

تعلم البرهنة

• إجاز استدلالات تتدخل فيها استلزمات أو تكافؤات، أو تحليلها.

1. أ) برهن أنه مهما كان العددان الحقيقيان الموجبان a, b :

$$a^2 = b^2 \quad \text{يكافئ} \quad a = b$$

ب) لتكن المعادلة: $\sqrt{x+1} = \sqrt{2x-4}$ (1)
إذا كان للمعادلة (1) حلول، فلماذا يجب أن تنتهي هذه الحلول إلى المجال $[+∞ ; 2]$ ؟
باستعمال الخاصية المبرهن عليها في السؤال أ، حل في $[+∞ ; 2]$ المعادلة (1).

2. لتكن المعادلة: $\sqrt{x-2} = \sqrt{13-2x}$ (2)
عِين المجموعة المرجعية للمعادلة (2) ثم حل هذه المعادلة.

3. تمرين:
إليك نص السؤال والحل المقترح له من قبل تلميذ. ما رأيك في هذا الحل؟
نص السؤال: عِين مجموعة النقط المشتركة للمنحني (C) الذي معادلته $\sqrt{2(x+5)} = y$ والمستقيم (D) الذي معادلته $y = 9 - x$.

الحل المقترح:

1) كانت نقطة M لخطياما $(y; x)$ مشتركة بين (C) و (D)، فلن اخذ فيها بعين الاعتبار معادلة (C) ومعادلة (D) وبالتالي مما حل للجملة:

$$\begin{cases} y = 9 - x \\ x^2 - 20x - 21 = 0 \end{cases} \quad \text{في} \quad \begin{cases} y = 9 - x \\ (9-x)^2 = 2(x+5) \end{cases} \quad \begin{cases} y = 9 - x \\ y = \sqrt{2(x+5)} \end{cases}$$

النقطة M مشتركة بين (C) و (D) فقط إذا كانت فاصلتها حلاً للمعادلة:

$$(I) \quad x^2 - 20x - 21 = 0$$

لكن $x^2 - 20x - 21 = (x-10)^2 - 121 = (x-10)^2 - 21^2$ ، فالمعادلة (I) تقبل حلتين مما: $x = 21$ ، $x = -1$.

ونستنتج أن (C) و (D) يشتركان في نقطتين مما: $M_1(21; -12)$ ، $M_2(-1; 10)$.

إعادة استثمار

حرر جواباً تحل فيه المعادلة الآتية، مع إبراز العبارات الدالة على الاستلزم أو التكافؤ في خطوات حلّك:

$$\frac{3x-4}{x+1} = \frac{-7}{x} + \frac{7-x}{x^2+x}$$

استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال

• تحليل عبارة جبرية باستعمال مجدول

▪ ترابط دوال

نعتبر الدالة f المعرفة على \mathbb{R} بالشكل:

$$f(x) = \frac{-2}{x+1} - 3$$

يمكن الحصول على عبارة $f(x)$ ، من أجل $-1 \neq x$ ، حسب ترابط الدوال المألوفة الآتي:

$$\begin{array}{ccccccc} x & \xrightarrow{+1} & c+1 & \xrightarrow{\text{مقلوب}} & \frac{1}{c+1} & \xrightarrow{\times(-2)} & -2\left(\frac{1}{c+1}\right) \\ & & & & & & \xrightarrow{-3} 2\left(\frac{1}{c+1}\right) - 3 \end{array}$$

بنفس الكيفية، اكتب ترابط الدوال المألوفة الذي يسمح بكتابة العبارة: 1

▪ اكتشاف ترابط دوال مرجعية موافق

لاحظ جدول القيم الآتي، استنتج عبارة ممكنة للدالة $(x \mapsto f(x))$ انطلاقاً من الدوال المرجعية h ، g ، k .
القيم مُدورّة إلى الجزء من المائة).

x	$g(x)$	$h(x)$	$k(x)$		$f(x)$
-3	9	-9	-0,33		-0,11
-2,5	6,3	-8	-0,4		-0,13
-2	4	-7	-0,5		-0,14
-1,5	2,3	-6	-0,67		-0,17
-1	1	-5	-1		-0,2
-0,5	0,3	-4	-2		-0,25
0	0	-3	####		-0,33
0,5	0,3	-2	2		-0,5
1	1	-1	1		-1
1,5	2,3	0	0,67		####
2	4	1	0,5		1
2,5	6,3	2	0,4		0,5
3	9	3	0,33		0,33

إرشادات:

- للتعرف على دالة تاليفية، يمكن التفكير في استعمال الخاصية المميزة.
- للتعرف على دالة المربع ودالة المقلوب، يمكن التفكير في استعمال شفاعة كلّ منها وأثر ذلك على جدول قيمها على مجال متناظر.
- لإيجاد عبارة الدالة f ، يمكن تجربة التركيبات المختلفة للدوال h ، g ، k .

إعادة استثمار

في الجدول المقابل f ، g دالتان مرجعيان .

1. بتحليل قيم $(x) f$ من أجل بعض الأعداد من المجال $[-2 ; 2]$ ، استنتاج عبارة $(x) f$.
2. أكمل خانات العمود الثاني من الجدول المقابل.

x	$g(x)$	$f(x)$
-2		0
-1,5		1,5
-1		3
-0,5		4,5
0		6
0,5		7,5
1		9
1,5		10,5
2		12

حل مسألة إدماجية

الهدف: استعانة بالحسابية البيانية لاختبار صحة مختمنة

لتكن الدالتين $f(x)$ ، $g(x)$ حيث:

$$g(x)=x^3-x^2-(x+1)(x-1)^2 \quad ; \quad f(x)=x^3-1$$

1. دون استعمال النشر وحسابية، احسب: $f(0)$ ، $f(1)$ ، $f(-1)$ ، $g(0)$ ، $g(1)$ ، $g(-1)$
2. ما هو التخمين الذي يمكن وضعه؟
3. باستعمال حاسبة، قارن بين قيم العبارتين المعرفتين للدالتين من أجل قيم أخرى للعدد x .
(تعطى جداول المقارنة)
هل الجداول تؤكد التخمين الموضوع سابقاً؟
4. أنشئ، بحاسبة بيانية، المنحنيين الممثلين للدالتين.
ماذا تمثل الأعداد 0 ، 1 ، -1 بالنسبة للمنحنيين؟ ما هي المعادلة التي تفسر ذلك؟

1. بالتعويض مباشرة في العبارتين، نحصل على:

$$f(-1)=-2 \quad , \quad f(1)=0 \quad , \quad f(0)=-1$$

$$g(-1)=-2 \quad , \quad g(1)=0 \quad , \quad g(0)=-1$$

2. بملاحظة النتائج السابقة، نقول أنه يمكن أن تكون العبارتان المعرفتان للدالتين متساويتين، أي أن
 $f(x)=g(x)$

3. بوضع

$$Y_1=x^3-1$$

$$Y_2=x^3-x^2-(x+1)(x-1)^2$$


بمقارنة النتائج المحصل عليها من أجل قيم أخرى لـ x ،
يتبيّن أنَّ التخمين الموضوع عند (2) غير صحيح.

X	Y_1	Y_2
-2	-9	-3
-1	-2	-2
0	-1	-1
1	0	0
2	7	1
3	26	2
4	63	3

$X=4$

4. بقراءة بيانية، نلاحظ أنَّ المنحنيين يشتراكان في ثلاثة نقاط والأعداد 0 ، 1 ، -1 هي فوائل هذه النقاط.

• يمكن تفسير النتائج السابقة بحل المعادلة $f(x)=g(x)$



تمارين وسائل

العبارة الجبرية	أصحٍ أم خطأ؟
<p>14. x عدد حقيقي. في كلّ حالة من الحالات الآتية، عيّن طبيعة كلّ عبارة معطاة.</p> <p>(أ) $x^2 + 2x$ (ب) $x(2x^2 + 1) + 2$ (ج) $(x - 1)x^2$ (د) $\frac{2}{3}x(x - 1)^2$ (ه) $\frac{1}{x^2 + 1}$</p>	<p>بين إن كان النص صحيحاً أم خاطئاً مع التبرير.</p> <p>1. x عدد حقيقي. $x^2 - 2$ فرق بين مربعين.</p>
<p>15. عبر عن النصوص التالية بعبارات مناسبة.</p> <p>(أ) معاكس ضعف x. (ب) مربع مجموع x و -1. (ج) مجموع مقلوب x و -1. (د) مقلوب مجموع x و -1.</p>	<p>2. $A = x^2 - 3x - 4$ حيث $A = -4$ ، $x = 0$ من أجل كلّ عدد حقيقي x ، $(-2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$</p>
<p>16. ما هي التعليمات الازمة لكتابة العبارة الآتية:</p> $\frac{x^2}{x^3 - 1} - 2$	<p>3. من أجل كلّ عدد حقيقي غير معروف x ، $\frac{1}{x^2 + 2} = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{2}$</p> <p>4. من أجل كلّ عدد حقيقي x ، $(x - 1)(x - 3) = x^2 - 4x + 3$</p>
<p>17. x عدد حقيقي ، $E(x) = -2(x + 1)^2 - 3x + 1$</p> <p>(أ) أحسب $E(0)$ (ب) أنشر وبسط العبارة. (ج) عوّض x بالقيمة 0 في العبارة الناتجة، هل تجد نفس النتيجة كما في (أ)؟</p>	<p>5. من أجل كلّ عدد حقيقي x ، $A = (-x + 2)^2$ حيث $A = 9$ هو الشكل المنشور والمبسط للعبارة A هو: $x^2 + 4$</p> <p>6. تحليل العبارة $(x - 3)(x + 3) - x^2 - 9$ هو</p>
<p>18. احسب عندما يكون ذلك ممكناً القيم العددية للعبارات الآتية من أجل قيم المتغيرات المعطاة.</p> <p>$x = \sqrt{2}$ $A = x(x^2 - 1)$ $y = -1$ ، $x = 0$ $B = \frac{x + y}{xy}$ $x = \frac{5}{3}$ $\sqrt{-x + 3}$ $x = 1$ $\frac{x^2 + 1}{\sqrt{x - 1}}$</p>	<p>7. بتطبيق الدالة $I : x \mapsto x + 1$ ، متبوعة بالدالة المربع ثم الدالة المقلوب نحصل على $x \mapsto \frac{1}{x^2 + 1}$</p> <p>8. حلول المعادلة $x^2 + 49 = 0$ هما: 7 ، -7</p> <p>9. من أجل كلّ عدد حقيقي x ، $-x - 1 \leq 0$</p> <p>10. المترابحة $\frac{x - 3}{x - 1} \geq \frac{2}{3}$ تكافئ $3(x - 3) \geq 2(x - 1)$</p> <p>11. الشكل النموذجي للعبارة $(x + 2)^2 - 16$ هو: $A = x^2 + 4x - 12$</p> <p>12. المعادلة $x^2 - x - 1 = 0$ لا تقبل حلولاً في R</p>
<p>19. $(a + b)^3 \neq a^3 + b^3$. بين أنَّ</p>	

$$\begin{array}{l} \text{ب) } 2(x^2 - 1) - x^2 + 1 \\ \text{د) } x^3 - 2x^2 + 5 \end{array}$$

20. عيّن قيمة x التي من أجلها يكون للعبارات الآتية معنى ثم وحد المقامات.

$$E(x) = 3 - \frac{(2x-1)^2}{x-3} \quad (\text{أ})$$

$$F(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+3} \quad (\text{ب})$$

$$G(x) = \frac{2}{x^2} - x \quad (\text{ج})$$

$$H(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x-1} \quad (\text{د})$$

27. الصيغ المنشورة للعبارات الآتية لها الشكل $ax^2 + bx + c$ حيث a, b, c أعداد حقيقية.

أو جد، دون النشر، العددان a ، c .

$$\begin{array}{l} \text{أ) } (2x-1)(x+3) \\ \text{ب) } 4\left(x - \frac{1}{2}\right)(x+3) \\ \text{ج) } (x\sqrt{2}-1)(2x+3) \end{array}$$

28. دون استعمال النشر، عيّن الصيغة المساوية

$$\begin{array}{l} \text{أ) } 2x^2 - 5x + 2 \\ \text{ب) } (x-2)(1-2x) \\ \text{ج) } (x-2)(2x-1) \\ \text{د) } (x-1)(x-2) \end{array}$$

29. حل العبارات الآتية:

$$\begin{array}{l} \text{أ) } 2x^3 - x \\ \text{ب) } 2x^3 - 3x^2 + 6x \\ \text{ج) } 2x(x-1) + (3x+2)(x-1) \\ \text{د) } x^2 - 0,49 \end{array}$$

30. حل العبارات الآتية:

$$\begin{array}{l} \text{أ) } (x-5)(3x+2) + x^2 - 25 \\ \text{ب) } 9x^2 - (x+1)^2 \\ \text{ج) } x(x^2 - 3) \end{array}$$

31. $E = (x+1)^2 - x - 1$ عبارة جبرية حيث $-x - 1 = -(x+1)$

. بملحوظة أن $-x - 1 = -(x+1)$ ، حل E .

2. حل العبارات الآتية:

$$\begin{array}{l} \text{أ) } (3x-1)(x-1) - x(1-3x) \\ \text{ب) } 4x^2 - 9 + (2x-3) \end{array}$$

$$\text{ج) } (3x-2)(x+1) - (4-6x)(x+3) \quad (\text{د})$$

32. حل باستعمال المتطابقات الشهيرة للعبارات الآتية:

$$\begin{array}{l} \text{أ) } x^2 - \frac{25}{9} \quad (\text{ب}) \\ \text{ج) } 2x^2 + 2x\sqrt{2} + 1 \\ \text{د) } 3x^2 - 1 \end{array}$$

21. بسط العبارات الآتية:

$$\begin{array}{l} \text{أ) } x\sqrt{2} + 3x \\ \text{ب) } x^2 + 2x - 5x \\ \text{ج) } 2x^2 - 3x - x^2 + 1 \end{array}$$

22. أنشر كلا من العبارات الآتية:

$$\begin{array}{l} \text{أ) } A(x) = (x-1)(x+1)(x-2) \\ \text{ب) } B(x) = (3x-1)^2(x+2) \\ \text{ج) } C(x) = -2x(x+2)^2 - 3(x+1)(2x-3) \end{array}$$

23. أنشر ثم ربّب كلا من العبارات الآتية:

$$\begin{array}{l} \text{أ) } A(x) = 3(x-5)(x+3) \\ \text{ب) } B(x) = \frac{x+1}{3} - \frac{x}{2} + 4 \\ \text{ج) } C(x) = \frac{2}{3}x(2x+9) - 5x + 1 \end{array}$$

24. أنشر ثم ربّب كلا من العبارات الآتية:

$$\begin{array}{l} \text{أ) } (3x - \sqrt{2})^2 \\ \text{ب) } (x+2)^2 - (x+3)^2 \\ \text{ج) } (-2x-5)(5+2x) \\ \text{د) } \left(2x + \frac{1}{3}\right)^2 \end{array}$$

25. انشر ثم ربّب العبارة الآتية:

$$E(x) = \left(\frac{x-1}{3}\right)^2 + x\left(\frac{x+2}{4}\right)$$

26. أنشر عندما يكون ذلك ممكنا كلا من العبارات الآتية:

$$3x^2 - 15 \quad (\text{أ})$$

1. هل الإجابة الآتية صحيحة:

"ننتقل من x إلى $f(x)$ بتطبيق الدالة $x \mapsto x - 3$ متبوعة بالدالة المقلوبة ثم الدالة $x \mapsto x + 5$ ".

$$f(x) = 1 + \frac{8}{x-3}, \quad x \neq 3$$

2. تحقق من أن لكل x استنتاج ترابط الدوال الذي يسمح بالمرور من x إلى $f(x)$.

المعادلات

39. بين إن كان الرمز " $=$ " يتعلق بمساوية أم بمعادلة فيما يأتي:

(أ) عبارة جبرية حيث $A = x^2 + 3x - 2$

(ب) هل يوجد x حيث $2x^2 - x = x + 1$

40. نعتبر المعادلة $5x^2 + x - 6 = 0$ (م). من بين الأعداد الآتية، عين حلول المعادلة (م).

$$\frac{5}{6}, -1, 0, 1, 2$$

41. حل في R المعادلات الآتية:

$$2x\sqrt{3} - 1 = 0 \quad (\text{ب}) \quad 2x = x + 1 \quad (\text{أ})$$

$$\frac{x}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (\text{د}) \quad 2x = \frac{2x+1}{3} \quad (\text{هـ})$$

42. حل في R المعادلات الآتية:

$$x(x+2) = -3 - (x^2 - 3) \quad (\text{أ})$$

$$2(x-2) - 4(x-3) = -2x+1 \quad (\text{بـ})$$

$$(2x+3)(x-3) - (x-3)(x+2) = 0 \quad (\text{جـ})$$

$$3(x-1)^2 + 2x - 2 = 0 \quad (\text{دـ})$$

43. حل في R المعادلات الآتية:

$$x^2 - 9 = 0 \quad (\text{أ})$$

$$x^2 + 16 = 0 \quad (\text{بـ})$$

$$3x^2 - 6 = 0 \quad (\text{جـ})$$

44. حل في R المعادلات الآتية:

$$(x+3)^2 = (4x-5)^2 \quad (\text{أ})$$

$$(2-x)(x+3) = x^2 - 4 \quad (\text{بـ})$$

$$4x^2 - 9 + (2x+3)(3x-4) = 0 \quad (\text{جـ})$$

33. برهن المساويات الآتية:

$$x \neq -1 \text{ حيث } \frac{2x+1}{x+1} = 2 - \frac{1}{x+1} \quad (\text{أ})$$

$$x \neq -2 \text{ حيث } \frac{x^2+x-1}{x+2} = x-1 + \frac{1}{x+2} \quad (\text{بـ})$$

$$(x-1)^3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 \quad (\text{جـ})$$

34. برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي x موجب ويختلف عن 1

$$\frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{1}{\sqrt{x}+1} = \frac{2}{x-1}$$

الدوال والعبارات الجبرية

35. إليك برنامج الحساب الآتي:

اختر عددا
ربع هذا العدد
أضف إلى النتيجة $\frac{1}{3}$
أضرب النتيجة في $\frac{4}{3}$

1. طبق هذا البرنامج على كل من 0، 1، -1، 1.

2. طبق هذا البرنامج على عدد حقيقي كيافي x . لتكن النتيجة $f(x)$.

3. ما هو ترابط الدوال المرجعية الذي يسمح بالمرور من x إلى $f(x)$ ؟

36. عين ترابط الدوال الذي يسمح بالمرور من x إلى $f(x)$ في كل حالة.

$$x \neq 2 \text{ مع } x \mapsto \frac{1}{x-2} \quad (\text{أ})$$

$$x \mapsto 5x^2 - 1 \quad (\text{بـ})$$

$$x \geq 0 \text{ مع } x \mapsto 2\sqrt{x} - 3 \quad (\text{جـ})$$

37. f هي الدالة المعرفة على R بالشكل:

$$f(x) = -3(2x-1)^2 + 5$$

عين ترابط ثلث دوال مرجعية يسمح بالمرور من x إلى $f(x)$.

38. f هي الدالة المعرفة لكل عدد حقيقي $x \neq 3$ بالشكل:

$$f(x) = \frac{x+5}{x-3}$$

المتراجحات

50. عين إشارة كل من العبارات الآتية:

$$I + \frac{2}{x^2} \quad (\text{ح}) \quad -\sqrt{x} \quad (\text{ب}) \quad x^2 + 2 \quad (\text{أ})$$

$$-\sqrt{-x} \quad (\text{و}) \quad -\frac{x^2}{2} - 10 \quad (\text{ه}) \quad (x-1)^2 + 9 \quad (\text{د})$$

51. أكمل جدول إشارات العبارة $I = -2x + 1$

x	$-\infty$.	$+\infty$
$-2x + 1$		0	

52. أدرس إشارة كل من العبارات الآتية:

$$\frac{2}{3} - \frac{3}{2}x \quad (\text{ب}) \quad 2x - 3 \quad (\text{أ})$$

$$-1 - \frac{2}{\sqrt{2}}x \quad (\text{ح})$$

53. أدرس إشارة كل من العبارات الآتية:

$$9x^2 - 1 \quad (\text{ب}) \quad (x-1)(2x-3) \quad (\text{أ})$$

$$-x(x+1) \quad (\text{ح})$$

54. أدرس إشارة كل من العبارات الآتية:

$$\frac{3(x-2)+3}{x+1} \quad (\text{ب}) \quad \frac{-2}{x+3} \quad (\text{أ})$$

$$\frac{x^2}{x-2} \quad (\text{ح})$$

55. حل في R المتراجحات الآتية:

$$(3x+5)(x-3) \leq 0 \quad (\text{أ})$$

$$9x^2 - 25 \leq 0 \quad (\text{ب})$$

$$(3x-4)^2 \geq (5-4x)^2 \quad (\text{ح})$$

56. حل في R المتراجحات الآتية:

$$x - \frac{1-3x}{2} < 2 \quad (\text{أ})$$

$$\frac{1}{x+1} \geq 1-x \quad (\text{ب})$$

$$x^2 \leq 8x - 16 \quad (\text{ح})$$

45. حل في R المعادلات الآتية:

$$\frac{8}{x^2 - 1} = 1 \quad (\text{ب}) \quad \frac{2x-5}{x+1} = 0 \quad (\text{أ})$$

$$\frac{x+5}{x+1} = \frac{x-1}{x-5} \quad (\text{ح})$$

46. بفرض $f(x) = (2x-3)(3x-1)$

$$\cdot f\left(\frac{3}{2}\right) \quad 1. \text{ احسب}$$

$$2. \text{ احسب } f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right), f(\sqrt{2}) \quad \cdot \text{ تعطى النتيجان}$$

$$\cdot a+b\sqrt{2}$$

$$3. \text{ حل المعادلة } f(x) = 0$$

47. لتكن E العبارة

$$E = (2x-1)(x-4) + x^2 - 16$$

$$1. \text{ انشر وبسط } E$$

$$2. \text{ حل } E$$

3. باختيار الصيغة الأنسب، احسب قيمة E من

$$\cdot x = \frac{1}{2}, x = 0 \quad \text{أجل}$$

4. باختيار الصيغة الأنسب، حل المعادلتين

$$E = -12, E = 0$$

48. بفرض $A(x) = -3(x-3) + x^2 - 3x$

$$1. \text{ حل ثم انشر } A(x)$$

$$2. \text{ نضع } x = \frac{A(x)}{x+2} \quad \cdot \text{ أوجد مجموعة قيم } x$$

التي يكون من أجلها معنى للعبارة $A(x)$

3. حل المعادلات الآتية:

$$E(x) = -6, E(x) = 0$$

49. لتكن f الدالة المعرفة على $\{5\}$

بالشكل:

$$f(x) = \frac{2x}{x-5} + 1$$

$$1. \text{ احسب صورة } \frac{2}{3}$$

$$2. \text{ احسب السوابق الممكنة للأعداد } 5, 3, 0$$


3. باختيار الصيغة الأنسب، أجب عن الأسئلة
 (3) اختر العبارة المناسبة ثم احسب كل من العددين
 $E(\sqrt{2})$ ، $E(0)$
 حل، في \mathbb{R} ، المعادلتين (4)
 $E(x) = 3$ ، $E(x) = 0$ والمتراجحة $E(x) < 0$.

63. هل توجد ثلاثة أعداد طبيعية متتالية هي أطوال أضلاع مثلث قائم؟

64. ABC مثلث قائم في B حيث $AB = 4\text{ cm}$ حيث (1). $BC = 3\text{ cm}$ مستقيم يوازي (BC) ويقطع (AB) في M و $[AC]$ في N .
 (أ) أرسم شكلاً يترجم المعطيات السابقة.
 (ب) هل يوجد وضع للمستقيم (1) الذي من أجله تكون مساحة المثلث NMC نصف مساحة المثلث ABC ؟

65. قرص نصف قطره $5,5\text{ cm}$ يكمل نصف قطر حتى تكون مساحة القرص ضعف مساحة القرص الأول؟

66. ورقة مربعة الشكل ضلعها 6 cm . ينقطع من كل ركن من أركانها نفس المربع الصغير كما في الشكل.



كيف نختار ضلع المربع الصغير حتى تكون مساحة الجزء الملون ثلاثة أرباع مساحة الورقة المربعة؟

67. $ABCD$ مربع. E نقطة من $[AB]$ ، F نقطة من $[AD]$ حيث $EB = DF = 5\text{ cm}$. عين طول ضلع المربع الذي من أجله تكون مساحة المثلث AEF متساوية ربعة مساحة المربع $ABCD$.

68. عائلة تنظم مصاريفها الشهرية كالتالي:
 نصف الدخل الشهري للإطعام وربع الباقى للإيجار والمصاريف الأخرى (ماء، كهرباء) والباقي يخصص منه 10% للتنزه وشراء الملابس والمبلغ الباقى للإذار أي 1400 د.ج. ما هو الدخل الشهري لهذه العائلة؟

57. أ) أدرس إشارة العبارة $\frac{x(x-1)}{x+3}$.
 ب) استنتج حلول المتراجحة $\frac{x(x-1)}{x+3} > 0$
 العبارة ($a \neq 0$) $ax^2 + bx + c$

58. أكتب كل عبارة على الشكل النموذجي.

(أ) $-x^2 + 2x + 4$ (ب) $x^2 - 4x + 1$
 (ج) $x^2 - 5x + 3$

59. أكتب كل عبارة على الشكل النموذجي.

(أ) $-x^2 + 7x - 10$ (ب) $2x^2 + 6x + 4$
 (ج) $x^2 + 6x$

60. حل في R المعادلات الآتية دون استعمال الممرين.

(أ) $x^2 - 3x = 0$ (ب) $x^2 + 10x + 25 = 0$
 (ج) $(x+1)^2 - 9 = 0$

61. حل في R المعادلات الآتية:

(أ) $1 - t - 2t^2 = 0$ (ب) $x^2 + x - 1 = 0$
 (ج) $u^2 + 5u - 6 = 0$ (د) $x^2 - 3x\sqrt{2} + 4 = 0$

مسائل

62. لتكن العبارة (1) $E(x) = \frac{3x^2 + 5x + 2}{x^2 - 4}$

1. ما هي القيم الممنوعة للعبارة $E(x)$?
 2. تحقق من صحة الكتابات المختلفة الآتية للعبارة $E(x)$:

(2) $E(x) = \frac{(x+1)(3x+2)}{x^2 - 4}$

(3) $E(x) = 3 + \frac{5x+14}{x^2 - 4}$

(4) $E(x) = \frac{3x}{x-2} - \frac{1}{x+2}$

. 73 دالتان معروفتان على R بالشكل:

$$g(x) = 2x + 1 \quad f(x) = x^2 - 2x + 1$$

1. ارسم باستعمال الحاسبة البيانية المنحنيين الممئلين للدالتين f ، g .


(اختر نافذة ملائمة لمشاهدة النقاط المشتركة الممكنة للمنحنيين).

$$f(x) = g(x) \text{ (بيانيا)}$$

$$f(x) = g(x) \text{ (جبريا)}$$

$$f(x) \leq g(x) \text{ (جبريا)}$$


. 74. مسح له الشكل الآتي:



- قاعدة مربعة ضلعها $4m$.
 - سطح علوي مستطيل طوله $4x$.
 - عمق h حيث $x \leq h \leq 2x$.
 - (1) احسب حجم المسبح بدلالة x .
 - (2) إذا علمت أن صاحبها لا يريد أن يدفع أكثر من 481,6 دينارا (مخلصة من الرسوم) لملء المسبح، ما هو حجو الماء الممكن؟
 - (3) تحقق من أن:
- $$(6x+14)(4x-8) = 24x^2 + 8x - 112$$
- (4) استنتج عندئذ قيم x الموافقة لرغبة صاحب المسبح.

. 69. مثلث قائم في A حيث


$$\hat{A}\hat{B}C = 30^\circ$$



عَيْن x حتَّى يكون

$$CA = 3,5 \text{ cm}$$

. 70. وضع سُلمان بين حائطين شاقولييين كما في الشكل.



طول السلم الأول $6,25 \text{ m}$ ، طول الثاني $7,25 \text{ m}$. عَيْن بعد نقطة (تقاطع) السلمين عن الأرض.

. 71. سعر حلويات 20 د.ج نضع x عدد الحلويات المباعة في اليوم.

($C(x)$) كلفة التصنيع اليومية حيث

$$C(x) = -x^2 + 50x$$

1. عبر بدلالة x عن حصيلة ($R(x)$) .


2. إذا علمت أن الفائدة ($B(x)$) تتحقق:

$$B(x) = R(x) - C(x)$$

$$B(x) = x(x - 30)$$

3. ما هو عدد الحلويات التي ينبغي بيعها حتى يتحقق البائع ربحا؟

. 72. (الشكل) دائتان لهما نفس المركز (C' ، C) (دائتان لهما نفس المركز



عَيْن قيمة x التي من أجلها تكون مساحة الإكليل الملون 100 m^2

الإحصاء

الكلمات المستهدفة

- التمييز بين الميزتين الإحصائيتين المقطعة والمستمرة
- تأثير سلسلة إحصائية بواسطة مؤشر موقع خواص الوسط الحسابي واستعمالها
- إنشاء تمثيلات بيانية لسلسلة ذات ميزة منفصلة أو مستمرة
- محاكاة تجربة
- تذبذب عينات
- استقرار التواترات

الإحصاء علم حديث يهتم بدراسة الظواهر التي لا تخضع لقوانين تحكم فيها علاقات دالية كعلاقة السرعة بالمسافة المقطوعة. ظاهرة اجتماعية كنسبة المواليد المعوقين سنوياً بسبب إشعاع نووي مثلاً،



أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي عاش بين 801 - 873 مـ درس في البصرة وبرز في الفلسفة، قام بترجمة العديد من مؤلفات أرسطو وغيرها من فلاسفة اليونان.


لا تخضع لقانون دالي ونفس الشيء يمكن قوله عن الظواهر الاقتصادية. ورغم حداثة هذا العلم إلا أننا نجد عند الأولين بعض الاستخدامات البدائية لكثير من المفاهيم التي بلورها هذا العلم قصد سد حاجاتهم العملية في حياتهم اليومية، كإحصاء المحاصيل الزراعية والمداخيل الضريبية. ويبدو أن اشتغال الكندي (801- 873مـ) بفكك الرسائل المشفرة كان الباب الذي أدى به إلى استخدام مفهوم تكرار ظهور مشاهدة معينة، الذي يعرف حالياً بتكرار قيمة في سلسلة إحصائية، كما وظف فكرة تذبذب العينات واستقرارها في صورة أولية عندما أعطى طريقته في تفكيك رسالة مشفرة يعتمد فيها على تسجيل تكرار كل رمز من الرموز التي كتب بها نص هذه الرسالة، وبعد معرفة اللغة التي كتبت بها، يؤخذ نص لغوي مقتول من نفس اللغة يقارب في حجمه حجم النص المشفر ويُحسب فيه تكرار كل حرف، وبعد ذلك تقوم بتعويض الرمز ذو أكبر تكرار في الرسالة المشفرة بالحرف ذو أكبر تكرار في النص المقتول ونعطي الرمز ذو الرتبة الثانية في الترتيب التنازلي للتكرار بالحرف ذو الرتبة الثانية في نفس الترتيب التنازلي وهكذا بالنسبة إلى بقية الرموز إلى أن نأتي على آخر رمز فتجده يقابل آخر حرف وبهذا تنتهي عملية فك الرسالة المشفرة.

أنشطة

نشاط 1: التوزيعات التكرارية (1)

البيان المقابل يعبر عن (توزيع علامات اختبار مادة الرياضيات لتلميذ قسم (العلامة على عشرة). (يسمى هذا البيان **مخطط بالأعمدة**).).

(1) أتم، حسب هذا البيان، سلسلة علامات التلاميذ:
 $1; 2; 2; 2; 3; 3; 3; 3; 3; \dots$



(2) أتم الجدول الآتي:

العلامات	2	3	5	7	8	9
عدد التلاميذ						

"عدد التلاميذ الذين تحصلوا على العلامة n يسمى تكرار العلامة n ".

(3) احسب عدد تلاميذ هذا القسم.

ما هي النسبة المئوية للتلاميذ الذين تحصلوا على العلامة 3؟ "تسمى هذه النسبة توافر العلامة 3"

العلامة n	2	3	5	7	8	9
عدد التلاميذ الذين تحصلوا على علامة أصغر أو تساوي n						
عدد التلاميذ الذين تحصلوا على علامة أكبر أو تساوي n						

الجدول (ج)

(4) ما هي العلامة التي تكررت أكثر؟

(5) ما هو معدل القسم؟

(6) إذا رتبنا هذه العلامات ترتيبا تصاعديا، فما هي العلامة التي تتصدّفها؟

(7) أتم الجدول (ج) المقابل:

نشاط 2: التوزيعات التكرارية (2)

البيان الآتي يعبر عن المدة المستغرقة للمكالمات الهاتفية لكل عمال مؤسسة في فترة معينة. (هذا البيان يسمى **مدرج تكراري**)

المدد موزعة بين 1 ثانية إلى 231 ثانية

(الفرق 1-231 أي 230 أي يسمى المدى)

نقسم مجموعة المدد إلى مجالات طول كل واحد

هو 30 ثانية (كل مجال يسمى فئة)

الفئات هي عندئذ $[1, 31], [31, 61], [61, 91], \dots$


من أجل كل فئة a, b لدينا n عامل.

مساحات المستطيلات متناسبة على الترتيب مع الأعداد n .

(1) احسب عدد عمال المؤسسة ثم النسبة المئوية لكل فئة بالنسبة إلى هذا العدد.

(2) ما هو عدد العمال الذين تكلموا 91 ثانية على الأقل؟

(3) ما هو عدد العمال الذين تكلموا 91 ثانية على الأكثر؟




نشاط 3: قراءة مخطط دائري

المخطط الآتي يعبر عن توزيع أعمار 360 عامل.


(1) ما هو عدد العمال الذين تتراوح أعمارهم من 20 إلى 30 سنة؟

(2) ما هو عدد العمال الذين لا تزيد أعمارهم عن 50 سنة؟



نشاط 4: خواص الوسط الحسابي

قسم مختلط يتكون من 20 ولدا و 8 بنات. المعدل في استجواب مادة العلوم الطبيعية كان 5 بالنسبة إلى الأولاد و 8,5 بالنسبة إلى البنات (العلامات على 10). ما هو معدل القسم؟



نشاط 5: حساب الوسط الحسابي انطلاقاً من التواترات

مضلع التواترات المقابل يبيّن توزيع علامات تلاميذ قسم نهائي.

- (1) احسب معدل هذا القسم.
- (2) هل يمكنك استنتاج التكرارات؟ اشرح.

نشاط 6: تدبّب العينات

يحتوي كيس على قريصه حمراء، وقرصتين بيضاوين، وقرصتين خضراء. لا يمكن التمييز فيما بينها باللمس.

لون القرصة	أحمر	أبيض	أخضر
النكرار			
التوتر			

$$\frac{n_i}{N}$$

نسحب عشوائياً قريصه واحدة. ونسجل لونها ثم نعيدها داخل الكيس. ونعيده السحب من جديد. نكرر عملية السحب هذه N مرّة. (نقول إننا أجزنا سحباً مع الإعادة).

- (1) أجز 30 سحباً وأملأ الجدول المقابل. قارن نتائجك مع نتائج زملائك. ماذا تلاحظ؟
- (2) اجمع نتائج 8 تلاميذ وأملأ جدول السؤال الأول بهذه المعطيات الجديدة. ماذا تلاحظ؟
- (3) اجمع نتائج كلّ زملائك وأملأ جدول السؤال الأول بهذه المعطيات الجديدة. ماذا تلاحظ؟
- (4) ارسم على نفس الشكل، مضلعات التواترات للسلسلتين المتعلقتين بالسؤالين (2) و (3) ولسلسلة التي تحصلت عليها.

نشاط 7: المحاكاة

نريد تقدير النسبة المئوية x للذكور والنسبة المئوية y للإناث الخاصة بمواليد سنة 2004 في ولاية الجزائر. نختار لأجل ذلك 60 عائلة. نفترض أنّ ولادة ذكر لها نفس حظوظ ولادة أنثى.

لتقدير x و y ، نقترح استخدام قطعة نقية غير مزيفة (أي مصنوعة بطريقة لا ترجح ظهور وجه على حساب آخر) برميها ونصلح على أنّ الوجه F للقطعة يمثل "أنثى" و الظهر P يمثل "ذكر".

- (1) ما هي قيم x و y التي تتوقعها؟
- (2) أجز تجربة رمي القطعة نقية 60 مرّة وسجل تكراري كلّ من F و P ، ثم أحسب تواتري كلّ منها.

(3) اجمع نتائج 5 تلاميذ، ثم نتائج 10 تلاميذ، ثم نتائج كلّ التلاميذ، وأتمم الجدول المقابل: (يعطى كلّ تواتر بنسبة مئوية).

الوجه	الوجه	الوجه	الوجه	الوجه	الوجه	الوجه	الوجه	الوجه	الوجه
الوجه	الوجه	الوجه	الوجه	الوجه	الوجه	الوجه	الوجه	الوجه	الوجه
للميذ معين	5	10	كل تلاميذ القسم						

- (4) قارن هذه النتائج بما توقعته في السؤال (1)، ماذا تلاحظ؟

الدرس

١. مفردات الإحصاء

• تمهد

عندما نهتم بدراسة ظاهرة ما، مثلاً عدد الإخوة والأخوات لتلاميذ المستوى النهائي في ثانوية ما، نقول أننا نجري دراسة إحصائية على مجتمع إحصائي هو تلاميذ المستوى النهائي لهذه الثانوية ويكون عدد الإخوة والأخوات في هذه الحالة هو الميزة الإحصائية التي تسمى أيضاً الطبع الإحصائي. نسمي عينه كل جزء من المجتمع الإحصائي، مثلاً كل قسم نهائي في هذه الثانوية هو عينة.

عندما تأخذ الميزة الإحصائية قيمها عدديّة نسمّيها ميزة كمية أو متغيراً إحصائياً.

عندما يأخذ المتغير الإحصائي قيمه معزولة كما هو الحال في عدد الإخوة 2, 1, 0، ... إلخ نقول إنّ هذا المتغير الإحصائي متقطع.

إذاً كانا نهتم بدراسة قامة كل تلميذ من هذا المجتمع الإحصائي يكون عندها المتغير الإحصائي مستمراً ويمكن حصر القوامات ضمن مجالات تدعى فئات، مثلاً [165, 170] ، [160, 165] ، ...

وبصفة عامة نسمى مركز الفئة $\frac{a+b}{2}$ و طولها العدد الموجب $b-a$.

نهتم في بعض الأحيان بدراسة ظاهرة نوعية، كلون العينين أو لون الشعر، لا يمكن التعبير عليها بعد فنقول في هذه الحالة أنَّ الطبع الإحصائي هو طبع إحصائي نوعي.

• التوزيعات التكرارية

- تكرار قيمة للطبع الإحصائي هو عدد الأفراد الموافقة لهذه القيمة.
- توادر قيمة للطبع الإحصائي هو حاصل قسمة تكرارها على عدد أفراد المجتمع (أي التكرار الكلي).
- نسمى سلسلة إحصائية مجموعة القيم التي جمعت.

مثال : السلسلة الإحصائية الآتية تمثل علامات 30 تلميذاً.

10 15 12 17 8 7 15 8 10 10 13 17 10 7 17
12 13 7 13 15 8 10 8 13 15 10 13 10 13 15

وهي سلسلة إحصائية طبعها كمي متقطع. تكرارها الكلي هو 30.

العلامات(قيم الطبع الإحصائي)	7	8	10	12	13	15	17
التكرارات	3	4	7	2	6	5	3
التواءرات	$\frac{3}{30}$	$\frac{4}{30}$	$\frac{7}{30}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{6}{30}$	$\frac{5}{30}$	$\frac{3}{30}$

• التوزيعات التكرارية المجمعة

- نفرض أنَّ قيم الميزة مرتبة ترتيباً تصاعدياً.
- التكرار المجمع الصاعد لقيمة (أو لفئة) هو مجموع تكرار هذه القيمة (أو الفئة) وتكرارات القيم (أو الفئات) الأصغر منها.
- التكرار المجمع النازل لقيمة (أو لفئة) هو مجموع تكرار هذه القيمة وتكرارات القيم (أو الفئات) الأكبر منها.
- التوادر المجمع الصاعد لقيمة (أو لفئة) هو مجموع توادر هذه القيمة (أو الفئة) وتواءرات القيم (أو الفئات) الأصغر منها.
- التوادر المجمع النازل لقيمة (أو لفئة) هو مجموع توادر هذه القيمة (أو الفئة) وتواءرات القيم (أو الفئات) الأكبر منها.

لدينا سلسلة إحصائية تتعلق بأطوال وديان بالكيلومتر. (طبع الإحصائي هنا مستمر).

الأطوال	[80,100[[100,120[[120,140[[140,160[
التكرار	12	10	12	6
التكرار المجمع الصاعد	12	22	34	40
التكرار المجمع النازل	40	28	18	6
التواء	$\frac{12}{40}$	$\frac{10}{40}$	$\frac{12}{40}$	$\frac{6}{40}$
التواء المجمع الصاعد	$\frac{12}{40}$	$\frac{22}{40}$	$\frac{34}{40}$	1
التواء المجمع النازل	1	$\frac{28}{40}$	$\frac{18}{40}$	$\frac{6}{40}$

2. مؤشرات سلسلة إحصائية

• المنوال – الفئة المنوالية

تعريف 1

- نسمى منوالاً لسلسلة ذات متغير إحصائي متقطع، كل قيمة موافقة لأكبر تكرار ونرمز له Mod .
- نسمى فئة منوالية لسلسلة ذات متغير إحصائي مستمر، كل فئة موافقة لأكبر تكرار.

مثال : السلسلة الآتية لها منوالان : 10 و 12.

القيم (علامات التلاميذ)	7	10	12	13	15
التكرار (عدد التلاميذ)	5	8	8	7	2

• الوسيط

تعريف 2

لتكن سلسلة إحصائية ذات متغير متقطع قيمه مرتبة ترتيبا تصاعديا أو تنازليا، وتكرارها الكلي N . نسمى الوسيط لهذه السلسلة العدد الذي نرمز له بالرمز Med ، والمعرف كالتالي:

- إذا كان N فرديا أي $Med : N=2p+1$ يكون القيمة التي رتبتها $p+1$.
- إذا كان N زوجيا أي $Med : N=2p$ يكون نصف مجموع القيمتين اللتين رتبتاهم p و $p+1$.

مثال : للسلسلتين $3,3,7,8,9$ و $4,5,6,8,18,20$ نفس الوسيط $Med = 7$:

خاصية

الوسيط يجزئ سلسلة إحصائية مرتبة ترتيبا تصاعديا أو ترتيبا تنازليا إلى جزئين لهما نفس التكرار.

ملاحظة: الوسيط لا يتأثر بالقيم الشاذة ، مثلا : للسلسلتين 7،7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 12 ، 13 و 1 ، 8 ، 9 ، 11 ، 18 ، 20 نفس الوسيط 9 .

• الوسط الحسابي

تعريف 3

الوسط الحسابي للقيم $x_1, x_2, x_3, \dots, x_k$ التي تكرار انها هي ، على الترتيب ،

$$\bar{x} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + n_3 x_3 + \dots + n_k x_k}{n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_k}$$

هو العدد \bar{x} حيث

مثال: الوسط الحسابي للسلسلة 4,5,6,8,18,19 هو 10 .

ملاحظة : الوسط الحسابي يتأثر بالقيم الشاذة ، مثلا الوسط الحسابي للسلسلة 15،14،12،10 هو 12,75 والوسط الحسابي للسلسلة 1 ، 10 ، 12 ، 14 هو 9,25 .

حول الرمز \sum

- المجموع $\sum_{i=1}^{i=k} a_i$ يكتب $a_1 + a_2 + \dots + a_k$ ونقرأ : "مجموع الأعداد a_i من 1 إلى k ."
- يمكن كتابة الوسط الحسابي \bar{x} على الشكل $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{i=k} n_i x_i}{\sum_{i=1}^{i=k} n_i}$

خواص الوسط الحسابي

خاصية 1

لتكن سلسلة إحصائية تأخذ القيم $x_1, x_2, x_3, \dots, x_k$ بالتواترات $f_1, f_2, f_3, \dots, f_k$ ، على الترتيب .

الوسط الحسابي لهذه السلسلة هو العدد \bar{x} حيث $\bar{x} = f_1 x_1 + f_2 x_2 + f_3 x_3 + \dots + f_k x_k$

برهان: نمثل السلسلة في الجدول الآتي:

x_i القيمة	x_1	x_2	x_3	x_k
n_i التكرارات	n_1	n_2	n_3	n_k
f_i التواترات	f_1	f_2	f_3	f_k

تواتر كل قيمة x_i هو f_i حيث $N = n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_k$ و بمان :

$$\bar{x} = \frac{n_1}{N} x_1 + \frac{n_2}{N} x_2 + \frac{n_3}{N} x_3 + \dots + \frac{n_k}{N} x_k \quad \text{فإن} \quad \bar{x} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + n_3 x_3 + \dots + n_k x_k}{N}$$

$$\bar{x} = f_1 x_1 + f_2 x_2 + f_3 x_3 + \dots + f_k x_k \quad \text{أي}$$

مثال

50% من تلاميذ قسم تحصلوا على العلامة 12 و 30% تحصلوا على العلامة 10 و 20% تحصلوا على العلامة 13 . ما هو معدّل هذا القسم ؟

لدينا	القيم (العلامات)	10	12	13
	التوأرات	0,3	0,5	0,2

$$\bar{x} = 0,3 \times 10 + 0,5 \times 12 + 0,2 \times 13 = 11,6$$

خاصية 2

- عندما نضيف نفس العدد a لكل قيمة من قيم الطبع الإحصائي: يزداد الوسط الحسابي بالمقدار a أي $\bar{x} + a = \bar{x} + a$.
- عندما نضرب في نفس العدد a كل قيمة من قيم الطبع الإحصائي : الوسط الحسابي يضرب في العدد a أي $\bar{x} \times a = a \times \bar{x}$.

مثال: معدّل علامات تلاميذ قسم هو 9. عندما نضيف نقطتين لكل علامة، يصبح معدّل هذا القسم 11 . وعندما نضرب كل علامة في 2 يصير المعدّل 18.

المدى تعريف 4

مدى سلسلة إحصائية هو الفرق بين أكبر قيمة للمتغير الإحصائي وأصغر قيمة له.

مثال : علامات عمر هي : 5، 11، 17 و علامات أحمد هي : 9، 10، 14 .
مدى علامات عمر : 17-5 أي 12 ؛ مدى علامات أحمد : 14-9 أي 5
لللميذين نفس المعدل، ولكن علامات عمر أكثر "تشتت" بالنسبة إلى علامات أحمد.

ملاحظة: يسمى كل من المنوال والوسيط والوسط الحسابي **مؤشرات الموضع**، بينما يسمى المدى **مؤشر التشتت**.

3. التمثيلات البيانية


رغم ما توفره الجداول الإحصائية من معلومات عن الظاهره محل الدراسة إلا أنها لا تزورنا بسرعة بفكرة واضحة ومحضرة وشاملة عن هذه الظاهرة، لذلك غالبا ما نلجأ إلى تمثيل هذه الجداول تمثيلا بيانيا.

التمثيلات البيانية التي نستعملها عادة هي: المخطط بالأعمدة، المدرج التكراري، المخطط الدائري، مضلع التكرارات، مضلع التواترات.

مثال 1: يعبر الجدول الآتي عن توزيع أعمار 12 طفلا:

الأعمار بالسنوات	8	9	10	11
التكرار	2	5	3	2


المخطط بالأعمدة المتعلق بهذه السلسلة الإحصائية هو:



مثال 2

أعمار 70 طفل موزعة كالتالي:

الأعمار بالسنوات	$[6;8[$	$[8;10[$	$[10;12[$	$[12;14[$
التكرار	10	30	10	20



المدرج التكراري المتعلق بهذه السلسلة الإحصائية هو:

ملاحظة هامة: مساحات المستطيلات (الملونة بالأحمر في الشكل) متناسبة مع التكرارات.

٤. تذبذب العينات والمحاكاة

٠ عينة إحصائية

لتكن سلسلة إحصائية تكون من نتائج تجربة أجريت n مرّة. هذه السلسلة تشكل عينة. إحصائية

مثال :

- التجربة : رمي قطعة نقدية غير مزيفة.

- النتائج الممكنة : ظهر أو وجه.

- الترميز : نرمز بالرقم 1 للوجه وبالرقم 2 للظهر.

- العينة : عندما نرمي هذه القطعة 10 مرات نحصل على عينة مقاسها 10 .

نحصل مثلاً على العينة : **2-2-2-1-2-1-1-1-1-2**.

سجلنا تواتر كل نتيجة من النتائجين وتحصلنا على الجدول الآتي:



النتيجة	1	2
التوافر	0,4	0,6

جدول توزيع التواترات

متلاً: 0,6 هو تواتر النتيجة **2** .

٠ تذبذب العينات

عندما نجز تجربة n مرّة، نحصل على عينة مقاسها n ، وعندما نعيد نفس التجربة n مرّة في نفس الظروف نجد عينة أخرى مقاسها n ليست بالضرورة مطابقة للأولى. تسمى هذه الظاهرة تذبذب

مثال :

التجربة : رمي زهر نرد غير مزيّف.
النتائج الممكنة: الوجه 1 ، الوجه 2 ، الوجه 3 ، الوجه 4 ، الوجه 5 ، الوجه 6.



الترميز : نرمز لكل وجه بعدد النقط الذي يحمله ؛ مثلاً الوجه 1 هو 6 .
رمي محمد زهر النرد 50 مرّة فتحصل على عيّنة A ، وأنجز سعيد نفس العملية بنفس النرد
فتحصل على عيّنة B .
لكل عيّنة تحصلنا على توزيع التواترات حسب الجدول الآتي:

النتيجة	1	2	3	4	5	6
A تواتر	0,12	0,18	0,12	0,14	0,18	0,26
B تواتر	0,14	0,2	0,16	0,15	0,24	0,11

نلاحظ أنَّ توزيع التواترات في العينتين ليس نفسه، أي هناك تذبذب في نتائج كلَّ من سعيد ومحمد، هذه الظاهرة تعرف بـ تذبذب العينات.

• تجربة عشوائية

عندما نرمي زهر نرد غير مزيّف ، ونهم بالرقم الظاهر على الوجه العلوي، من المؤكّد أَنَّنا لا نستطيع توقع هذه النتيجة مسبقاً؛ إنَّ هذه التجربة تسمى تجربة عشوائية .

• المحاكاة

محاكاة تجربة عشوائية يعني اختيار نموذج لهذه التجربة.

مثال:

- التجربة العشوائية: ميلاد بنت أو ولد في 10 عائلات.
- نموذج لهذه التجربة: حظوظ ميلاد بنت تساوي حظوظ ميلاد ولد.
- تنفيذ محاكاة توزيع الجنس في 10 عائلات : يمكن محاكاة هذه التجربة بعدة طرق، نقترح هنا طريقتين مأْلوفتين هما:

طريقة 1:

برمي قطعة نقدية غير مزيفة 10 مرّات حيث نرفق الوجه بالنتيجة "بنت" و الظهر بالنتيجة "ولد".

مثلاً : العيّنة وجه - ظهر - وجه - ظهر - وجه - وجه - ظهر - ظهر تعبّر عن 6 بنات و 4 أولاد في العائلات العشرة. (يمكن ان نرمز F لـ وجه و P لـ ظهر).

طريقة 2:

برمي زهر نرد غير مزيّف 10 مرّات. نرفق الوجه 2 ، 4 ، 6 بالنتيجة "بنت" و الوجه 1 ، 3 ، 5 بالنتيجة "ولد".

مثلاً: العيّنة 2-4-2-6-5-1-3-1-4-2 تعبّر عن 4 بنات و 6 أولاد في العائلات العشرة.

ملاحظات:

- السند المادي في الطريقة الأولى هو قطعة نقدية غير مزيفة.
- السند المادي في الطريقة الثانية هو زهر نرد غير مزيّف.

• إذا كررنا الخبر ٢٠ مرات، ويمكن انطلاقاً منها تقدير نواتر المواليد حبيب الجنس.

• التمثيلات البيانية •

١. إنشاء المخطط بالأعمدة، ومضلع التكرارات، ومضلع التواترات.
السلسلة الآتية تعبر على علامات 20 تلميذاً.

10	16	8	12	10	8	12	12	16	14
10	10	14	10	8	12	8	12	10	16

مثل هذه السلسلة بمخطط بالأعمدة، ثم أنشئ مضلع التكرارات، ومضلع التواترات.

حل


تعليق

- نلخص السلسلة في جدول الآتي:

القيمة(العلامات)	8	10	12	14	16
التكرارات(عدد التلاميذ)	4	6	5	2	3
التوترات	0,2	0,3	0,25	0,1	0,15


- لاحظ أنَّ قيم المتغير أعطيت على شكل خام، ولا بد من ترتيبها لتسهيل استغلالها.

- لنشئ المخطط بالأعمدة (باللون الأسود) ومخطط التكرارات (باللون الأحمر)



- نستعمل المخطط بالأعمدة في حالة طبع إحصائي متقطع. أطوال الأعمدة متناسبة مع التكرارات (و مع التواترات) في كلِّ من المخططين.

- لنشئ المخطط بالأعمدة (باللون الأسود) ومخطط التواترات (باللون الأحمر)



طريقة

- 1) نسجل القيم x_i على محور الفواصل و التكرارات n_i (التوترات f_i) على محور التراطيب و نعتبر النقط $M_i(x_i, n_i)$ و $A_i(x_i, 0)$ و $N_i(x_i, f_i)$.
- 2) نوصل النقطة M_i بالنقطة A_i (النقطة N_i بالنقطة A_i) فنحصل على الأعمدة. الخط المنكسر الذي يصل بين الرؤوس M_i للأعمدة (الرؤوس N_i للأعمدة) يدعى مضلع التكرارات (مضلع التواترات).

2. إنشاء مخطط دائري

الجدول الآتي يبين عدد السيارات المسجلة في الجزائر (إلى 31/12/2002).
 (المصدر : الديوان الوطني للإحصائيات).

الأنواع الأخرى	الشاحنات	السيارات السياحية
938400	300171	1739286

مثل هذه السلسلة بمخطط دائري.


حل

- التكرار الكلي هو: $N = 1739286 + 300171 + 938400 = 2977857$
- قيس الزاوية الموفق للسيارات السياحية: $360 \times \frac{1739286}{2977857} \approx 210^\circ$
- قيس الزاوية الموفق للشاحنات: $360 \times \frac{300171}{2977857} \approx 36^\circ$
- قيس الزاوية الموفق لأنواع أخرى: $360 \times \frac{938400}{2977857} \approx 114^\circ$

تعاليق

أقياس الزوايا
متتناسبة مع
التكرارات (ومع
التوترات).

إنشاء المخطط الدائري:



طريقة

N هو التكرار الكلي، و f_i تكرار فئة (أو قيمة)؛ نمثل هذه الفئة (أو القيمة) بالقطاع الزاوي الذي قيس زاويته α حيث $\alpha = 360 \times f_i / N$ أي $\alpha = 360 \times \frac{n_i}{N}$

3. إنشاء مدرج التكرارات في حالة طبع إحصائي مستمر (الفئات متساوية الطول)


أجرت دراسة على 100 مصابح لمعرفة مدة صلاحيتها وسجلت النتائج في الجدول الآتي:

مدة الصلاحية بالساعات	عدد المصابيح
[300;400]	15
[400;500]	35
[500;600]	30
[600;700]	20

أنشئ المدرج التكراري لهذه السلسلة.

حل

نستعمل دائماً المدرج التكراري عندما يتعلق الأمر بقيم مصنفة في فئات.



مساحة كل مستطيل
متتناسبة مع تكرار
الفئة الممثلة لها

طريقة

نمثل تكرار كل فئة بمستطيل، بعدها هما مدي الفئة وتكرارها.

4. إنشاء مدرج التكرارات في حالة طبع إحصائي مستمر (الفئات مختلفة الطول)

أجريت دراسة على 100 مصباح لمعرفة مدة صلاحيتها وسجلت النتائج في الجدول الآتي:

مدة الصلاحية بالساعات	[200;300[[300;400[[400;700[[700;900[
عدد المصابيح	5	30	45	20

أنشئ المدرج التكراري لهذه السلسلة.

حل

أصغر طول هو : $a = 100$.


طول الفئة $[400;700]$ هو $300 = k_3 a$ أي $k_3 = 3$.

طول الفئة $[700;900]$ هو $200 = k_4 a$ أي $k_4 = 2$.

تعليق
هذا: عندما يتعلق الأمر بسلسلة طبعها مستمرة، مبوّبة في فئات مختلفة الطول، فإن إنشاء مدرجها التكراري لا يتم بنفس الطريقة التي تكون فيها الفئات متساوية الطول.

الفئات	[200;300[[300;400[[400;700[[700;900[
أطوال الفئات	100	100	300	200
n_i	5	30	45	20
k_i	1	1	3	2
$\frac{n_i}{k_i}$	5	30	15	10

إنشاء المدرج التكراري



طريقة

الفئات مختلفة الأطوال، تحافظ على تناوب المساحات مع التكرارات ، بالطريقة الآتية:

- نمثل الفئة التي لها أصغر طول a ، وليكن n تكرارها بمستطيل بعدها a و n .
- فيما يخص أي فئة أخرى (طولها a_i و تكرارها n_i) : نعيّن العدد الحقيقي k_i من العلاقة

$$\frac{n_i}{k_i} \cdot a_i = k_i a$$

• الوسط الحسابي

1. حساب الوسط الحسابي

الجدول الآتي يتعلّق بمقامات 20 تلميذاً بالسنتيمتر.

القمات	160	161	163	165	169	170	171
عدد التلاميذ	3	2	2	5	4	1	3

1) احسب الوسط الحسابي.

2) بوب معطيات هذا الجدول في فنات طول كل وحدة منها 4 ، واحسب عندها الوسط الحسابي.

حل تعليق

$$1) \text{الوسط الحسابي هو: } \frac{3 \times 160 + 2 \times 161 + 2 \times 163 + 5 \times 165 + 4 \times 169 + 1 \times 170 + 3 \times 171}{20} = 165,6$$

2) تبديل معطيات الجدول السابق في فنات طول كل وحدة 4.

الفنات	[160,164]	[164,168]	[168,172]
مراكز الفنات	162	166	170
عدد التلاميذ	7	5	8

الوسط الحسابي يكون:

$$\frac{162 \times 7 + 166 \times 5 + 170 \times 8}{20} = 166,2$$

طريقة

عندما يتعلق الأمر بطبع إحصائي مستمر ، نحسب الوسط الحسابي بتعويض كل فناء $[a,b]$ بمركزها

$$\cdot \frac{a+b}{2}$$

2. استعمال خواص الوسط الحسابي

احسب الوسط الحسابي \bar{x} للأعداد : 98764,6؛ 98764,1؛ 98764,2؛ 98764,5.

حل تعليق

لالأعداد المعطاة نفس الجزء الصحيح . نحسب الوسط الحسابي للسلسلة $0,6 ; 0,5 ; 0,4 ; 0,3 ; 0,2 ; 0,1$ أي $\frac{1,4}{4}$ ونجد $0,35$ إذن \bar{x} هو $0,35$.

نجد هنا الوسط الحسابي

ذهنيا .

طريقة

الوسط الحسابي يزداد بالعدد a عندما نضيف a لكل قيمة من قيم السلسلة الإحصائية.

3. حساب الوسط الحسابي لسلسلة انطلاقاً من أوساط حسابية جزئية.

يتكون قسم من 15 تلميذاً و 10 تلميذات، متوسط التلاميذ 12,5 ومتوسط التلميذات 11,3 . ما هو متوسط القسم؟

حل تعليق

$$\text{متوسط القسم هو: } \frac{15 \times 12,5 + 10 \times 11,3}{25} = 12,02$$

يمكن تعليم هذه الطريقة إلى عدة أجزاء للسلسلة

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n N_i \times \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^n N_i}$$

طريقة

لحساب الوسط الحسابي \bar{x} لسلسة، تكرارها الكلية N ، انطلاقاً من وسطين حسابيين جزئيين لها \bar{x}_1 و \bar{x}_2 ،

$$\bar{x} = \frac{N_1 \times \bar{x}_1 + N_2 \times \bar{x}_2}{N}$$

 تكراراهما N_1 ، N_2 على الترتيب ($N=N_1+N_2$)، نطبق القاعدة:

• الوسيط والمنوال

1. تعين الوسيط والمنوال في حالة طبع إحصائي متقطع

(1) عين وسيط السلسلة $10,3,8,6,6,7,4,5$ ثم منوالها.

(2) عين وسيط السلسلة $9,7,5,2,5,4,3,4,7,8,7,5,2$ ثم منوالها.

حل

(1)- التكرار الكلي هو 9 (عدد فردي) أي $4+1 \times 2$ إذن الوسيط هو القيمة التي رتبتها $4+1$ أي 6.

- القيمان اللتان لها أكبر تكرار و هما: 6 و 4 إذن السلسلة تقبل منولين هما 4 و 6 .

(2)- نرتب السلسلة ترتيباً تصاعدياً: $3,2,4,5,7,7,8,9$.

- التكرار الكلي هو 8 (عدد زوجي) أي 4×2 .
 الوسيط هو نصف المجموع للقيمتين اللتين رتباهما $4+1$.

$$\text{أي } 6 = \frac{7+5}{2}$$

- القيمة التي لها أكبر تكرار هي 7 أي المنوال هو 7 .

تعاليل

- إذا كان التكرار الكلي زوجياً فإن الوسيط لا ينتمي إلى السلسلة .
- يجب التمييز بين قيمة ورتبتها .
- يمكن أن تقبل سلسلة أكثر من منوال واحد.

طريقة

لحساب وسيط سلسلة نرتبها أولاً ترتيباً تصاعدياً أو تنازلياً إذا لم تكن مرتبة، ثم نبحث عن القيمة الوسيطية كما ورد في تعريف الوسيط آخرین بالاعتبار شفاعة التكرار الكلي.

لحساب منوال سلسلة نبحث عن القيمة التي لها أكبر تكرار (أي القيمة السائدة).


2. تعين الوسيط في حالة طبع إحصائي مستمر باستعمال مدرج التكرارات

الجدول الآتي يتعلق بالأجور التي يتلقاها 81 عاملًا بالدينار في اليوم . عين وسيط هذه السلسلة.

(D.A) الأجر	[400;450[[450;550[[500;550[[550;600[[600;650[
عدد العمال	15	20	25	10	11

حل

المدرج التكراري الذي يمثل السلسلة الإحصائية هو :



تعاليل

- نلاحظ أن التكرار الكلي 81 أي عدد فردي مما نتج عنه تطابق الوسيط مع القيمة التي رتبتها 41 في هذه السلسلة.

• نلاحظ أن قائمة العمال مرتبة ترتيباً تصاعدياً حسب أجورهم .
 عدد العمل هو 81 و $40+1=2$ إذن رتبة الوسيط في السلسلة هي 41 .

• أجرة العامل X الذي رتبته 41 في قائمة العمال تكون حتماً في المجال $[500,550]$ لأن عدد العمال الذين يتلقاون أجرة أقل من 500 هو 35 ،


يكون الوسيط قيمة من قيم

السلسلة إذا كان
تكرارها الكلي
فرديا.

و عدد العمال الذين يتلقون أجرة أقل من $DA = 550$ هو 60 .
وبالتالي فإن الوسيط ينتمي حتما إلى المجال $[500; 550]$ الذي يُسمى
الفئة الوسيطية.

- عدد العمال الذين يتلقون أجرة أقل من الوسيط أو تساويه هو $41 = 35 + 6$.
وبالتالي فإن رتبة الوسيط هي 6 في الفئة $[500; 550]$.

لإيجاد قيمة مقربة m للوسيط يمكن توظيف خاصية طاليس كالتالي:



$$\frac{m-500}{50} = \frac{6}{25}$$

$$m = 500 + \frac{6}{25} \times 50$$

$$m = 512 \text{ أي } m = 500 + \frac{6}{25} \times 50$$

اعتمدنا في البحث
عن القيمة m
على فرض أن
الأجور موزعة
بانتظام في الفئة
 $[500, 550]$

طريقة

لحساب وسيط سلسلة طبعها مستمر.

- نعين الفئة $[a, b]$ التي تشمل الوسيط (Med) (وهي الفئة الوسيطية) .
- نعين r رتبة الوسيط (Med) في الفئة $[a, b]$.

- إذا سميّنا l طول الفئة $[a, b]$ و d تكرارها، نجد تقدير m للوسيط Med كالتالي :

$$m = a + \frac{r}{d} \times l$$

• اختيار مؤشر موقع لتلخيص سلسلة إحصائية

عين في كل وضعية من الوضعيات الآتية ،مؤشر الموقع الذي تراه مناسبا لتلخيص السلسلة .

الوضعية 1: سلسلة متعلقة بعدد العائلات التي مدخلوها الشهري أقل من $10000DA$.

الهدف هو تقديم مساعدة إلى 50 % من هذه العائلات من قبل البلدية.

الوضعية 2: سلسلة متعلقة بمقاسات الأحذية التي باعها تاجر.

الوضعية 3: سلسلة متعلقة بنتائج تلميذ في المواد الأساسية (الرياضيات معاملها 4 ، والعلوم الفيزيائية معاملها 4 ، والعلوم الطبيعية معاملها 5).

المواد	العلماء	العلوم الطبيعية	الرياضيات	العلوم الفيزيائية
العلامات	12	4	11	12

حل

- في الوضعية 1 : نختار الوسيط لأن 50 % من القيم تكون أقل من الوسيط .
- في الوضعية 2 : نختار المنوال لأن التاجر يزود دكانه حسب طلب الزبائن.
- في الوضعية 3 : نختار الوسط الحسابي للسلسلة للحصول على معدل التلميذ.

تعالق

- الوسيط لا يتأثر بالقيم الشاذة.

- الوسط الحسابي مرتبط بكل القيم فهو يتأثر بكل القيم.

طريقة

نختار المؤشر الذي يفيينا في الوضعية التي نحن بصدده التعامل معها، أي حسب الهدف من الدراسة.

• توقع بعض النتائج

- عین في كلّ وضعية من الوضعيات الآتية، القيمة التي يجب أن "يقرب" منها تواتر كلّ نتائج
- رمي قطعة نقدية عادية ،
 - رمي قطعتين نقديتين عاديتين ،
 - رمي زهر نرد عادي.

حل	تعليق
أ) للنتيجتين الممكنتين : وجه ، ظهر نفس الحظوظ .	نقصد بقطعة نقدية عادية أو زهر نرد عادي ، كلّ الوجوه لها نفس الحظوظ للظهور.
القيمة التي يجب أن يقرب منها تواتر كلّ نتائج هي $\frac{1}{2}$.	يعتبر هذا التقدير نظريا لأنّه ينطلق من اعتبارات حدسية تتوافق مع تصورنا لنتائج التجربة.
ب) لدينا 4 نتائج ممكنة لها نفس الحظوظ .	يسمح لنا هذا التقدير بإعطاء نموذج رياضي.
القيمة التي يجب أن يقرب منها تواتر كلّ نتائج هي $\frac{1}{4}$.	
ج) لدينا 6 نتائج ممكنة لها نفس الحظوظ .	
القيمة التي يجب أن يقرب منها تواتر كلّ نتائج هي $\frac{1}{6}$.	
طريقة	
▪ نعين عدد النتائج الممكنة N للتجربة .	
إذا كان لكل النتائج نفس الحظوظ للظهور فإن تواتر كلّ نتائج "يقرب" من $\frac{1}{N}$.	

• تذبذب العينات (مشاهدة تغير عينات)

نعتبر التجربة: رمي زهر نرد غير مزيّف 50 مرّة.

1) أنجز هذه التجربة 3مرّات (نجد 3عينات مقاس كلّ واحدة هو 50) وأتمم الجدول الآتي:

2) عین في كلّ عينة أكبر تواتر ، وأصغر تواتر.

3) عین في كلّ عينة الوسط الحسابي.

4) ارسم في نفس الشكل مضلع التواترات المتعلق بكلّ عينة .

النتائج الممكنة	1	2	3	4	5	6
توازنات النتائج في العينة الأولى						
توازنات النتائج في العينة الثانية						
توازنات النتائج في العينة الثالثة						


حل

(1)

النتائج الم可能存在	1	2	3	4	5	6
تواءرات النتائج في العينة الأولى	0,2	0,16	0,18	0,12	0,14	0,2
تواءرات النتائج في العينة الثانية	0,12	0,22	0,1	0,22	0,16	0,18
تواءرات النتائج في العينة الثالثة	0,18	0,2	0,1	0,18	0,22	0,12

(2 و 3)

	العينة الأولى	العينة الثانية	العينة الثالثة
أصغر تواتر	0,12	0,1	0,1
أكبر تواتر	0,2	0,22	0,22
الوسط الحسابي	3,44	3,62	3,42



تعاليق

- لاحظ : أجزنا نفس التجربة في نفس الظروف (عدة مرات) ولم نجد نفس النتائج ؛ نسمي هذه الظاهرة: **تذبذب العينات**.

شاهد على التمثلات البيانية هذا التذبذب.

- لاحظ كذلك : كل النتائج الممكنة لها نفس الحظوظ للظهور ؛ فنظريا توافر كل نتيجة هو $\frac{1}{6} \approx 0,16$ ()، غير أن التجربة أعطت خلاف ذلك في العينات الثلاث.

طريقة

- أنجز هذه التجارب بمشاركة زملائك أي كل تلميذ يلقي النرد 50 مرة ويسجل التكرارات لكل قيمة ثم يحسب التوأرات.
- يمكن استعمال الحاسبة البيانية أو مجدول.

• المحاكاة (إنجاز محاكاة)

أنجز محاكاة لتوزيع الأطفال حسب الجنس في 10 عائلات تتكون كل منها من 4 أطفال.

حل

تعاليق

- تشبيه التجربة : نشّبه ولادة طفل في عائلة بتجربة عشوائية تؤدي إلى نتيجتين ممكنتين.
 - اختيار نموذج: نعتبر أن كل ولادة تحتمل بنتاً أو ولداً، وأن حظوظ ولادة ولد تساوي حظوظ ولادة بنت.
 - اختيار السنّد المادي: نختار السنّد المادي المناسب : زهر نرد غير مزيف.
 - تحقيق التجربة : نحاكي توزيع الأطفال حسب الجنس في العائلة الواحدة عندما نلقي زهر التّرد 4 مرات متتالية، ونعتبر ظهور رقم فردي يعني ولادة ولد، وظهور
- إن اختيار السنّد المادي للتجربة مرتبط ارتباطا عضويا بالنموذج الذي ننجذب في إطار المحاكاة فمثلا: إذا اختارنا زهر نرد مزيف لا نستطيع من الناحية العقلانية استقاء شرط تساوي حظوظ

الولادة بين الولد والبنت.

رقم زوجي يعني ولادة بنت.
نكرر هذه العملية 10 مرات حتى نحاك التوزيع في كل العائلات.
كانت النتائج المتحصل عليها كما يأتي:

ترجمتها	النتائج	ترجمتها	النتائج
3 أولاد و بنت	3-3-1-4	بنتان و ولدان	5-3-6-4
4 أولاد	1-1-1-1	أولاد	1-3-3-1
ولد و 3 بنات	2-4-1-2	بنتان و ولدان	3-1-2-2
ولد و 3 بنات	4-2-1-2	بنات	2-2-2-2
3 أولاد و بنت	1-1-2-3	بنتان و ولدان	4-4-3-3

- يمكن أن يكون السند المادي المناسب لهذا النموذج هو قطعة نقية غير مزيفة.

طريقة

نختار تجربة عشوائية تؤدي إلى نتيجتين ممكنتين (تشبيه التجربة) لهما نفس الحظوظ في الظهور (اختيار نموذج)، ويمكن إنجاز هذه التجربة بزهر نرد (اختيار السند المادي)، ونكرر التجربة 4 مرات لكي نحصل على عينة مقاسها 4، ثم نكرر ذلك مع كل عائلة لتحقيق المطلوب (تحقيق التجربة).

استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال

8	12	13	19	12	8	8	10	12
12	16	10	12	17	12	10	15	9

I) استعمال المجدولات

• حجز سلسلة وحساب مؤشرات الموقع

تعبر السلسلة الآتية عن علامات 18 تلميذ

- احجز علامات هؤلاء التلاميذ في صفحة إكسال.
- احسب الوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدى.

حل

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1		السلسلة الآتية تعبر عن العلامات حتى 20 لـ 18 تتميّزا								
2	8	12	13	19	12	8	8	10	12	
3	12	16	10	12	17	12	10	15	9	
4										
5	11.94	= الوسط الحسابي								
6	12	= الوسط								
7	12	= المتوال								
8	11	= المدى								

أ) نكتب العلامات في 18 خلية انطلاقاً من أي خالية (مثلاً من الخلية A1 إلى الخلية I3) .

ب)- عندما نكتب في أي خلية (مثلاً في B5) : $= MOYENNE (A2 : I3)$

ثم ننقر على اللمسة نتحصل على الوسط الحسابي لمحتويات الخلايا من الخلية A2 إلى الخلية I3.

- عندما نكتب في أي خلية (مثلاً في B6) : $= MEDIANE (A2 : I3)$

ثم ننقر على اللمسة نتحصل على وسيط لمحتويات الخلايا من الخلية A2 إلى الخلية I3.

- عندما نكتب في أي خلية (مثلاً في B7) : $= MODE (A2 : I3)$

ثم ننقر على اللمسة فنتحصل على منوال لمحتويات الخلايا من من الخلية A2 إلى الخلية I3.

- عندما نكتب في أي خلية (مثلاً في B8) : $= MAX (A2 : I3) - MIN (A2 : I3)$

ثم ننقر على اللمسة نتحصل على مدى لمحتويات الخلايا من الخلية A2 إلى الخلية I3.

ملاحظة: عندما نغير بعض العلامات تتغير المؤشرات تلقائياً.

تعالق

- يمكن الانتقال من خانة إلى آخرة باستعمال اللمسات



- يمكن الحصول على الوسط الحسابي أو الوسيط أو المنوال أو المدى باستعمال



مثلًا نتحصل على الوسيط كالتالي:




نقر على



ثم على

ونختار MEDIANE في النافذة :



- كتابة المساواة في دستور داخل خلية في ورقة إكسال

(أي ورقة حساب أوتوماتيكية)

- الدستور الذي يحجز ليس علاقة رياضية مثل :

$$= MODE(A2:I3)$$

طريقة

نجز السلسلة باستعمال لمسات الملمس، ونتنقل من خلية إلى آخرة بالفأرة.

لحساب الوسط الحسابي أو الوسيط أو المنوال أو المدى لقيم مسجلة في الخلايا: من الخلية A_i إلى الخلية A_j نستعمل، على الترتيب،

$$= MEDIANE (A_i : A_j) \quad \text{أو} \quad = MOYENNE (A_i : A_j)$$

$$= MAX (A_i : A_j) - MIN (A_i : A_j) \quad \text{أو} \quad = MODE (A_i : A_j)$$

• استعمال التوزيعات التكرارية

استعمل المثال السابق (توزيع علامات 18 تلميد) لحساب عدد التلاميذ الذين تحصلوا على العلامة 10 وعدد التلاميذ الذين تحصلوا على علامة أكبر من 10 أو تساويها.

حل	تعليق
<ul style="list-style-type: none"> عدد التلاميذ الذين تحصلوا على العلامة 10 هو تكرار العلامة 10، ولحسابه نحجز في إحدى الخلايا (هنا B5) الطلبية: $=NB.SI(A2:I3;"10")$ ثم ننقر على اللمسة فتظهر النتيجة في الخلية B5 (التكرار هو 3). 	عندما نحجز الطلبية نراعي الكتابة الدقيقة لها وبالخصوص عدم نسيان رمز المساواة (=) في بداية الحجز.
<ul style="list-style-type: none"> عدد التلاميذ الذين تحصلوا على علامة 10 هو المجموع التّازل للعلامة 10، ولحسابه نحجز في إحدى الخلايا (هنا حجزنا في B5) الطلبية: $=NB.SI(A2:I3;">=10")$ ثم ننقر على اللمسة فتظهر النتيجة في الخلية B5 (التكرار المجموع التّازل هو 14). =10"). The result is 14, which is highlighted in a yellow box." data-bbox="135 515 665 645"/>	ملاحظة : تعني الطلبية (>=10) = NB.SI(A2:I3;">=10") إظهار تكرار العدد 10 في مجموعة الخلايا من A2 إلى I3.

طريقة
نستعمل الطلبية $NB.SI$ لتعيين عدد الخلايا غير الفارغة المحققة للشرط الذي نكتبه بين المزدوجتين " ".

• استعمال مؤشرات منطقية

احجز معدلات تلاميذ واستخرج : "راسب" أو "ناجح" أمام كل معدل علمًا أن شرط الناجح هو الحصول على معدل أكبر من 10 أو يساوي 10 ، على الشكل الآتي:

قائمة التلاميذ	المعدلات	الملحوظات
التلميذ 1	15,82	ناجح
التلميذ 2	9,99	راسب

.	.	.
.	.	.
.	.	.

حل

- نحجز قائمة التلاميذ في العمود A ومعدلاتهم في العمود B .
- نحجز في الخلية C2 الطلبية: $=SI(B2>=10;"ناجح";"راسب")$
- نتقر على التمسة فيظهر في الخلية C2 العبارة "ناجح":

C2	A	B	C
			الملحوظات
1	قائمة التلاميذ	المعدلات	
2	التلميذ 1	15,82	ناجح
3	التلميذ 2	9,99	
4	التلميذ 3	10,56	

- نحدّد الخلية C2 ، ونعمّم محتوى الخلية C2 إلى الخلية Cn الموافقة للمعنى الأخير في قائمة التلاميذ، فنتحصل على الشاشة :

C2	A	B	C	D
			الملحوظات	
1	قائمة التلاميذ	المعدلات		
2	التلميذ 1	15,82	ناجح	
3	التلميذ 2	9,99	راسب	
4	التلميذ 3	10,56	ناجح	
5	التلميذ 4	11,52	ناجح	

تعاليل

نفس الطلبية :
 $=SI(B2>=10;"ناجح";"راسب")$

كالآتي :
إذا كان محتوى الخلية B2 أكبر أو
يساوي 10 أعرض "ناجح" و إلا
"راسب".

اصطلاح:

نسمي تعليم محتوى الخلية AI إلى الخلية AJ عملية وضع الزالق على الزاوية السفلى على اليمين للخلية AI فيتحول إلى رمز + ثم الضغط على الزر الأيسر للفأرة مع السحب حتى الخلية AJ .

طريقة

نحجز أسماء كل التلاميذ ومعدل كل تلميذ في عمودين (A و B مثلا) . يقابل إسم كل تلميذ معدله على نفس السطر .

نحجز في خلية تقع على نفس السطر الذي بدأنا فيه حجز قائمة أسماء التلاميذ ومعدلاتهم (هنا في الخلية C2) الطلبية $=SI("راسب";"ناجح"; الشرط)$ ثم نعمّم محتوى الخلية C2 إلى الخلية Cn.

• التمثيلات البيانية

يعطى توزيع تلاميذ ثانوية حسب المستويات:
160 تلميذ في السنة الأولى، 120 تلميذ في السنة الثانية، 140 تلميذ في السنة الثالثة .
مثل هذه السلسلة بيانيًا (المخطط الدائري والمخطط بالأعمدة) باستعمال مجدول .

حل

B	C	D
السنة الأولى		
160	120	140

نحو السلسلة :

- نحدّد بالفأرة كل الخلايا التي تحتوي على القيم :

160	120	140
-----	-----	-----

عندما نقر على **Terminer** ثم على  نحصل على المخطط بالأعمدة.


عندما نقر على **Terminer** ثم على  نحصل على المخطط الدائري.



تعاليق

يمكن اختيار مخططات أخرى كما يلي:

نقر على 

ثم على 


ونختار 

مخططا من بين :



طريقة

نحو السلسلة ثم نحدّد بالفأرة كل الخانات التي تحتوي على القيم .

ننقر على  ونختار مخططا من بين المخططات الآتية :



- نتبع التعليمات التي تظهر على النافذة إلى أن نصل إلى النهاية (TERMINER)

• **توليد أعداد عشوائية**

ملاحظة: إن النتائج المعطاة في الأمثلة الموالية ليست هي بالضرورة التي ستظهر عندما نقوم بتوليد أعداد عشوائية، فالعشوائية بالنسبة لنا تلعب دورها هنا.

ALEA • استعمال

اعرض على الشاشة أعداداً عشوائية باستعمال الطلبية $=ALEA()$

حل	تعليق
<p>نحو في الخلية A2 $=ALEA()$ وعندما نقر على الممسة يظهر في هذه الخلية عدد عشوائي (وهو عدد ينتمي إلى المجال $[1; 0]$). نجد 99 عدداً عشوائياً بتعتميم محتوى الخلية A2 إلى الخلية A100 يمكن كذلك الحصول على عدد عشوائي كما يلي:</p>	<p>يمكن أن نحجز $=ALEA()$ في أي خانة أخرى.</p>

طريقة	نستعمل الطلبية $=ALEA()$ لعرض عدد عشوائي من المجال $[1; 0]$.
-------	---

ENT و ALEA • استعمال

- 1) ما معنى $ENT(x)$? احسب $ENT(3,14)+2$.
- 2) ما هو العدد الذي يظهر في خلية عندما نحجز فيها $=ALEA()$ ونقر على الممسة ؟
- 3) نفس السؤال السابق من أجل $(ENT(ALEA())*4+1)$.

حل	تعليق
<p>(1) $ENT(x)$ يمثل الجزء الصحيح للعدد الحقيقي x. $ENT(3,14)+2 = 3+2 = 5$.</p>	<p>استعمال الطلبية $ENT(ALEA()*\beta+\alpha)$ يعطي الأعداد الطبيعية التي تنتمي إلى المجال $[\alpha, \beta + \alpha]$</p>
<p>(2) $ALEA()$ يمثل عدداً عشوائياً y حيث $0 \leq y < 1$. أي $ALEA()^*4$ يمثل العدد $4y$ حيث $0 \leq 4y < 4$. ومنه يظهر في الخلية عدد عشوائي ينتمي إلى $[0; 4]$.</p>	
<p>(3) $ENT(ALEA()^*4)$ هو الجزء الصحيح للعدد $ALEA()^*4$ ، وبالتالي يظهر في الخلية أحد الأعداد: 0 أو 1 أو 2 أو 3 $ENT(ALEA()^*4+1)$ يمثل عدداً عشوائياً ينتمي إلى $[1; 5]$ ، جزءه الصحيح هو $ENT(ALEA()^*4+1)$ وبالتالي يظهر في الخلية أحد الأعداد: 1 أو 2 أو 3 أو 4 .</p>	

طريقة	يمكن عرض عدد طبيعي (عشوائي) ينتمي إلى $[1; N]$ باستعمال $ENT(ALEA()^*N+1)$
-------	--

• محاكاة تجريبية بواسطة الطلبتين ENT و ALEA

ملاحظة: إن النتائج المعطاة في الأمثلة الموالية ليست هي بالضرورة التي ستظهر عندما نقوم بتوليد أعداد عشوائية، فالعشوائية بالنسبة لنا تلعب دوراً هنا.

مثال 1: أجز محاكاة رمي نرد غير مزيّف 100 مرّة، باستعمال الطلبتين ENT و ALEA .

تعاليق
▪ لنتذكر أن كل النتائج لها نفس الحظوظ للظهور.
▪ يستحسن أن نعمم محتوى الخلية إلى الخلية A10، ثم نعمم من العمود A إلى العمود J.
▪ في الشكل(1) استعملنا 100 سطراً وعمود واحد، بينما في الشكل(2) استعملنا 10 أسطر و10 أعمدة.

A14	B	C
1	3	
2	1	
3	3	
4	5	
5	5	
6	3	
7	3	
8	2	
9	3	
10	1	

الشكل (1)

J10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	6	6	5	4	6	3	4	1	5	5
2	2	5	1	6	2	1	2	6	2	4
3	3	5	1	6	6	4	6	3	2	5
4	1	2	3	6	6	5	2	3	4	6
5	5	5	5	1	1	1	3	6	6	1
6	4	6	4	3	2	1	4	4	2	2
7	4	2	4	6	1	5	4	2	3	5
8	4	5	1	6	2	4	4	5	2	2
9	2	3	6	1	3	6	4	6	6	2
10	3	4	1	2	4	6	4	6	1	5

الشكل (2)

طريقة نستعمل الظليبيتين **ALEA** و **ENT** بهذا الترتيب لعرض أعداد طبيعية بصفة عشوائية.

مثال 2: يحتوي كيس على 26 قريصه مرقمة من 1 إلى 26. القرصيات لا تظهر ولا يمكن التمييز بينها باللمس. نسحب من الكيس قريصه ونسجل الرقم الذي تحمله، ثم نعيدها الكيس. نكرر هذه العملية 1000 مرة. أنجز محاكاً لهذه التجربة باستعمال مجدول إكسيل.

حل	تعاليق
▪ تمثل كل نتيجة برقم القرصية التي تظهر عند إجراء السحب، فالنتائج الممكنة إذن هي: 1, 2, 3, 4, ..., 26.	لاحظ انه عندما نستعمل مجدول نستطيع إجراء محاكاً لتجربة بواسطة عينة مقاسها كبير نسبياً، و يحدث هذا بسرعة وبأقل تكالفة مقارنة مع استعمال وسائل أخرى.
▪ نكتب في الخلية A1: $=ENT(ALEA()*26+1)$ ثم نقر على المسة Enter فتظهر في A1 إحدى النتائج الممكنة.	
▪ نحدد الخلية A1 ونعلم محتوى الخلية A1 إلى الخلية J1 (نحصل على 10 قيم)، ثم نعمم من السطر 1 إلى السطر 100 فنحصل على عينة مقاسها 1000.	

A1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	3	1	7	14	20	8	3	7	2	9
2	26	15	23	14	9	22	8	23	26	12
3	20	22	1	7	24	10	10	16	17	19
4	26	4	7	20	3	13	26	24	8	15
5	14	15	21	23	1	18	20	5	2	10
6	23	13	15	7	17	19	7	1	24	8
7	20	13	22	24	13	6	6	11	25	6
8	25	26	26	5	21	3	13	4	8	
9	25	12	12	17	8	16	8	8	20	5
10	1	6	17	4	11	4	4	24	14	3
11	24	26	6	9	18	24	23	24	6	8

الشكل المرافق يعرض جزء من المطلوب فقط.

طريقة نستعمل الظليبيتين **ALEA** و **ENT** مشاهدة توزيع التواترات بواسطة تمثيل بياني

أنجز محاكاً رمي نرد 30 مرة ثم عين تواتر كل نتائج مثل توزيع التواترات بواسطة مطلع التواترات، ثم بواسطة مخطط بالأعمدة.

حل

تحقيق التجربة: النتائج الممكنة هي: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

- نحجز في الخلية A2 $=ENT(ALEA(1;6+1))$ ثم ننقر على اللمسة ↵ كي تظهر أحد النتائج الممكنة في A2.


- نحدّد A2 ثم نعمم محتوى الخلية A2 إلى الخلية E2 .
عندما نحدّد الخلايا من A2 إلى E2 ، ونعمم من E2 إلى E7 نتحصل على 30 رقماً (عينة مقاسها 30).

- نحجز في الخلايا من G2 إلى G7 النتائج الممكنة :
نحجز في الخلية من G2 إلى G7 تكرار النتيجة 1 (النتيجة 1 محتواه في G2).

- نحدّد H2 ثم نعمم محتوى الخلية H2 إلى الخلية H7 كي نتحصل على تكرار كل نتائج.

- لحساب التواترات : نحجز في الخلية I2 $=H2/30$ وننقر على اللمسة ↵ كي يظهر تواتر النتيجة 1 .
نحدّد I2 ثم نعمم محتوى الخلية I2 إلى الخلية I7 كي نجد تواتر كل نتائج.

- لإنشاء مطلع التواترات : نحدّد الخلايا من I2 حتى I7



تعاليل

- يمكن الانطلاق من أي خانة أخرى تختلف عن A2 .

- تشبيه التجربة:
يتتمثل في توليد أعداد طبيعية من المجال [1;6]/[1;6] عشوائياً .

- النموذج المختار :
محدد سلفاً من قبل البرنامج إكسل.

- السند المادي :
هم الكمبيوتر وبرنامج إكسل مع الطلبة

$=ENT(ALEA(1;6+1))$

تلاحظ أن كتابة G2 في الطلبة :


$=NB.SI($A$2:$E$7;G2)$

لم يأتي بالشكل \$G\$2 وهذا حتى نسمح بتغيير محتوى G2 إلى محتوى G3 ثم G4 ... G7 إلى غاية G7 عندما نسحب الفارة من I2 إلى I7 ؛ بينما

\$E\$7 و \$A\$2 يسمح بتنشيط محتويات الخلايا من A2 إلى E7

تحول A2 إلى A\$2 يمكن بالنقر على اللمسة F4

- لإنشاء المخطط بالأعمدة للتواترات : نحدد الخلايا من I2 حتى I7 ثم نتبع التعليمات الواردة أعلاه عند إنشاء مسلسل التواترات غير أننا نحدد في معالج البيانات اختيار مخطط بالأعمدة.



طريقة

تشبيه التجريبية .

=H2/30 و =NB.SI(\$A\$2:\$E\$7;G2) و =ENT(ALEA(0^6+1) تحقق التجربة باستخدام الطلبيات وفق الإجراءات المشار إليها في الحل.


• تذبذب العينات

أنجز 3 محاكمات مختلفة لرمي نرد 50 مرة، ثم أنشئ مسلسل تواترات كل عينة في نفس الشكل.
انقر على اللمسة F9 عدة مرات، ماذا تلاحظ؟ اشرح.

حال	تعاليق
العينة الأولى: نحضر في الخلية A1 [=ENT(ALEA(0^6+1)] ثم ننقر على اللمسة []. نحدد A1 ثم نعمم محتوى الخلية A1 إلى الخلية J1 ثم نعمم محتوى السطر 1 إلى السطر 5 فنتحصل على عينة مقاسها 50 . ننشئ مسلسل التواترات. عندما نضغط على اللمسة F9 نشاهد على الشاشة عينة أخرى مقاسها 50. عندما نضغط على اللمسة F9 عدة مرات نلاحظ كيف تتغير التواترات.	لاحظ أن التواترات مختلفة في كل عينة رغم أننا ننجز نفس التجربة في نفس الشروط.
العينة الثانية: نحضر في الخلية A7 [=ENT(ALEA(0^6+1)] ثم ننقر على اللمسة []. نحدد A7 ثم نعمم محتوى الخلية A7 إلى الخلية J7 ثم نعمم محتوى السطر 7 إلى السطر 11 فنتحصل على عينة مقاسها 50 فنتحصل على عينة مقاسها 50 ونكرر العملية السابقة.	نجد مثلا ، التواترات المتعلقة بالعينة الأولى كالتالي : سجل في الخلية M2 [=NB.SI(\$A\$1:\$J\$5;L2)/30] ننقر على اللمسة [] ثم نعمم محتوى الخلية M2 إلى الخلية M7 .
العينة الثالثة: نحضر في الخلية A13 [=ENT(ALEA(0^6+1)] ثم ننقر على اللمسة []. نحدد A13 ثم نعمم محتوى الخلية A13 إلى الخلية J13 ، ونعمم محتوى السطر 13 إلى السطر 17 فنتحصل على عينة مقاسها 50 ونكرر العملية السابقة. في العمود L (من L2 إلى L7) نسجل النتائج الممكنة ونجعل الأعمدة M و N و O مخصصة للتواترات المتعلقة بكل عينة.	

L	M	N	O
العينة الأولى	العينة الثانية	العينة الثالثة	العينة الرابعة
1	0,18	0,2	0,24
2	0,1	0,18	0,18
3	0,24	0,16	0,14
4	0,14	0,14	0,2
5	0,1	0,14	0,08
6	0,24	0,18	0,16

نحدّد مجموعة الخلايا من M2 إلى O7 ثم ننقر على **Insertion** ← **Courbes** ← **Graphique...** ← **Terminer** ← **Suivant >** و أخيرا على فتححصل على شكل مثل ما يأتي:



ننقر على اللمسة F9 عدة مرات فنلاحظ تغير مضلعات التواترات مما يعني تغير التواترات في كل عينة أي هناك تذبذب التواترات.

طريقة

بعد محاكاة التجربة 3 مرات نستعمل اللمسة F9 لمشاهدة تذبذب العينات .

• استقرار التواترات

أنجز محاكاة رمي قطعة نقية غير مزيفة 400 مرة بهدف مشاهدة ميل تذبذب العينات نحو الإستقرار كلما كبر مقاسها.

نهم بتواءر ظهور النتيجة " ظهر " الذي نرمز له بالعدد 1 (و نرمز للنتيجة " وجه " بالعدد 2). ننفذ العملية كما يأتي :

- نترك السطرين الأول والثاني من ورقة الحساب للتسمية.
- في العمود A : نسجل رقم الرمية (من 1 إلى 400) بدءاً من الخلية A3 .
- في العمود B : نسجل نتيجة كل رمي بحجز [=ENT(ALEA())^2+1] في الخلية B3 ، ثم ننقر على اللمسة ← نعم محتوى الخلية B3 إلى الخلية B402 .
- في العمود C : نحسب عدد المرات التي ظهرت فيها النتيجة 1 من الرمية الأولى حتى الرمية المموافقة وذلك بحجز التكرار المجمع الصاعد للنتيجة الممكنة 1 [=NB.SI(B\$3:B3;"1")] في الخلية C3 .
- والتقر على اللمسة ← ثم تعميم محتوى الخلية C3 إلى الخلية C402 .

لاحظ أن الخلية Cn تحتوي على تكرار النتيجة 1 في عينة مقاسها عدد الرميات أي محتوى الخلية An وبالتالي تواتر النتيجة 1 في عينة مقاسها n يساوي Cn/A .

- في العمود D : نحسب التواتر Cn/An من أجل $n \leq 402$ و ذلك بجز $=C3/A3$ في الخلية $D3$ والتقى على الممسة \rightarrow ثم نعمم محتوى الخلية $D3$ إلى الخلية $D402$ فنحصل على تواتر النتيجة 1 في العينات التي مقاسها أصغر من 400 أو يساويه.

المطلوب هو إنجاز هذه العملية، ثم إنشاء مطلع التواترات (بعد تحديد الخلايا من $D3$ إلى $D402$).
ما زالت لاحظ على التواترات عندما يأخذ مقاس العينة قيمة مخصوصة في المجالات $[50,100]$ ، $[1,50]$ ، $[200,400]$ ثم ماذا تستنتج؟

حل	تعاليق																																																																																																																		
<p>بعد إنجاز العمل المطلوب على الأعمدة A ، B ، C ؛ نحدد الخلايا من $D3$ إلى $D402$ ثم :</p> <ul style="list-style-type: none"> نكتب "عدد الرميات" في: <input type="text" value="التوترات"/> و "التوترات" في: <input type="text" value="الرميات"/> <p>و هكذا يظهر التمثيل البياني.</p>	<p>حذار من الخلط بين تواتر النتيجة 1 في التجربة و التواتر Cn/An</p>																																																																																																																		
<p>وضع رأس الزالق على محور الفواصل، وننقر على الجهة اليمنى للفأرة فتظهر:</p> <ul style="list-style-type: none"> وضع رأس الزالق على محور الفواصل، وننقر على الجهة اليمنى للفأرة فتظهر 																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25px;"></th> <th style="width: 25px;">A</th> <th style="width: 25px;">B</th> <th style="width: 25px;">C</th> <th style="width: 25px;">D</th> <th style="width: 25px;">E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">إستقرار التوترات</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>رقم الرميمية</td> <td>نتيجة الرميمية</td> <td>تكرار النتيجة "1"</td> <td>توتر النتيجة "1"</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0,33</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td colspan="5" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>9</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td colspan="5"></td> </tr> </tbody> </table>		A	B	C	D	E	1	إستقرار التوترات					2	رقم الرميمية	نتيجة الرميمية	تكرار النتيجة "1"	توتر النتيجة "1"		3	1	2	0	0,00		4	2	2	0	0,00		5	3	1	1	0,33		6	4	2	1	0,25		7						8						9						10						11						12						13						14						15						16						17						18						
	A	B	C	D	E																																																																																																														
1	إستقرار التوترات																																																																																																																		
2	رقم الرميمية	نتيجة الرميمية	تكرار النتيجة "1"	توتر النتيجة "1"																																																																																																															
3	1	2	0	0,00																																																																																																															
4	2	2	0	0,00																																																																																																															
5	3	1	1	0,33																																																																																																															
6	4	2	1	0,25																																																																																																															
7																																																																																																																			
8																																																																																																																			
9																																																																																																																			
10																																																																																																																			
11																																																																																																																			
12																																																																																																																			
13																																																																																																																			
14																																																																																																																			
15																																																																																																																			
16																																																																																																																			
17																																																																																																																			
18																																																																																																																			

- نلاحظ أنّ :

التواءرات محصورة	في المجال.....
0,60 و 0,60	[1,50]
0,60 و 0,50	[50,100]
0,60 و 0,50	[100,200]
قريبة من 0,50	[200,400]

لاحظ أنّ التقر على المسة F9 يؤدي إلى إجراء محاكاة جديدة للتجربة، وهو ما يسمح لنا بمشاهدة النتائج والتأكد من ظاهرة استقرار العينات

نستنتج أنّ كلما كبر مقاس العينة ضاق المجال الذي يحصر التواءر، ويؤول إلى 0,5 وهذا يمثل ميل الظاهرة نحو الإستقرار.

- تقرر على F9 وفي كلّ مرة ، نلاحظ أنّ ميل التواءرات يتغير، وبتغير التواءرات المسجلة في العمود D.
- كما نلاحظ أنّ التواءرات تؤول إلى الإستقرار شيئاً فشيئاً كما هو الحال في المحاكاة الأولى.

طريقة

و =NB.SI(B\$2:B2;"1") =ENT(ALEA()^2+1) نستعمل F9 والمسة





(II) استعمال الحاسبة البيانية

(الحاسبة البيانية المستعملة في هذه الفقرة هي TI-83 Plus، غير أنه يمكن استعمال حاسبات أخرى تمتلك نفس الخصائص).

• حجز سلسلة

علامات التلاميذ	8,5	10	13	15,5	18
التكرارات	5	1	7	4	3

احجز السلسلة الإحصائية المعطاة في الجدول المقابل باستعمال حاسبة بيانية.

تعاليق	حل	خطوات
<ul style="list-style-type: none"> ▪ نتأكد من أن Edit... قد تم اختيارها. 		STAT نقر على STAT فتظهر الشاشة المقابلة: 
<ul style="list-style-type: none"> ▪ في حالة حجز خاطئ في إحدى القوائم نمحى ذلك بتحريك الزالق لتحديد الخطأ ثم نقر على DEL، أو استبدال القيمة الخاطئة بالحجز فرقها. 		ENTER نقر على ENTER فتظهر الشاشة المقابلة: 
<ul style="list-style-type: none"> ▪ نحجز السلسلة كما يأتي : نسجل علامات التلاميذ في القائمة L1 والتكرارات في القائمة L2 . ▪ الإنقال من عدد إلى عدد آخر يتم بتحريك الزالق بواسطة: 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ فتصبح الشاشة في النهاية 		



• حساب مؤشرات سلسلة

احسب باستعمال حاسبة بيانية كلّ من: الوسط الحسابي، والوسيط، والمدى للسلسلة الإحصائية المعطاة في الفقرة السابقة.

تعالق	حل
<ul style="list-style-type: none"> يمكن حساب المؤشرات بنفس الحاسبة باستعمال طلبيات أخرى : 	<p>نقر على STAT.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ثم نختار CALC بتحديده بالزالق و NEXT ونختار STAT فتظهر الشاشة المقابلة: 	<p>فتظهر الشاشة المقابلة:</p>
<ul style="list-style-type: none"> يشير mean(إلى الوسط الحسابي، median(إلى الوسيط ، ... (نجد التفاصيل في دليل الحاسبة). 	<p>فتظهر الشاشة:</p>
<ul style="list-style-type: none"> في بعض الحاسبة نجد Moyenne(يشير إلى الوسط الحسابي، Médiane(يشير إلى الوسيط ، ... المؤشرات الأخرى التي تعرضها الحاسبة، سوف تدرس في المستقبل. 	<p>• ثم ننقر على ENTER فيظهر على الشاشة:</p> <p>• ثم ننقر على 2 ، ثم ننقر على ENTER فيظهر على الشاشة:</p> <p>• ثم ننقر على 2 ، ثم ننقر على ENTER و يظهر:</p> <p>فحصل على النتائج المقابلة في الشاشة.</p> <p>حيث:</p> <p>\bar{x} هو الوسط الحسابي ؛ x هو مجموع كل العلامات ، n هو التكرار الكلي (أي عدد التلاميذ).</p> <p>بتحريك الزالق يظهر $Med=13$ وهو الوسيط كما تظهر أكبر قيمة $MaxX$ للسلسلة و أصغر قيمة لها $MinX$ فنحسب المدى الذي يساوي:</p> <p>$MaxX-MinX=18-8,5$</p> <p>$MaxX-MinX= 9,5$ أي</p>

طريقة

نستعمل و **CALC** و **1:Edit** و **STAT** بترتيب حسب التعليمات المعطاة في الحل.

• ترتيب سلسلة

رتب السلسلة : 2,6,1,7,3 ترتيبا تصاعديا

حل

.

- نجز قيم السلسلة في **L1**.

ENTER ← L1SortA(← OPS ← STAT ← 2nd ← .

ثم نكتب **SortA(L1)** وننقر على **ENTER**. فيظهر على شاشة الحاسبة **Done** أو **Fait** (حسب نوع الحاسبة) أي منجز.

ENTER ← 1:Edit... ← STAT ← ENTER .
للتأكد من أن السلسلة مرتبة : فقط يظهر السلسلة على شاشة الحاسبة مرتبة.

تعالق

في بعض الحاسبة نجد طلبية الترتيب التصاعدي هي *Tricroi*(

نرتب السلسلة ترتيبا تناظريا **SortD(L1)** أو **SortD(L1)** باستعمال *TriDécroi*(في حاسبات أخرى

طريقة

نستعمل و **OPS** و **1:SortA(** و **STAT** و **2nd**

حل

تعالق

PRB MATH rand .
ننقر على **PRB** ثم نحرك الزّالق حتى **rand**.

ENTER rand .
ننقر على **ENTER** فيظهر على الشاشة

ENTER rand .
وكل نقر على **rand** يولد عددا عشوائيا.

rand .
6679182274
3219702592
.0721932748

اختيار الطلبية **rand** ثم النقر 3

ENTER rand .
مرات على **ENTER** يعطي نافذة مشابهة للمقابلة:

عند اختيار **PRB** والنقر على **ENTER** يظهر على شاشة بعض *NbrAléat* الحاسبة

استعمال الطلبية **rand** ثم النقر على **ENTER** يولد عددا عشوائيا ينتمي إلى المجال $[1 ; 0]$.

عندما نختار الطلبية **rand** ونكتب عددا N :

ENTER rand .
وننقر على **ENTER** يظهر عدد عشوائي ينتمي إلى $[0, N]$.

تعالیق

نستعمل **rand** ثم ننقر على **ENTER** للحصول على عدد عشوائي ينتمي إلى $[1; 0]$.
و **randN** ثم ننقر على **ENTER** للحصول على عدد عشوائي ينتمي إلى $[N; 0]$.

- محاكاة تجربة بواسطة الطلبية $NbrAléat$ أو $Rand$ وذلك حسب الحاسب المستعملة. انجزمحاكاة رمي نرد غير مزيّف 5 مرات. احسب توافر الوجه 6.

تعالیق حل

نصلح : كل وجه يقابل عدد النقط التي يحملها .

يمكن عرض X عدداً طبيعياً (عشرياً) تتنمي إلى $[1, N]$ باستعمال الطلبية: $seq(randInt(1, N), x, 1, X, 1)$ ونحصل على هذه الطلبية كالتالي:

The diagram illustrates the key sequence for generating a random integer between 1 and 99. It starts with the **MATH** key, followed by the **PRB** key, then the **randInt(** function, and finally the **ENTER** key.

L1	L2
	6 5 4 3 2 1 0

و يظهر على الشاشة : `seq(randInt(`

ثم نجز:

کی $seq(randInt(1,6),x,1,5,1)$

تحصل على عينة مقاسها 5 التي

نخزنها في القائمه بـ L_2 باستعمال

١١٦

المس

توانی ظهر ووجه 6 هم $\frac{2}{6}$ ای $\frac{1}{3}$ ($\approx 0,33$)

يمكن استعمال طرق أخرى لتوليد أعداد عشوائية (طبيعية) تتنمي إلى المجال [1,6].

مثال : `int(rand*6+1)`


کل نقر علی

في بعض الحاسبة تكتب الطلبية
suite(entAléat(seq(randInt(

طريقة

نطيق مر اهل محاكاة تجربة و نتجز ها حسب ما توفره الحاسبة

حل مسألة إدماجية



المخطط الآتي يعبر عن العلامات التي تحصلت عليها عينة من تلاميذ مؤسسة في اختبار الرياضيات .

1) احسب المعدل \bar{x} لهؤلاء التلاميذ بتوظيف خاصية من خواص الوسط الحسابي.

2) صنف العلامات وفق فئات طول كل واحدة 4 و أحسب هكذا المعدل \bar{y} لهؤلاء التلاميذ بتوظيف خاصية من خواص الوسط الحسابي.

3) صنف وفق فئات أخرى بهدف اقتراح ملاحظات كالأتي:

دون المستوى $\rightarrow [0;5]$ ؛ غير كاف $\rightarrow [5;10]$ ؛ مقبول $\rightarrow [10;15]$ ؛ جيد $\rightarrow [15;20]$.

1-3) احسب المعدل \bar{z} لهؤلاء التلاميذ في هذه الوضعية.

2-3) اشرح كيف نستعمل في مجدول EXCEL الطلبية

$$=SI(B2<10;"غير كاف";SI(B2<12;"مقبول";SI(B2<16;"جيد";SI(B2<20;"جيد جدا";"جيد جدا"))))$$

لاستخراج نتائج التلاميذ على الشكل الآتي :

قائمة التلاميذ	العلامات	الملاحظات
التلميذ 1	2,5	غير كاف
التلميذ 2	11,5	مقبول
التلميذ 3	17,5	جيد جدا
التلميذ 4	14	جيد

4) قارن بين كل المعدلات التي تحصلنا عليها في الأسئلة السابقة . ناقش .

حل

1) الجدول الإحصائي للسلسلة المعطاة هو :

العلامات	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
النكرار	6	8	6	10	6	8	6	10	10	12	4	12	6	8	6	4

نحسب \bar{x} باستعمال الخاصية : "حساب الوسط الحسابي انطلاقاً من أوساط حسابية جزئية " .

$$\text{معدل العلامات من 1 إلى 6 هو } m_1 = \frac{1 \times 6 + 2 \times 8 + 3 \times 6 + 4 \times 10 + 5 \times 6 + 6 \times 8}{6+8+6+10+6+8} = \frac{158}{44} = \frac{79}{22}$$

$$\text{معدل العلامات من 7 إلى 11 هو } m_2 = \frac{7 \times 6 + 8 \times 10 + 9 \times 10 + 10 \times 12 + 11 \times 4}{6+10+10+12+4} = \frac{376}{42} = \frac{188}{21}$$

$$\text{معدل العلامات من 7 إلى 11 هو } m_3 = \frac{12 \times 12 + 13 \times 6 + 14 \times 8 + 15 \times 6 + 16 \times 4}{12+6+8+6+4} = \frac{488}{36} = \frac{122}{9}$$

$$\bar{x} \approx 8,38 \quad \bar{x} = \frac{44m_1 + 42m_2 + 36m_3}{44+42+36} = \frac{1022}{122} = \frac{511}{61}$$

(2) عندما نرتب العلامات وفق فئات طول كل واحدة 4 ، نجد الفئات : $[0;4], [4;8], [8;12], [12;16], [16;20]$ يمكن عندئذ التعبير عن السلسلة الإحصائية بالجدول الآتي:

الفئة (العلامة)	$[0;4]$	$[4;8]$	$[8;12]$	$[12;16]$	$[16;20]$
التكرار (عدد التلاميذ)	20	30	36	32	4
مركز الفئة	2	6	10	14	18
(مركز الفئة) - 10	8-	4-	0	4	8

نحسب المعدل \bar{y} باستعمال الخاصية 2: "أخذنا هنا $a = -10$ " (أخذنا هنا $y + a = \bar{y} + a$) هو :

$$\bar{y} - 10 = \frac{(-8) \times 20 + (-4) \times 30 + 0 \times 36 + 4 \times 32 + 8 \times 4}{20 + 30 + 36 + 32 + 4} = \frac{-120}{122} = -\frac{60}{61}$$

$$\text{بما أن } \bar{y} \approx 9,02 \text{ فإن } \bar{y} = -\frac{60}{61} \text{ أي } \bar{y} - 10 = -\frac{60}{61} \text{ و منه } \bar{y} = \bar{y} - 10 = -\frac{60}{61}$$

(3) (1-3) نعبر عن السلسلة الإحصائية في هذه الوضعية بالجدول الآتي:

الفئة (العلامة)	$[0;5]$	$[5;10]$	$[10;15]$	$[15;20]$
النكرار (عدد التلاميذ)	30	40	42	10
مركز الفئة	2,5	7,5	12,5	17,5

$$\text{نحسب المعدل } \bar{z} : \bar{z} = \frac{2,5 \times 30 + 7,5 \times 40 + 12,5 \times 42 + 17,5 \times 10}{30 + 40 + 42 + 10} = \frac{1075}{122} \text{ إذن } \bar{z} \approx 8,81$$

(2-3) إستخراج نتائج التلاميذ باستعمال المجدول Excel

- نكتب "قائمة التلاميذ" في الخلية A1 ؛ "العلامات" في الخلية B1 ؛ "الملاحظات" في الخلية C1
- نجز اسم تلميذ في الخلية A_i و علامته في الخلية B_i و ملاحظته في الخلية C_i ($i \neq 1$) .
- نجز في الخلية C2 الطلبية

ثم ننقر على **ENTREE** و تظهر على الشاشة الملاحظة الخاصة بالتلميذ الأول في القائمة.

- نحدد الخلية C2 و نسحب الفأرة من C2 إلى Cn (عدد التلاميذ هو n ; $n \geq 2$) لنتحصل على نتيجة كل تلميذ.

A		B	C	D	E	F
1	قائمة التلاميذ	العلامات	الملاحظات			
2	التلميذ 1	2,5	غير كاف			
3	التلميذ 2	11,5	مقبول			
4	التلميذ 3	17,5	جيد جدا			
5	التلميذ 4	14	جيد			

(4) \bar{y} و \bar{z} يختلفان عن \bar{x} نظراً للحساب \bar{y} و \bar{z} بتعويض كل فئة بمركزها أي فرضنا أن كل تلميذ


فئة $[a, b]$ تحصلوا على نفس العلامة $\frac{a+b}{2}$ و فقدنا عندئذ معلومات حول توزيع العلامات.

تمارين وسائل

- (θ) لا تتغير التواترات عندما نضيف نفس العدد لكل التكرارات .
 (م) التواتر يكون دائما حاصل قسمة عددين موجبين.
 (ز) رمي قطعة نقدية يؤول إلى سحب قريضة من كيس حيث 50% من القرصيات تحمل الكلمة "ظهر" و 50% تحمل الكلمة "وجه".

تمارين تطبيقية

2. المخطط بالأعمدة الآتي يمثل عدد أيام العطل المرضية لعمال مؤسسة.



- أ) عين الجدول الإحصائي للسلسلة.
 ب) ما هو عدد عمال المؤسسة ؟
 ج) ما هو منوال السلسلة؟

3. تعتبر سلسلة تتعلق بأوزان طرود بريدية.

الأوزان بالكيلوغرام	1	2	3	5	7
عدد الطرود	8	5	4	2	1


- أ) هل ميزة هذه السلسلة كمية أم نوعية؟
 ب) هل ميزة هذه السلسلة مستمرة أم منفصلة؟
 ج) ما هو عدد الطرود ؟
 د) ما هو عدد الطرود التي وزن كل منها $3kg$ على الأقل ؟
 ر) ما هو عدد الطرود التي وزن كل منها $3kg$ على الأكثر ؟
 ط) ما هو الوزن المتوسط لهذه الطرود ؟
 أك) احسب مدى هذه السلسلة .
 م) ارسم المخطط بالأعمدة لهذه السلسلة.

أصحٍ أو خطأ؟

1. أ) إذا كانت قيمة الميزة الإحصائية أعدادا صحيحة فإن الميزة منفصلة.
 ب) إذا كانت الميزة الإحصائية منفصلة فإن قيمها أعداد صحيحة.
 ج) في السلسلة 4,4,2,0,-1,-3,-7 الوسط الحسابي يساوي الوسيط .
 د) انطلاقا من الجدول الآتي :

الثمار	الفئات
5	[5,10[
20	[10,20[
15	[20,25[

نستنتج المدرج التكراري الآتي:




- أ) مجموع التواترات في كل عينة يساوي 1.
 ب) لمحاكاة رمي 3 قطع نقدية ، يمكن اختيار أعداد صحيحة عشوائية بين 0 و 3.
 ج) لمحاكاة اختيار أعداد عشوائي من 2 إلى 12، يمكن رمي نرددين و إرفاق كل رمي بمجموع النتائجين المحصل عليها.
 د) لمحاكاة رمي نرد بمجدول ، يمكن استعمال

$$=1+ent(alea(0^*6))$$
.
 إ) التواتر هو التكرار المعبر عنه بنسبة مئوية.
 ذ) عندما نضرب تواتر قيمة في 100 نجد تكرارها.
 ح) لا تتغير التواترات عندما نضرب كل التكرارات في نفس العدد .

11. ما معنى الطلبية **rand**6 عندما نستعمل الحاسبة البيانية *TI-83Plus*

12. ما معنى الطلبية **randInt(4,6)** عندما نستعمل الحاسبة البيانية *TI-83Plus*.

13. يعطى المخطط بالأعمدة الآتي. أنشئ مصلع التواترات.



14. 30% من القرصيات الموجودة داخل كيس، بيضاء. قال مولود: "عندما نضرب عدد هذه القرصيات البيضاء في 2، النسبة الثوية المعطاة تتغير و تصبح 60%". هل توافق مولود؟

15. أجري استفتاء في بلد مجزء إلى منطقتين: المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية، وكانت النتائج كما يلي:

	المنطقة الشرقية	المنطقة الجنوبية
عدد الناخبين	14074728	2345788
النسبة المئوية للمصوتين بنعم	47%	54 %


ما هي نتيجة هذا الاستفتاء؟

16. قدم مدير ثانوية نتائج البكالوريا في مؤسسته:

الشعب	عدد التلاميذ المسجلين	نسبة النجاح
أدب	60	20%
علوم الطبيعية والحياة	110	52%
علوم دقيقة	20	90%

ما هي نسبة النجاح في هذه الثانوية؟

4. المدرج التكراري الآتي يمثل المسافات بين المدرسة ومساكن التلاميذ.



- (أ) ما هي الفئة المنوطة؟
 (ب) احسب الوسط الحسابي باستعمال مراكز الفئات.

5. إليك قيمة مقربة للعدد π :

3,1415926535897

ما هو تواتر الرقم 9؟

(ب) نفس السؤال من أجل المقربة الآتية للعدد π :
 3,1415926535897932384626

6. كرّنا نفس التجربة مرتين وتحصلنا على عينتين مقاس كلّ منها 100.

العينة الأولى

النتائج	x	y	z
التوترات	0,2	0,3	0,5

العينة الثانية

النتائج	x	y	z
التوترات	0,5	0,1	0,4

احسب الوسط الحسابي ثم عين جدول التكرارات وأنشئ مصلع التواترات بالنسبة إلى كلّ عينة.

7. اتم توزيع التواترات الآتي:

النتائج	x	y	z
التوترات	0,1	0,1	

8. ما هو دور اللمسة F9 عندما نستعمل مجدول؟

=NB.SI(D15:D45;"لا")
9. ما معنى الطلبية [=SI(B10=1;"ليس هو","هو")]

عندما نستعمل مجدول؟

=SI(B10=1;"ليس هو","هو")
10. ما معنى الطلبية [=SI(B10=1;"ليس هو","هو")]

عندما نستعمل مجدول؟

التمثيلات البيانية

- 1) عين جدول التكرارات المجمعة الصاعدة وجدول التكرارات المجمعة التالفة.
 2) انشئ ، في نفس الشكل ، مضلع التواترات المجمعة الصاعدة ، ومضلع التواترات المجمعة التالفة ، ثم عين ترتيب نقطة تقاطعهما. ماذا تمثل فاصلة هذه النقطة؟

21. سجل الدرك الوطني سرعة 120 سيارة

السرعة (km/h)	[0,30]	[30,45]	[45,60]	[60,120]
التكرار	40	30	38	12

انشئ مدرج التكرارات.

22. الجدول الآتي يتعلّق بالأجور التي يتقاضاها 70 عامل بالدينا في اليوم.

الأجور	[500,550]	[550,700]	[700,1000]
عدد العمال	20	40	10

انشئ مدرج التكرارات.

23. نعتبر الجدول الإحصائي الآتي:

التكرار	الفئات
120	[0,150[
160	[150,300[
90	[300,350[
80	[350,400[
60	[400,500[

انشئ المدرج التكراري لهذه السلسلة.

مؤشرات سلسلة إحصائية

24. استعمل الرمز

(1) اكتب المجاميع الآتية باستعمال الرمز Σ :

$$2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3$$


$$3^2 + 3^3 + 3^4 + 3^5 + 3^6 + 3^7$$

$$5 + 9 + 13 + 17$$

(2) احسب المجموعين :

$$\sum_{k=1}^3 \frac{2}{3k(k+1)} \quad \sum_{k=0}^4 (3k - 2)$$

- 17.** عدد السيارات السياحية في الجزائر كان 1739286 في 31/12/2002 . المخطط الدائري الآتي يبين توزيع هذه السيارات حسب النوع .
 (المصدر : الديوان الوطني للإحصائيات)



احسب عدد سيارات كل نوع.

- 18.** توزيع تلاميذ السنة الأولى ثانوي كان في السنة الدراسية 2001-2002 كما يبين المخطط الدائري الآتي :



(المصدر : وزارة التربية الوطنية)
 احسب النسبة المئوية لتلاميذ كل جذع مشترك.

- 19.** عدد السيارات السياحية في الجزائر كانت 1739286 .
20. الجدول الآتي يبين توزيع هذه السيارات حسب أعمارها.

السنوات	عدد السيارات
أقل من 5 سنوات	108846
[5 , 10 [128475
[10 , 15 [287085
[15 , 20 [336021
أكثر من 20 سنة	878859


(المصدر : الديوان الوطني للإحصائيات)
 ارسم المدرج التكراري والمخطط الدائري لهذه السلسلة.

20. سجلنا قامات 250 شخص :

النوات	القامات (cm) t
$150 \leq t < 160$	12
$160 \leq t < 165$	33
$165 \leq t < 170$	45
$170 \leq t < 175$	50
$175 \leq t < 180$	61
$180 \leq t < 185$	26
$185 \leq t < 190$	17
$190 \leq t < 195$	6

ب) جد سلسلة خمسة أعداد وسطه الحسابي يساوي وسيطها ويساوي مداها.


30. المدرج التكراري الآتي يمثل سلسلة أوزان بذور فاصولياء بالسنتigram.



اتم الجدول الآتي ثم احسب الوسط الحسابي.

أوزان البذور	[35,40]	[40,45]	[45,50]	[50,55]
الثمار				

31. مؤسسة تتكون من مدیریتین : مدیرية البحث ومديرية الإنتاج. المخطط الآتي يمثل توزيع العمال حسب رتبهم.



الأجور الشهرية لهؤلاء العمال موزعة حسب الجدول الآتي:

الراتب	الإطرافات السفلية	الإطرافات المتوسطة	الموظفيون
الراتب	50000	40000	20000
(DA)			

أ) عين الوسط الحسابي و المنوال في كل مدیرية.

ب) في أي مدیرية يتقارضى العمال أحسن أجور؟ علل إجابتك.

32. تكون مؤسسة من 745 عاملًا من بينهم 56 إطاراً. المرتب الشهري المتوسط هو $15000DA$ بالنسبة إلى العمال و $25000DA$ بالنسبة إلى الإطارات.

25. احسب المدى e والوسط الحسابي \bar{x} وسيط Med و المنوال Mod ، وذلك من أجل كل سلسلة مما يلي:

- السلسلة أ: 4,4,6,6,7,9,5

- السلسلة ب: 9,14,8,4,5

- السلسلة ج: 12,9,5,9,8,9,12,8

26. أصحح أم خطأ؟ علل.

نعتبر علامات تلميذ في 8 مواد تعليمية.

1) العلامة الوسيطية تفوق العلامة المتوسطة.

2) العلامة المنوالية تفوق كل العلامات.

3) العلامة المنوالية تفوق العلامتين: الوسيطية والمتوسطة.

4) لا يتغير المعدل عندما نضيف 3 نقاط لعلامة ونطرح 3 نقاط لعلامة أخرى.

27. نعتبر السلسلة :

5 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 5 | 8 | 0 | 7 | 9

انشئ مطلع التكرارات المجمعة الصاعدة

واستنتج وسيط.

28. الجدول الآتي يمثل السرعات التي سجلتها الشرطة بأحد الطرق السريعة.

السرعات (km / s)	[70,80[[80,90[[90,100[
عدد السيارات	2	10	7

السرعات (km / s)	[100,110[[110,120[[120,130[
عدد السيارات	12	8	6

1) عين الفئة المنوالية، وسيط.

2) تفاصيل هذه المعطيات هي :

70 75 80 85 80 80 85 80
85 80 85 80 90 95 98 90
98 95 95 100 105 108 100 105
108 108 100 100 105 108 100 115
118 110 115 118 110 115 110 120
124 125 120 125 125 125

عين عندى المنوال، وسيط.

29. جد سلسلة خمسة أعداد وسطها الحسابي

9 و وسيطها 9، ومداها 12.

	المستطيل	المجمع الصاعد
[0,150[120	40
[150,300[53
[300,350[89
[350,400[78	78
[400,500[33
[500,600[26

36. معدّل الأعمار لمنه شخص هو 30 سنة.
 (1) هل يمكنك استنتاج عدد الأشخاص؟ علل.
 (2) برهن بالخلف أن وسيط الأعمار لا يفوق 60 سنة.

37. الجدولان الآتيان يعبران على درجات الحرارة المسجلة في مدینتين "س" و "ع" في السنة 2003 .

درجات الحرارة ($^{\circ}C$)	المدينة "س"					
	9	9	11	13	15	18
21	22	21	17	13	11	

درجات الحرارة ($^{\circ}C$)	المدينة "ع"					
	8	9	10	12	16	19
23	21	20	15	12	10	

- (1) احسب درجة الحرارة المتوسطة، ودرجة الحرارة الوسيطية، والمدى لكل مدينة.
 (2) ما هي المؤشرات (الوسيط-المدى أو الوسط الحسابي-المدى) التي تمثل أكثر كل سلسلة من السلاسلتين.

38. احسب الوسط الحسابي للأعداد :
 $7,23874978978386 ; 4,13874978978386 ; 3,13874978978386 ; 8,93874978978386$.

39. هل يمكن أن يتحصل كل تلميذ من تلاميذ قسم على علامة تفوق معدّل القسم؟ اشرح.

40. جدول الآتي يعبر على قامات تلاميذ قسمين "A" و "B".

أ) ما هو المركب المتوسط للعمال الذين ليسوا إطارات؟

ب) ارتكب خطأ في حساب المركب المتوسط للإطارات الذي هو في الحقيقة $25400DA$. احسب المركب المتوسط للعمال.

33. قطع سائق سيارة أجرة المسافة d بين مدینتين ثلاثة مرات ذهابا وايابا بالسّرعات $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6$ في المدد $t_1, t_2, t_3, t_4, t_5, t_6$ على الترتيب.


احسب المدة المتوسطة، والسرعة المتوسطة.

34. سجلت مؤسسة لكراء السيارات، في إطار متابعتها لحصیرتها، أن 100 سيارة قطعت عددا من الكيلومترات ببيانه الجدول الآتي:

النكرار المجموع النازل	النكرار المجموع الصاعد	عدد السيارات	عدد الكيلومترات
		16	[80,85[
		24	[85,90[
		32	[90,95[
		28	[95,100[

أ) اتمم الجدول.
 ب) احسب وسيط هذه السلسلة.

35. المدرج التكراري الآتي يمثل المسافات بالمتر بين مدرسة ومساكن تلاميذ.



اتمم الجدول الآتي :

النكرار	ارتفاع	الفئات
---------	--------	--------

- (3) باستعمال مجدول إكسل:
 - لاحظ كيف تغير مؤشرات الموقع عندما نغير
 قيم من السلسلة.

1 احسب عدد الأشخاص الذين قاماتهم 175cm
 45. سجلنا العدالت الفصلية لتلاميذ قسم نهائى:
 $9,5-12,75-10,75-16,75-8,45-9,75-11,33$
 باستعمال مجدول، استخرج نتائج هؤلاء التلاميذ
 موضحا:
 "ينتقل إلى القسم الأعلى" إذا كان المعدل أكبر
 أو يساوي 10 و"يعيد السنة" في الحالات
 الأخرى.

خواص الوسط الحسابي

46. قام رياضي في رمي الجلة بخمس
 محاولات وتحصل على النتائج الآتية: $7m, 9m, 8m, 8m, 9m$
 احسب ذهنياً الوسط الحسابي.

47. تعتبر مكعباً حرفه a (بالسنتيمتر)، نرمز
 لمساحته و V لحجمه.
 1) اتمم الجدول الآتي :

a	1	2	3	4	5	6	7
S							
V							

ثم احسب الحرف المتوسط.

- 2) هل المساحة المتوسطة تساوي مربع الحرف
 المتوسط؟
 3) هل الحجم المتوسط يساوي مكعب الحرف
 المتوسط؟

48. معدل 5 علامات لتلميذه هو 11 و علاماته
 الأولى كانت $10, 12, 11, 7$. ما هي العلامة الخامسة؟

49. ا) احسب المعدل \bar{x} الأعداد:
 $5, 3, 9, 3, 5, 7$.

ب) احسب المعدل \bar{y} الذي تتحصل عليه عندما
 نطرح 3 من كلّ عدد من الأعداد السابقة . جد
 علاقة بين \bar{x} و \bar{y} .

ج) احسب المعدل \bar{z} الذي تتحصل عليه عندما
 تضرب في 10 كلّ عدد من الأعداد السابقة . جد
 علاقة بين \bar{x} و \bar{z} .

القسم " A "			
القامت بالسنتيمتر	150	158	170
عدد التلاميذ	7	8	10

القسم " B "			
القامت بالسنتيمتر	152	160	165
عدد التلاميذ	5	8	7

- 1) عين القامة الوسيطية $MedA$ في القسم " A "
 و القامة الوسيطية $MedB$ في القسم " B ".
 2) هل يمكن تعين الوسيط Med للقسمين
 إنطلاقاً من $MedA$ و $MedB$?
 احسب عدد الأشخاص الذين قاماتهم أكبر أو
 تساوي 175cm .

41. تعتبر سلسلة 11 عدداً كلها تنتمي إلى
 المجال $[0,8]$. هل يمكن أن يكون الوسط
 الحسابي 2 و الوسيط 4؟

42. عدد أطفال عائلة هو 7. عين عمر الطفل
 الأكبر إذا علمت أنَّ:
 العمر المنوالى : 5 سنوات - العمر الوسيطي:
 7 سنوات - العمر المتوسط: 8 سنوات و هو
 عمر التوأمان.
 عين سلسلة 5 أعداد علماً أنَّ الوسط الحسابي
 هو 40 و الوسيط هو 20 والمدى هو 100.

43. عين سلسلة 5 أعداد علماً أنَّ الوسط
 الحسابي هو 40 والوسيط هو 20 والمدى هو
 100.

44. السلسلة الآتية تمثل قامات أشخاص
 بالسنتيمتر .

170	160	160	158	181	185	178	181
165	160	178	158	179	160	181	179
162	178	169	159	178	165	175	159
169	169	175	169	165	166	176	180
180	175	165	175	165	178	168	178
158	169	169	162	170	166	175	179
179	179	179	163	163	165	160	163
160	180	176	163	163	166	170	160
179	161	160	163	170	165	169	170
160	168	166	168	164	178	178	156

- 1) باستعمال مجدول إكسل كي تمثل بيانيًا هذه
 السلسلة و كي تحسب وسطها الحسابي
 و وسيطها و منوالها والمدى .
 2) نفس الأسئلة باستعمال حاسبة بيانية.

56. الحاسبة البانية توفر أعداد عشوائية (ت تكون من 10 أرقام ولا نعتبر الصفر قبل الفاصلة)

rand

تنتمي إلى المجال $[0,1]$ بواسطة اسحب 8 أعداد عشوائية؛ تحصل عنده على 80 رقم . أحسب تواتر الرقم 7 . قارن مع التواترات التي تحصل عليها زملائك الذين أنجزوا نفس التجربة .

تدبّب العينات – المحاكاة

57. كل زميل من زملائك يطلب من 10 أشخاص إعطاء رقم هن 0 إلى 7 .

(أ) اجمع كل المعلومات وعين جدول التواترات .
(ب) أنجز محاكاة لهذه التجربة بالحاسبة البيانية .
(ج) أنجز محاكاة هذه التجربة باستعمال مجدول وانشئ مطلع التواترات .

58. سحب قريصه من كيس يحتوي على 4 قريصات حمراء و 6 سوداء .

(أ) أنجز 20 سحب ثم عين تواتر ظهور قريصه حمراء .
(ب) كرر العملية 5 مرات و سجل في كل مرّة تواتر ظهور قريصه حمراء .
(يمكن القيام بهذه التجارب مع زملائك) .
اتم الجدول الآتي :

العملية	الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى
تواتر ظهور حمراء				
قريصه حمراء				

انشئ مطلع التواترات . لاحظ تغير التواترات (في عينات مقاسها 20) .

(ج) استعمل النتائج السابقة لإتمام الجدول الآتي :

مقاييس العينة	20	60	80	100
تواتر ظهور قريصه حمراء				

انشئ مطلع التواترات . لاحظ تغير هذه التواترات في عينات مقاييسها مختلفة .

جد حصراً التواتر ظهور قريصه حمراء .

59. نرمي نردين 100 مرّة و نسجل في كل مرّة مجموع النتائجتين .

(1) ما هي النتائج الممكنة؟

(2) أنجز محاكاة لهذه التجربة باستعمال مجدول .
نكتب في الخلية A2 : $=\text{ENT}(\text{ALEA}(0^6+1)+\text{ENT}(\text{ALEA}(0^6+1))$

50. احسب الوسط الحسابي للأعداد :

$3,897204 ; 3,897201 ; 3,897202 ; 3,897203$

51. تحصل تلميذ، في الفصل الأول، على

العلامات الآتية: $11,9, 10, 11, 9, 10$.

(أ) احسب المعدل \bar{x} لهذا التلميذ .

(ب) لوحظ في الفصل الثاني تحسين كل علامة من علامات الفصل الأول بـ 20 % .

احسب عندئذ المعدل \bar{y} .

جد علاقة بين \bar{x} و \bar{y} .

52. سجل أوزان و قامات 12 رياضياً و

أعطيت النتائج على الشكل (x, y) حيث x

هي القامة بالسنتيمتر و y هو الوزن بالكيلوغرام .

$(176,65); (174,72); (178,70); (172,69)$.

$(176,64); (175,70), (176,63); (174,65)$.

$(178,68); (174,70); (174,68); (175,72)$.

(أ) احسب القامة المتوسطة \bar{x} عندما نأخذ القامة 175cm كمرجع .

(ب) احسب الوزن المتوسطة \bar{y} عندما نأخذ

القامة 65kg كمرجع . جد علاقة بين \bar{x} و \bar{y} .

(ج) انشئ في معلم متعمد و متجانس كل النقط

$A(x, y)$ و النقطة $M(x, y)$.

توزيع التواترات

53. أ) كيف تحصل على أعداد عشوائية تنتمي

إلى $[0,10] \setminus [1,13]$ ؟

باستعمال حاسبة بيانية .

ب) نفس السؤال عندما نستعمل مجدولاً .

54. عدد تلاميذ مدرسة هو 1500 ، نريد تقدير

العدد x للتلاميذ الذين يحملون نظارات . نختار

40 تلميذ عشوائياً ونلاحظ أن 10 منهم يحملون

نظارات .

ماذا يمكن أن نستنتج فيما يخص العدد x .

55. كتبت جريدة في صفحتها الأولى

" 600 شخص من بين 1000 يخرون

المترشح Z حسب الإحصائيات الأخيرة " .

هل يمكن التصرّح أن Z يفوز في الانتخابات؟

في كلّ يوم : لدينا 3 حظوظ على 7 كي يكون هذا اليوم ممطرًا و 4 حظوظ على 7 كي يكون مشمسا.

ننجذب لمحاكاة لهذه الوضعية باستعمال كيس يحتوي على قريصات زرقاء (تمثيل المطر) وعلى قريصات صفراء (تمثيل الشمس) لمعرفة الأحوال الجوية في الأيام السبعة المقبلة، نسحب 7 قريصات على التوالي و مع الإعادة قبل السحب الموالي (نسحب قريصه و نسجل لونها ثم نعيدها داخل الكيس، نكرر هذه العملية 7 مرات).

أ) ما هو عدد القرصيات الزرقاء و عدد القرصيات الصفراء التي يجب وضعها داخل الكيس لإنجاز محاكاة مقبولة؟

ب) أنجز 20 محاكاة و احسب التواتر المتوسط للأيام الممطرة و قان النتيجة مع معطيات النص.

64. كيس يحتوي على 60 قرصية بيضاء و 40 قرصية حمراء. نسحب قرصية بإعادة. أ) استعمل مجدولاً لمحاكاة هذه التجربة من أجل عينة مقاسها 100.

نتحصل على أعداد طبيعية عشوائية x تتنمي إلى

المجال $[1,100]$ بواسطة ALEA و ENT و نصطلح :

إذا كان $x \leq 60$: القرصية بيضاء
و إذا كان $x > 60$: القرصية حمراء.
ب) كرر هذه المحاكاة 5 مرات و سجل في كلّ مرة تواتر ظهور القرصية البيضاء.
ماذا تلاحظ؟

مسائل

65. طلب من أشخاص في مدینتين "أ" و "ب" عدد الساعات التي يستغرقونها في مشاهدة التلفزة أسبوعياً فكانت النتائج كما الآتي :

بالنسبة إلى المدينة "أ" :
 $15, 18, 11, 11, 3, 6, 22, 21, 10, 17, 8, 24, 24, 25, 9, 9$

. . , 16, 16, 17, 9, 12, 13, 17, 17, 9, 20, 15, 20

: بالنسبة إلى المدينة "ب" :

$16, 11, 30, 15, 14, 12, 8, 6, 4, 30, 18, 38, 20, 9, 27$

. 15, 15, 9, 9, 11, 10, 7, 13, 0, 30, 15, 26

كي نتحصل على عدد طبيعي عشوائي من 2 إلى 12. نسحب الفارة من A101 إلى A2. نكتب النتائج الممكنة في العمود B (من B2 إلى B12).

نكتب في الخلية C2 $=NB.SI($A$2:$A$101;B2)/100$ كي نتحصل على تواتر النتيجة الممكنة 2 (من A2 إلى A101)؛ ثم نسحب الفارة من C2 إلى C12.

	A	B	C
1	النتائج الممكنة عن عينة مقاسها 100		
2	6	2	0,03
3	8	3	0,08
4	6	4	0,07

اعرض على الشاشة مطلع التواترات.
أنقر عدة مرات على المسة F9، ماذا تشاهد؟
إشرح.

60. الجدول الآتي يمثل توزيع تواترات عينة.

القيمة	6	7	9	10
التواترات	0,2	f	g	0,3

ماذا يمكن أن نستنتج فيما يخص الوسط الحسابي
إذا علمت أنَّ المنوال يساوي 7؟

61. الجدول الآتي يمثل توزيع تواترات من أجل عينة.

القيمة	6	7	8	9
التواترات	0,4	f	g	0,3

ماذا يمكن ان نستنتاج فيما يخص الوسط الحسابي إذا علمت أنَّ الوسيط هو 5؟

62. نستعمل حاسبة بيانية لأخذ عددين x و y من $[0,1]$ بطريقة عشوائية، ثم نحسب العدد c حيث:

أ) تأكد أنَّ c ينتمي إما إلى $[0,1]$ إما إلى $[0,2]$.
ب) أسحب عينة مقاسها 20، اتمم الجدول :

	$0 \leq c < 1$	$1 \leq c < 2$
الثمار		
التواترات		

ج) استعمل مجدولاً لإتمام الجدول السابق من أجل عينة مقاسها 1000.

63. الأحوال الجوية في بلد افتراضي هي كالتالي:

	الرجال	النساء	كل العمال
الوسط الحسابي			
الوسيط			
أكبر مرتب			
أصغر مرتب			
المدى			
المرتب المنوالى			

(2) اتمم الجدول الآتي :

الأجور	[15,19]	[19,23]	[23,27]	[27,30]
عدد الرجال				
عدد النساء				

- (3) اقترح مخططاً يسمح بمقارنة مراتبات النساء مع مراتبات الرجال.
- (4) لتخفييف الفوارق بين مراتبات الجنسين، اقترح رفع مراتبات النساء بنسبة 2% . احسب الوسيط و الوسط الحسابي في هذه الوضعية.
- نفس السؤال عندما يرتفع مرتب كل عاملة بمبلغ 1000 DA.

67. الوسط الحسابي للعددين a و b هو العدد

$$\bar{x} = \frac{a+b}{2} \quad \text{حيث}$$

الوسط الهندسي للعددين الموجبين a و b هو العدد g حيث $g = \sqrt{ab}$.

الوسط التوافقى للعددين a و b غير المعدومين هو العدد h حيث $\frac{2}{h} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$

الوسط الربيعي للعددين a و b هو العدد

$$q = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} \quad \text{حيث}$$

(1) قارن بين الأعداد \bar{x} و g و h و q .

(2) تعتبر الشكل :

- 1) مثل كل سلسلة في جدول إحصائي.
- 2) احسب المدى و الوسيط و الوسط الحسابي لكل سلسلة.
- 3) نصف في كل سلسلة المعطيات وفق فئات طول كل واحدة 7. انشئ المدرج التكراري لكل سلسلة.
- 4) استعمل نتائج الأسئلة السابقة لمقارنة السلاسلتين أعلاه.
- 5) نجم السلاسلتين في سلسلة واحدة فتحصل على سلسلة جديدة يطلب تعين مداها و وسيطها وسطها الحسابي.
- 6) هل توجد علاقة تربط بين وسيط السلسلة الجديدة و وسيطي السلاسلتين السابقتين؟
- 7) هل الوسط الحسابي للسلاسلتين السابقتين يساوي الوسط الحسابي للسلسلة الجديدة؟
- 8) اشرح كيف نحسب الوسط الحسابي للسلسلة الجديدة باستعمال نتائج السؤال (2).

66. مؤسسة إنتاجية تتكون من 41 رجل و 31 إمرأة . الجدولان الآتيان يعبران عن المراتبات الشهرية بألاف الدنانير.

الرجال	15	15	15	15	15
	15	15	15	18	18
	18	18	18	18	18
	18	21	21	21	21
	21	25	25	25	25
	25	25	25	25	25
	25	25	25	25	25
	25	25	30	30	30
	30				

النساء	15	15	15	15	15
	15	15	15	18	18
	18	18	18	18	18
	18	21	21	21	25
	25	25	25	25	25
	25	30	30	30	30
	30				

(1) اتمم الجدول الآتي:

- (5) اشرح كيف تتحصل على التواترات في العمود I .
 (6) انشئ مصلح التواترات

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1	0	0	0	1	$F(n)$ أنواع العائلات	عدد البنات في كل عائلة	عينة مقتبسها 1500	
2	0	0	0	1			0	97	0.06
3	1	1	1	0		3	1	363	0.24
4	1	0	1	1		3	2	564	0.38
5	1	0	0	0		1	3	365	0.24

إرشاد: (حدّد الخلايا من I6 إلى I16)
 (7) انقر اللمسة F9 عدّة مرات، ماذا تلاحظ؟
 اشرح.

(8) f_n هو تواتر العائلات التي لها n بنتا.
 قارن بين f_0 و f_4 بعد مشاهدة عدة عينات مستعملًا في ذلك النقر على اللمسة F9).


نفس السؤال فيما يخص f_2 و f_4 .

69. نجز محاكاة رمي قطعة نقدية عاديّة بواسطة الطلبيّة *random* في الحاسبة البيانيّة. ولأجل ذلك نصلّح على أن كل رقم زوجي يمثل "وجه" وكل رقم فردي يمثل "ظهر".
 نسحب 10 أعداد عشوائية:

6766138529	.966098337
8872529785	.5317665961
7944726606	.7950768798
5039563297	.2754338103
1676196127	.1176852286

(عندما يكون الرقم الأخير للعدد العشوائي هو 0، الحاسبة تعرض 9 أرقام بعد الفاصلة)
 أ) عين جدول التكرارات لل نتيجتين "وجه" و "ظهر".

ب) نسحب 20 عدداً عشوائياً و نهتم بتكرار 3 وجوه متتابعة (مثلا: في العدد العشوائي: 0,1224580673 نسجل نتيجتين "وجه-وجه-وجه" وهم 2-2-4 و 6-0-8. عين جدول التكرارات.



احسب الوسط الحسابي والوسط الهندسي والوسط التّوافيقي والوسط الرّبيعي للعددين AB و BC بدلالة أطوال قطع مستقيمة أحد طرفيها هو M.

68. تعتبر مجتمع العائلات التي لها 4 أطفال. نرمز بالعدد 1 إلى "بنت" وبالعدد 0 إلى "ولد".
 مثال : الربّاعية 0-0-1-1 تعبّر عن عائلة لها 3 أولاد و بنت.

لاحظ أنّ عدد البنات في عائلة $x-y-z-t$ هو $x+y+z+t$.

نسمّي عائلة من النوع $F(n)$ عائلتها n بنت.
 نريد إنجاز محاكاة حول عينة 1500 أي عائلة لها 4 أطفال.
 وذلك لنقدر تواتر العائلات التي لها n بنت.
 سنعمل لذلك مجدولاً.

(1) استعمل ENT و ALEA، لعرض على الشاشة 1500 عدداً طبيعياً عشوائياً من المجال [0,1].

	A	B	C	D	عينة مقتبسها 1500
1					
2	0	0	0	1	
3	1	1	1	0	
4	1	0	1	1	
5	1	0	0	0	

لاحظ: 0-0-0-1 تمثل العائلة الأولى.

(2) نجز في الخلية E2: =SOMME(A2:D2) كي نجد عدد البنات في العائلة الأولى (0-0-0-1).

ثم نسحب الفارة من E2 إلى E1501.

(3) نسجل في الخانات G6، G5، G4، G3، G2 أنواع العائلات ($0, 1, 2, 3, 4$) $F(n)$.

(4) نجز في الخلية H2 التعليمية:

=NB.SI(\$E\$2:\$E\$1501;G2)

ثم نسحب الفارة من H2 إلى H6 كي تتحصل على التكرارات.

الهندسة الفضائية

الكفاءات المستهدفة

- التعامل مع المحمّسات (تجسيدها يدوياً وتمثيلها).
- حساب الأطوال والمساحات والحجم.
- التّعرف على الأوضاع النّسبية لمستقيمين.
- التّعرف على الأوضاع النّسبية لمستقيم ومستو.
- التّعرف على الأوضاع النّسبية لمستويين.




قصر الحمراء بغرناطة

اجتهد الإنسان منذ القدم، قبل ظهور آلة التصوير بكثير، في تمثيل أشياء من الفضاء على سطوح مستوية، وبمرور الزّمن استعمل تقنيات رسم تعتمد على بعض المفاهيم الهندسية البسيطة.

استمدت في البداية من علم البصريّات وعلمائه العرب واليونانيين، ثم تطّورت لتدخل في شتّى ميادين الرّسم والتّمثيلات الهندسية. تقنية "التّمثيل الفني" أشهر تقنية وأكثرها استعمالاً خاصّة من قبل الرّسامين منذ بداية القرن 16، وهي تقنية تعتمد على ظلّ المجسم الواقع على مستوى عندما يسلط على هذا المجسم ضوء مصدره منبع ضوئي نقطي. ثم تبني الرياضيون هذا المجال في بداية القرن السابع عشر فطوروه ووضعوا له قواعد وقوانين.


أنشطة



نشاط 1. حساب الأبعاد في الفضاء

أ) الشكل المقابل يمثل مخططاً لمجسم مكون من متوازي مستطيلات أبعاده $5cm \times 12cm \times x$ وهرم ارتفاعه $AO=6cm$ حيث $AO=6cm$ هي ث نقاط [O] و [HG]. من أجل إيجاد قيمة للمجهول x يكون حجم هذا المجسم يساوي $660cm^3$ ؟

ب) بين أنَّ أحرف الهرم AF و AG و AB و AH متساوية، واحسب قيسها بتقريب .0,1.




نشاط 2. تصميم مجسم (1)

مجسم على شكل مكعب طول حرفه 5cm ينقصه هرم $5cm$ منصفات $[BC]$ و $[BF]$ و $[AB]$ على الترتيب كما في الشكل. أجز تصميماً لهذا المجسم.


نشاط 3. (★) تصميم مجسم (2)

أي التصاميم الآتية هو تصميم لمكعب مرسوم عليه أثر تقاطع مستوى مع هذا المكعب. أجز تمثيلاً بالمنظور متساوي القياس للشكل المناسب.




نشاط 4. المنظور المتساوي القياس (1)

الشكل الثاني هو بداية لتمثيل بالمنظور متساوي القياس للموشور القائم الممثل بالشكل الأول.



الشكل (2)




الشكل (1)

أ) أكمل الشكل الثاني للحصول على تمثيل بالمنظور متساوي القياس لنفس الموشور.

ب) احسب مساحته الكلية وحجمه.

نشاط 5. الأوضاع النسبية لمستقيمين



الشكل المقابل هو لمكعب طول حرفه 10cm مرسوم بالمنظور المتساوي القياس، الققطان M و L هما تقاطع $[BF]$ و $[CG]$ مع مستقيمات رصف الورقة. باستعمال بيانات الشكل أجب عن الأسئلة الآتية:


1. اذكر المستقيمات التي كلّ منها عمودي على (FG) .
2. اذكر المستقيمات التي كلّ منها يوازي (FG) .
3. اذكر مستقيمين غير متلقعين وغير متوازيين.
4. هل المستقيمان (EB) و (HB) متعدمان؟
5. ما نوع الرباعي $(EBCH)$ ؟
6. عين القيسين CL و BM واحسب ML .

نشاط 6. الأوضاع النسبية لمستقيم ومستوى

باستعمال الشكل الوارد في النشاط السابق أجب عن الأسئلة الآتية:

1. ما هو وضع المستقيم (AB) والمستوي $(BCGF)$ ؟
2. ما هو وضع المستقيم (EB) والمستوي $(AFGD)$ ؟
3. ما هو وضع المستقيم (EH) والمستوي $(AFGD)$ ؟
4. ما هو تقاطع المستقيم (HB) والمستوي $(AFGD)$ ؟

نشاط 7. الأوضاع النسبية لمستويين



الشكل $LKOPIJNM$ هو تمثيل لمتوازي مستطيلات بالمنظور متساوي القياس.

لاحظ وأجب عن الأسئلة الآتية:

1. اذكر مستويين متوازيين؟
2. اذكر مستويين متعمدين؟
3. ما هو الوضع النسبي للمستويين $(NOLI)$ و $(MJKP)$ ؟


الدرس

1. التمثيل بالمنظور متساوي القياس

المنظور متساوي القياس هو تقنية لتمثيل أشياء من الفضاء على سطوح مستوية (ورقة الكرّاس، سبورة، ...)، ومن قواعد هذه التقنية:

1. الخطوط المخفية (التي لا تُرى عند تصوّر رؤية المجسم) ترسم بخطوط مقطعة.
2. على مستوى الواجهة (مستوى الإسقاط) كل الخواص (التواري، التعامد، التصيف، استقامية النقط، ...)، والمقادير (الزوايا، المسافات بمقاييس، ...) محفوظة.
3. على جميع الأوجه كلّ من: استقامية النقط، والتواري، ومنتصف قطعة مستقيم، وكذا النسب بين قطع المستقيم المتوازية محفوظة.

مثال: تمثيل موشور قاعدته مثلث مقايس الأضلاع مرسوم عليه منصف إحدى زوايا القاعدة، مرّة بأخذ القاعدة في مستوى الواجهة، وأخرى بأخذ أحد الأسطح الجانبية في مستوى الواجهة.




ملحوظة: المستوى في المنظور متساوي القياس يمثل بمتوازي أضلاع.

2. المستقيم والمستوي في الفضاء



بديهية (1): إذا كانت نقطتان A و B متمايزتين فإنه يوجد مستقيم وحيد يشملهما.



- النقطتان A و B تعينان مستقيماً وحيداً، نرمز له بـ (AB) أو (BA) .



بديهية (2): إذا كانت ثلاثة نقاط A و B و C ليست في استقامية فإنه يوجد مستوى وحيد يشملها.

بديهية (3): إذا شمل مستوى نقطتين متمايزتين A و B فإنه يشمل كلّ نقطة المستقيم (AB) .

- النقط A و B و C تعين مستوى وحيد، نرمز له بـ (ABC) أو بـ (P) .
- تمثل المستوى في المنظور متساوي القياس بمتواري أضلاع.



نتيجة: يتعين المستوى

- إما بثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة.
- وإما بمستقيم ونقطة لا تتنمي إلى هذا المستقيم.
- وإما بمستقيمين متبايزين مقاطعين أو متوازيين.


- كلّ من:
 - النقط N و I و L
 - المستقيم (NI) والنقطة O
 - المستقيمان المتوازيان (OL) و (NI)
 - المستقيمان المقاطعان (OL) و (IL)
 - تعين نفس المستوى $(ONIL)$.

ملاحظة: كلّ خواص ونتائج الهندسة المستوية تبقى صحيحة في أي مستوى من الفضاء.


3. الأوضاع النسبية لمستويين – لمستقيمين – لمستقيم ومستوى.

• الأوضاع النسبية لمستويين

كلّ مستويين من الفضاء هما: إما مقاطعان وإما متوازيان.



المستويان (P) و (P') متوازيان
لَا توجد بين (P) و (P') أيّة نقطة للمستويين نفس النقطة.




كلّ نقط المستقيم (AB) مشتركة بينهما.


• الأوضاع النسبية لمستقيم ومستوى

كلّ مستقيم ومستوى من الفضاء هما: إما مقاطعان وإنما متوازيان.

المستوي (P) والمستقيم (D) متوازيان




كلّ نقط المستقيم تنتهي إلى
المستوي. (P) يحتوي على
 (D)



لا توجد بين (P) و (D) أيّة نقطة
مشتركة.

المستوي (P) والمستقيم (D)
متقاطعان




توجد بين (P) و (D) نقطة
مشتركة وحيدة O .

• الأوضاع النسبية لمستقيمين

كلّ مستقيمين من الفضاء هما:

- ↳ إما متقاطعان $\left\{ \begin{array}{l} \text{فهما من مستو واحد.} \\ \text{وإما متوازيان} \end{array} \right.$
- ↳ وإما ليسا من مستو واحد.

ليسا من مستو واحد




لا توجد بين (D) و (D') أيّة نقطة مشتركة.

(D) و (D') متوازيان




المستقيمان (D) و (D') =
متطابقان.

(D) و (D')
متقاطعان



لا توجد بين (D) و
 (D') أيّة نقطة
مشتركة.




توجد بين (D) و
 (D') نقطة مشتركة
وحيدة O .

4. التوازي في الفضاء:

• المستقيمات المتوازية في الفضاء

تعريف 1

المستقيمان المتوازيان في الفضاء هما
مستقيمان متطابقان، أو من نفس
المستوى وغير متقاطعين.



مثال: الشكل المقابل لموشور قائم قاعدته مثلث، نلاحظ فيه أنّ:
المستقيمين (D_1) و (D_2) متوازيان، والمستقيمين (D_2) و (D_3) و
متقاطعان، بينما المستقيمان (D_1) و (D_3) ليسا من مستو واحد.

خواص


1. يوجد مستقيم وحيد يشمل نقطة معلومة ويوازي مستقيماً معلوماً.

2. إذا قطع مستوى أحد مستقيمين متوازيين فإنه يقطع الآخر.

3. المستقيمان الموازيان لثالث متوازيان.

• المستويات المتوازية

تعريف 2



المستويان المتوازيان هما مستويان متطابقان، أو منفصلان (لا توجد بينهما أية نقطة مشتركة).

مثال: الشكل المقابل لمتوازي مستويات، نلاحظ فيه أنَّ المستويين $(BCIF)$ و $(ADHE)$ متوازيان، والمستويين $(DCIH)$ و $(ABFE)$ متوازيان، وكذلك $(ABCD)$ و $(EFIH)$.

خواص

1. يوجد مستوى وحيد يشمل نقطة معلومة ويوازي مستوى معلوماً.

2. إذا قطع مستقيم أحد مستويين متوازيين فإنه يقطع الآخر.


3. إذا قطع مستوى أحد مستويين متوازيين فإنه يقطع الآخر، ويكون مستقيماً التقادم متوازيان.

4. المستويان الموازيان لثالث متوازيان.

• المستقيمات والمستويات المتوازية

تعريف 3

يكون مستقيم ومستو متوازيين إذا كانا منفصلين (لا توجد بينهما أية نقطة مشتركة)، أو كان المستقيم محظياً في هذا المستوى.




مثال: الشكل المقابل لمكعب، نلاحظ فيه أنَّ المستقيم (AC) يوازي كلاً من المستويين $(EFGH)$ و $(ABCD)$ ، وكذلك المستقيم (BF) يوازي كلاً من المستويات $(BFGC)$ و $(AEHD)$ ، وكذلك المستقيم (HG) يوازي كلاً من المستويات $(AEHD)$ و $(BFEA)$.

خواص

1. يكون مستقيماً موازياً لمستوى إذا و فقط إذا كان موازياً لمستقيماً من هذا المستوى.
2. إذا كان مستقيماً يوازي أحد مستويين متوازيين فإنه يوازي المستوى الآخر.
3. إذا كان مستقيماً يوازي مستويين متقطعين فإنه يوازي مستقيمين متقطعهما.
4. يتوازى مستوىان إذا و فقط إذا أحدهما على مستقيمين متقطعين كلّ منهما يوازي المستوى الآخر.
5. المستويان الموازيان لثالث متوازيان.

٥. التّعَامِدُ فِيِ الْفَضَاءِ: • تعامد المستقيمات في الفضاء

تعريف 4



نقول عن مستقيمين أنّهما متعامدان إذا كانا موازيانهما المرسومان من نفس النقطة متعامدين.

مثال: الشكل المقابل لمكعب، نلاحظ فيه أن: المستقيمين (FG) و (DC) متعامدان، لأن (BC) و (DC) متعامدان، و (FG) و (BC) متوازيان و (DC) يوازي نفسه.


خواص

1. المستقيم العمودي على أحد مستقيمين متوازيين عمودي على الآخر.
2. المستقمان الموازيان لمستقيمين متعامدين متعامدان.

• تعامد المستقيمات والمستويات


تعريف 5

نقول عن مستقيم أنه عمودي على مستوى إذا كان هذا المستقيم عمودياً على كلّ مستقيمات هذا المستوى.



مثال: الشكل المقابل لمكعب، نلاحظ فيه أن: المستقيم (AD) عمودي على كلّ من المستقيمين (DC) و (DH) ، فهو عمودي على مستوييهما $(DCGH)$.

مبرهنة 1




إذا كان مستقيما عموديا على مستقيمين متقاطعين من مستوى فإنه عمودي على كل مستقيمات هذا المستوى.

خواص


		<ol style="list-style-type: none"> يوجد مستقيم وحيد يشمل نقطة معلومة ويعامد مستوى معلوما. يوجد مستوى وحيد يشمل نقطة معلومة ويعامد مستقيما معلوما.
		<ol style="list-style-type: none"> المستويان العموديان على نفس المستقيم متوازيان. المستقيمان العموديان على نفس المستوى متوازيان.
		<ol style="list-style-type: none"> المستقيم العمودي على أحد مستويين متوازيين عمودي على الآخر. المستوي العمودي على أحد مستقيمين متوازيين عمودي على الآخر.

• تعامد المستويات


تعريف 6



نقول عن مستويين أنهما متعامدان إذا شمل أحدهما مستقيما عموديا على الآخر




مثال: الشكل المقابل لمتوازي مستطيلات، على سبيل المثال نلاحظ فيه أن: كلا من المستويات $(ABCD)$ و $(CIFB)$ و $(ADHE)$ عمودي على المستوى $(DCIH)$.




1. المستوى العمودي على أحد مستويين متوازيين عمودي على الآخر.

خواص




2. إذا كان (P) و (P') مستويين متقاطعين وكان كلّ منهما عمودياً على مستوى ثالث (Q) فإنَّ مستقيم تقاطع المستويين (P) و (P') عمودي على المستوى (Q) .



تعريف 7
نقطتان متباينتان، نسمى مستويًا محوريًا للقطعة $[AB]$ المستوي العمودي على (AB) الذي يشمل منتصف $[AB]$.




ملاحظتان:




1. إذا كان (P) مستويًا محوريًا لقطعة المستقيم $[AB]$ ، فكلَّ مستقيم من المستوي (P) يشمل منتصف $[AB]$ هو محور لقطعة $[AB]$.
2. إذا كان (P) مستويًا محوريًا لقطعة المستقيم $[AB]$ ، فكلَّ محور لقطعة $[AB]$ محتوى في المستوي (P) .



مبرهنة 2
مجموعة نقط الفضاء المتساوية المسافة عن نقطتين متباينتين A ، B هي المستوي المحوري لقطعة المستقيم $[AB]$.

6. الحجوم (تذكير)

موشور قائم	متوازي مستطيلات	مكعب
 $V = h \times B$ حيث B مساحة القاعدة	 $V = a \times b \times c$	 $V = a^3$


اسطوانة دوران	مخروط	هرم
 $V = \pi \times r^2 \times h$	 $V = \frac{1}{3} h \times B$ حيث B مساحة القاعدة	 $V = \frac{1}{3} h \times B$ حيث B مساحة القاعدة

طرائق وتمارين محلولة

1. المستقيمات والمستوي في الفضاء

• تعريف مستوى

بَيْنَ أَنَّ الْمَسْتَوِيَ يَعْتَيَنُ



1. إِمَّا بِثَلَاثْ نَقْطَ لَيْسَ عَلَى اسْتَقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.
2. وَإِمَّا بِمَسْتَقِيمٍ وَنَقْطَةٍ لَا تَنْتَمِي إِلَيْهَا هَذَا الْمَسْتَقِيمُ.
3. وَإِمَّا بِمَسْتَقِيمَيْنِ مُتَماَيِّزَيْنِ مُتَقَاطِعَيْنِ أَوْ مُتَوَازِيْنِ.

حل

- نعتبر ثلث نقط ليست في استقامية A و B و C .
1. إنها تعين مستوى (P) وحيدا حسب البديهة رقم (2) نسميه (P) .
 2. النقطتان A و B تعينان مستقيما (AB) وحيدا حسب البديهة رقم (1) نسميه (AB) وهو محتوى في المستوى (P) حسب البديهة رقم (3)، والنقطة C لا تنتمي إلى (AB) . المستوى (P) يعين بالمستقيم (AB) والنقطة C .
 3. المستقيمان (AB) و (BC) متقطعان ومحتويان في المستوى (P) ، المستوى (P) يعين بالمستقيمين (AB) و (BC) .
- يوجد في المستوى (P) مستقيم وحيد (D) يشمل النقطة C ويواري المستقيم (AB) . المستوى (P) يعين بالمستقيمين (AB) و (D) .

تعاليف


- يوجد مستوى وحيد يشمل ثلاثة نقط A و B و C لست في استقامية.
- يوجد مستقيم وحيد يشمل نقطتين متمايزتين A و B .
- إذا اشترك مستقيم ومستوى في نقطتين فإن المستقيم محتوى في المستوى.

طريقة

لتعيين مستوى يكفي أن نذكر منه

1. ثلث نقط ليست على استقامه واحدة.
2. مستقيما ونقطة لا تنتمي إلى هذا المستقيم.
3. مستقيمان متمايزان متقطعان أو متوازيان.

• تمثيل بالمنظور المتساوي القياس، مستقيمان غير متقطعين، مستقيم محتوى في مستوى



- و D و C و B و A أربع نقط بحيث النقطة A لا تنتمي إلى المستوى (BDC) . النقطة A' هي نظيره النقطة A بالنسبة إلى (CD) ، ممثلة في الشكل المقابل.
1. هل الوجه (ADC) يقع في مستوى الواجهة؟ برر جوابك.
 2. بين أن المستقيمان (AC) و (BD) غير متقطعين.
 3. بين أن المستقيم $(A'D)$ محتوى في المستوى (ACD) .

حل

1. الوجه (ADC) لا يقع في مستوى الواجهة، لأن الزاوية AMD في الحقيقة قائمة وهي ممثلة بزاوية غير قائمة.
2. لو كان المستقيمان (AC) و (BD) متقطعين، فهما يعینان مستقيما (AC) و (BD) متقطعين، حسب النتيجة أعلاه يشمل النقط الأربع A و B و C و D ، وهذا يناقض الفرض، ومنه المستقيمان (AC) و (BD) غير متقطعين.

تعاليف

- في التمثيل بالمنظور المتساوي القياس على مستوى الواجهة كل الخواص والمقدار محفوظة.


3. المستوي (ACD) يحتوي على النقطة D ، يكفي إذا إثبات أنَّ النقطة A' تنتهي إلى المستوي (ACD) : المستقيمان (AA') و (CD) متقاطعان فهما يعینان مستوياً وحيداً هو المستوي (ACD) لأنَّ المستوي (ACD) يشمل (CD) ، ومنه النقطة A' تنتهي إلى المستوي (ACD) يشمل (ACD) أي أنَّ المستوي (ACD) يشمل المستقيم $(A'D)$.

طريقة

لإثبات أنَّ مستقيماً محتوى في مستوٍ يكفي إثبات أنَّ المستوي يحتوي نقطتين متمايزتين من هذا المستقيم.

2. الأوضاع النسبية: مستقيمات ومستويات

الشكل المقابل هو لمتوازي مستطيلات $ABCDEFGH$ ، النقطتان M و N منتصفان القطعتين $[AB]$ و $[BF]$ على الترتيب .



1. حدد الوضع النسبي للمستقيم والمستوي في كل حالة وبرر جوابك:

أ) (EN) و (ABC) ب) (MN) و (HDC) ج) (AEF) و (MN)

2. حدد الوضع النسبي للمستقيمين في كل حالة وبرر جوابك:

أ) (EF) و (MN) ب) (AE) و (FB) ج) (EB) و (DC)

3. حدد الوضع النسبي للمستويين في كل حالة وبرر جوابك:

أ) (HMN) و (ABF) ب) (ADE) و (ABC) ج) (ABF) و (ABC)

حل

تعليق

1. أ) المستقيم (EN) والمستوي (ABC) متقاطعان، لأنَّ المستقيمين (AB) و (EN) من نفس المستوي و غير متوازيين فهما متقاطعان، ونقطة تقاطعهما تنتهي إلى المستوي (ABC) لأنها تنتهي إلى المستقيم (AB) ، لكنَّ المستوي (ABC) لا يشمل المستقيم (EN) لأنَّه لا يشمل النقطتين E و N . ومنه المستوي (ABC) يشتراك مع (EN) في نقطة ولا يشله، فهما متقاطعان.

- المستقيمان غير المتوازيين على الرسم غير متوازيين في الحقيقة.

ب) المستقيم (MN) والمستوي (HDC) متوازيان، لأنَّ المستقيم (MN) محتوى في المستوي (AEB) الوجه المقابل للوجه (HDC) في متوازي المستطيلات، وبالتالي لا توجد أية نقطة مشتركة بين المستقيم (MN) والمستوي (HDC) .

- المستقيمان غير المتعامدين على الرسم ليس بالضرورة غير متعامدين في الحقيقة.

ج) المستقيم (MN) محتوى في المستوي (AEF) لأنَّ النقطتين M و N تنتهيان إلى المستوي (AEF) .

- البحث عن النقط المشتركة بين المستقيمات والمستويات وسيلة معايدة لمعرفة الوضع النسبي لها.

2. أ) المستقيمان (EF) و (MN) من نفس المستوي وغير متوازيين فهما متقاطعان.

ب) المستقيمان (AE) و (FB) متوازيان، لأنَّهما حاملاً ضلعين متقابلين في متوازي مستطيلات.

- كلَّ خواص ونتائج الهندسة المستوية تبقى صحيحة في أي مستوى من الفضاء.

ج) المستقيمان (EB) و (DC) ليسا من نفس المستوي، لأنَّ المستقيم (DC) لا يشمل النقطة B ، فهو يعین معها مستوى (BCD) يقطعه المستقيم (EB) في النقطة B لأنَّ النقطة E لا تنتهي إلى المستوي (BCD) .

3. أ) المستويان (ABC) و (EFH) متوازيان، لأنهما وجهان متقابلان لمتوازي مستطيلات (لا توجد بينهما أية نقطة مشتركة).

ب) المستويان (ADC) و (ADE) متقاطعان، لأنهما يشتركان في نقطتين A و D وهما غير منطبقين (توجد نقطة تتنمي إلى أحدهما ولا تتنمي إلى الآخر).

يقطع المستويان (ADC) و (ADE) في المستقيم (AD) .

ج) المستويان (ABF) و (HMN) متقاطعان، لأنهما يشتركان في نقطتين N و M وهما غير منطبقين (توجد نقطة تتنمي إلى أحدهما ولا تتنمي إلى الآخر). يقطع المستويان (ABF) و (HMN) في المستقيم (MN) .

طرائق

- لإثبات أنَّ مستقيماً غير محتوى في مستوى يكفي إثبات أنَّ المستوى لا يشمل نقطة على الأقل من هذا المستقيم.
- لإثبات أنَّ مستقيمين متقاطعان في الفضاء يكفي إثبات أنَّهما من نفس المستوى وغير متوازيين.
- لإثبات أنَّ مستويين متقاطعان يكفي إثبات أنَّهما غير منطبقين ويشتركان في نقطة. عندئذ نستنتج أنَّهما متقاطعان في مستقيم يشمل هذه النقطة.

3. التوازي: مستقيمات ومستويات

• كيف نبين أنَّ مستقيمات أو مستويات متوازية

الشكل المقابل هو لمتوازي مستطيلات $ABCDEFGH$ ، النقط M و N و O و P منتصفات القطع $[AE]$ و $[BF]$ و $[CG]$ و $[DH]$ على الترتيب.

- 1) بين أنَّ المستقيم (MN) يوازي المستوى $(DCGH)$.
 - 2) بين أنَّ النقط M و N و C و D هي من نفس المستوى.
 - 3) بين أنَّ المستويين (MNC) و (EFO) متوازيان.
-

حل

تعاليق

1. المستقيم (MN) محتوى في الوجه $(ABEF)$ الموازي للوجه $(DCGH)$ ، ومنه لا يوجد أية نقطة مشتركة بين (MN) والمستوى $(DCGH)$ ، فهما متوازيان.

2. لدينا: $(AB) \parallel (MN)$ لأنَّ $ABNM$ مستطيل، و $(DC) \parallel (MN)$ لأنَّ $ABCD$ مستطيل، ومنه $(MN) \parallel (DC)$. وبالتالي النقط M و N و C و D تتنمي إلى نفس المستوى (MND) .

3. - المستقيمان (MN) و (NC) متقاطعان وهما من المستوى (MNC) .

- و $(EF) \parallel (MN)$ لأنَّ $MNFE$ مستطيل، ومنه (MN) يوازي المستوى (EFO) .

- و $(NC) \parallel (OF)$ لأنَّ $NCOF$ متوازي أضلاع، ومنه (NC) يوازي المستوى (EFO) .

بما أنَّ المستقيمان (MN) و (NC) متقاطعان وكل منها يوازي المستوى (EFO) ، فإنَّ المستويين (MNC) و (EFO) متوازيان.

- يكون مستقيم يوازي مستوى إذا لم يشترك معه في أيَّة نقطة، أو كان هذا المستقيم يوازي مستقيماً من المستوى.

- كلَّ وجهين متقابلين في متوازي المستطيلات يمثلان مستويين متوازيين.


طريق

- لإثبات أنَّ أربع نقاط مثل M و C و N و D هي من نفس المستوى يكفي إثبات أنَّها تنتمي إلى مستقيمين متوازيين.
- لإثبات أنَّ مستويين متوازيان نثبت أنَّ أحدهما يحتوي على مستقيمين متقاطعين كلَّ منهما يوازي المستوى الآخر.

• كيف نبين وحدانية وجود مستقيم


بَيْنَ أَنَّهُ يوجَدُ فِي الْفَضَاءِ مَسْتَقِيمٌ وَحِيدٌ يَشْمَلُ نَقْطَةً مَعْلُومَةً وَيَوْاْزِي مَسْتَقِيمًا مَعْلُومًا.

حل



نَمِيزُ حَالَتَيْنَ:

- إذا كانت النقطة A تنتمي إلى المستقيم (D) . فإنَّ المستقيم الوحيد الذي يشمل A ويواري (D) هو المستقيم (D) نفسه.



- إذا كانت النقطة A لا تنتمي إلى المستقيم (D) ، فإنَّ (D) و A يعيّنان مستوىً واحداً في المستوى (P) يوجد مستقيم وحيد (D') يشمل A ويواري (D) .

تعاليق


- الفرض:** (D) مستقيم و A نقطة معروفة.

- المطلوب:** وجود مستقيم وحيد (D') يشمل A ويواري (D) .

طريقة

- نوظف خواص ونتائج الهندسة المستوىية لأنَّها تبقى صحيحة في أي مستوى من الفضاء.

4. التعامد: مستقيمات ومستويات



- مستقيم عمودي على مستوى** $ABCDEF$ مكعب، L نقطة من $[AB]$ ، و (A) مستقيم عمودي = (LC) ويشمل D .
- 1. **بَيْنَ أَنَّ** (A) عمودي على المستوى (LCG) .
- 2. **عَيْنَ** المستقيم (A) و المستوى (LCG) في كلَّ من الحالتين:
 - L تتطابق على A
 - L تتطابق على B


حل

- لنبيَّنْ أَنَّ المستقيم (A) عمودي على المستوى (LCG) .
- بما أنَّ (A) عمودي على (LC) ، لتبين أنَّ (A) عمودي على المستوى (LCG) يكفي أنَّ نبيَّنْ أَنَّ (A) عمودي على مستقيم من المستوى (LCG) يقطع (LCG) .

تعاليق


- المستقيمان المتعامدان في الفضاء ليس بالضرورة متقاطعين.

لدينا المستقيم (CG) عمودي على كلَّ من المستقيمين (DC) و (BC) ، ومنه فهو عمودي على مستوىهما $(ABCD)$ ، وبالتالي فهو عمودي على كلَّ مستقيم من المستوى $(ABCD)$ ، أي (CG) عمودي على (A) . بما أنَّ (A) عمودي على كلَّ من (LC) و (CG) فهو عمودي على مستوىهما (LCG) .




.2

- أ) لما تطبق النقطة L على النقطة A فإن $(LCG)=(ACGE)$ و $(\Delta)= (DB)$
- ب) لما تطبق النقطة L على النقطة B فإن $(LCG)=(BCGF)$ و $(\Delta)= (DC)$



طريقة

- لتبين أنَّ مستقيماً عمودي على مستوى نبيَّن أنَّه عمودي على مستقيمين متقاطعين في هذا المستوى.



• مستقيم عمودي على مستقيم

رباعي وجوه حيث (AB) عمودي على (CD) . (AH) عمودي على (CD) . الارتفاع المتعلق بالقاعدة BCD . بين أنَّ (CD) و (BH) متعامدان.

حل

لنبيَّن أنَّ المستقيم (CD) عمودي على المستوى (ABH) .
لدنيا (AH) عمودي على المستوى (BCD) ، فهو عمودي على كلَّ مستقيم فيه، ومنه (AH) عمودي على (CD) ، و (AB) عمودي على (CD) فرضاً.

المستقيمان المتعامدان من نفس المستوى متقاطعان.


ومنه (CD) عمودي على مستقيمين متقاطعين (AH) و (AB) فهو عمودي على مستويهما (ABH) . وبالتالي (CD) عمودي على (BH) .

طريقة

- لتبين أنَّ مستقيمين متعامدان يمكن أنَّ نبيَّن أنَّ أحدهما عمودي على مستوى يحتوي على الثاني.

- بين أنَّه: إذا كان (P) و (P') مستويان متقاطعين، وكان كلَّ منها عمودياً على مستوى ثالث (Q) ، فإنَّ (D) مستقيم تقاطع المستويين (P) و (P') عمودي على المستوى (Q) .

حل



المستويان المتقاطعان في نقطة هما إما منطبقان، وإما متقاطعان في مستقيم يشمل هذه النقطة.

طريقة

- يمكن الانطلاق من مستقيم معين عمودي على المستوى (Q) ، وإثبات أنه هو تقاطع المستويين (P) و (P') .
- بما أنَّ المستوى (P) والمستقيم (P) عموديان على (Q) ، و (D) يشمل نقطة من (P) ، فإنَّ (D) محظوظ في (P) .

تعلم البرهنة

الهدف: اكتساب كيفية للبرهان على الوجود والوحدانية واستعمال البرهان بالخلف.

مسألة: (P) مستوي و A نقطة معلومان. بين أنه يوجد مستوى وحيد (P') يشمل النقطة A ويوازي المستوى (P) .
عنصر تكير حول الحل:

- المعطيات: (P) مستوي و A نقطة معلومان
- المطلوب: نميز في المطلوب عنصرين: 1. نبين أنه يوجد مستوى (P') يشمل A ويوازي (P) .
2. نبين وحدانية هذا المستوى.

• لإثبات وجود المستوى (P')

نفك في تعين المستوى (P') بأخذى الطرائق المقدمة في الفقرة 2 من الدرس.
وفي هذه الحالة الأنسب هو تعينه بمستقيمين متناقضين.

• لإثبات وحدانية المستوى (P')

نفرض أن المستوى (P') ليس وحيدا، ونبين أن هذا يؤدي إلى تناقض.


أي نفرض أنه يوجد مستوى آخر (P'') يحقق نفس شروط المستوى (P) (أي يشمل A ويوازي (P)), ثم نبين أن المتساوين (P) و (P'') متطابقان، أو أن هذا الفرض يؤدي إلى تناقض.

وفي هذه الوضعية ستبين أن المتساوين (P) و (P'') متطابقان، وذلك بتبيين أنهما مشتركان في نقطة لا تتبع إلى مستقيم تقاطعهما.

• برهان:


نميز حالتين:

أ) إذا كانت النقطة A تتبع إلى المستوى (P) , فإن المستوى الوحيد الذي يشمل A ويوازي (P) هو المستوى (P) نفسه.



ب) إذا كانت النقطة A لا تتبع إلى المستوى (P) .


• ثبت أولاً أنه يوجد مستوى A ويوازي (P) .



بالفعل: لتكن (D) و (D') مستقيمين من (P) متناقضين في النقطة B .
المستقيمان (D) و (D') اللذان يشتملان النقطة A والموازيان للمستقيمين (D) و (D') على الترتيب يعنيان مستوى (P') يوازي (P) .

• لإثبات وحدانية المستوى (P') .

نفرض أنه يوجد مستوى (P'') يشمل A ويوازي (P) لتكن C نقطة من (P'') لا تتبع إلى مستقيم تقاطع المتساوين (P) و (P'') , ولتكن B نقطة من (P) .



- لدينا من ناحية المستوى (ABC) يقطع المتساوين (P) و (P'') في مستقيمين متوازيين (AC) وآخر يشمل النقطة B نسميه (D) .

- ومن ناحية أخرى المستوى المعين بالمستقيم (D) والنقطة A وهو المستوى (ABC) نفسه يقطع المتساوين (P) و (P'') في مستقيمين متوازيين (D) وآخر يشمل النقطة A نسميه (D') .

أصبح في المستوى (ABC) مستقيمان (D) و (D') يوازيان نفس المستقيم (D) ويشتملان نفس النقطة A , فهما متطابقان.

ومنه **النقطة C تتبع إلى (P')** .

وبالتالي المستوى (P) و (P'') متطابقان.

نستخلص مما سبق أنه: يوجد مستوى وحيد (P') يشمل النقطة A معلومة ويوازي مستوى معلوما (P) .
خلاصة

لإثبات الوحدانية نفرض أنه يوجد عنصران يتحققان نفس الشروط (أو الخواص)، ثم نبين أن هذين العنصرين متساويان، أو أن هذا الفرض يؤدي إلى تناقض.


إعادة استئمار

مستوي و A نقطة معلومان. بين أنه يوجد مستوى وحيد (P') يشمل النقطة A ويعادل المستوى (P) .

حل مسألة إدماجية

المسألة المعالجة مؤلفة من جزأين:

الجزء الأول: $ABCDEFGH$ مكعب طول حرفه 5cm ، النقط L و M و N و O و L' و M' و N' و O' متنصفات أحرفه $[AB]$ و $[BF]$ و $[FE]$ و $[EA]$ و $[DC]$ و $[CG]$ و $[GH]$ و $[HD]$ على الترتيب.



1. ما نوع المجسم $ALCDENGH$? برر جوابك.

2. ارسم تمثيلا بالمنظور متساوي القياس وتصميميا للمجسم $.ALCDENGH$

3. عين تقاطع المستوى (LNM') مع كل وجه من أوجه المكعب.

4. النقطان I و J متنصفا القطعتين $[FG]$ و $[BC]$ على الترتيب، بين أن المستويين $(DJIH)$ و $(LN'M')$ متامدان، وعين تقاطعهما.

5. ما نوع المجسم $LMONL'M'N'O'$? احسب حجمه.

6. بين أن المستقيمات (AG) و (EC) و (FD) و (BH) و (LN') و (MO') و (NL') و (OM') متقاطعة في نقطة واحدة.



حل

1. المجسم $ALCDENGH$ هو موشور قائم قاعدته $ALCD$ شبه منحرف قائم ، لأن كلا من

$ENGH$ شبه منحرف قائم، ومستوياهما متوازيان (سطحان متقابلان في مكعب)، وكل منها

عمودي على المستويات $(AENL)$ و $(NGCL)$ و $(AEHD)$ و $(ENGH)$ و (FD) و (EC) .

2. تمثيل وتصميم المجسم $.ALCDENGH$



3. تقاطع المستوى (LNM') مع كل وجه من أوجه المكعب:

المستويان $(LN'M')$ و $(ABFE)$ يشتراكان في النقطتين L و N وغير منطبقين فهما متقاطعان في المستقيم (LN') .


أ. لدينا $(LN) \parallel (CG)$ لأن $(LN) \parallel (BF) \parallel (CG)$ (مربيع $BFGC$)، ومنه التقantan C و G تنتمان إلى المستوى (LNM') .

بـ المستويان (LNM') و $(DCGH)$ يشتراكان في التقantan C و G وغير منطبقين فهما متقاطعان في المستقيم (CG) .


بـ المستويان (LNM') و $(BCGF)$ يشتراكان في التقantan C و G وغير منطبقين فهما متقاطعان في المستقيم (CG) .

بـ المستويان (LNM') و $(ABCD)$ يشتراكان في التقantan L و C وغير منطبقين فهما متقاطعان في المستقيم (LC) .

بـ المستويان (LNM') و $(EFGH)$ يشتراكان في التقantan N و G وغير منطبقين فهما متقاطعان في المستقيم (NG) .



ب. المستقيمان (AD) و (LC) من المستوى ($ABCD$) وغير متوازيين، لتكن S نقطة تقاطعهما. المستقيمان (NG) و (EH) من المستوى ($EFGH$) وغير متوازيين، لتكن R نقطة تقاطعهما. القطنان S و R تنتهي إلى كل من المستويين (LNM') و ($ADHE$) غير المنطبقين، ومنه فالمستويان (LNM') و ($ADHE$) متقاطعان في المستقيم (SR).




4. لإثبات أن المستويين (LNM') و ($DJIH$) متعامدان يكفي إثبات أن المستقيم (DJ) عمودي على المستوى (LNM') ومن أجل ذلك سنثبت أن (DJ) عمودي على كل من (LC) و (CG) من المستوى (LNM'):

نسمى T نقطة تقاطع (DJ) و (LC). من $BC=CD$ و $LB=JC$ نستنتج أن المثلثين LBC و JCD متقاريان و منه $BCL=CJD$ و $BLC=CJD=90^\circ$. وبما أن $BLC+BCL=90^\circ$ فإن $CJD+BCL=90^\circ$ فإن CTJ قائم في T ، أي أن (DJ) عمودي على (LC).

ال المستقيم (CG) عمودي على كل من (CB) و (CD) فهو عمودي على مستويهما ($ABCD$)، وبالتالي فهو عمودي على كل مستقيم في هذا المستوى، ومنه (CG) عمودي على (DJ). ومنه (DJ) عمودي على كل من (LC) و (CG) فهو عمودي على المستوى (LNM') ومنه المستويان (LNM') و ($DJIH$) متعامدان.

نقطة تقاطع المستويين (LNM') و ($DJIH$): النقطة T تقاطع (DJ) و (LC) تنتهي إلى كل من المستويين ($DJIH$) و (LNM')، وكذلك النقطة V تقاطع (HI) و (NG)، ومنه المستويان (LNM') و ($DJIH$) متقاطعان في المستقيم (TV).



$$EB = \sqrt{EF^2 + BF^2} = \sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$$



$$MN = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

وبنفس الطريقة نجد أن $O'N'M'L'$ مربع طول ضلعه $\frac{5\sqrt{2}}{2}$

لدينا المستقيم (LL') عمودي على كل من المستقيمين ($L'N'$) و ($L'C$) ومنه فإن كلا من المستويين ($LL'O'O'$) و ($LL'M'M'$) عمودي على المستوى ($O'L'M'N'$).

وبما أن المستويين ($OLMN$) و ($O'L'M'N'$) متوازيان فإن الم Prism $LMONL'M'N'N'O'$ موشور قائم قاعدته مربع حجم الموشور $LMONL'M'N'N'O'$ يساوي:

$$V = \frac{5\sqrt{2}}{2} \times \frac{5\sqrt{2}}{2} \times 5 = 62,5 \text{ cm}^3$$




6. الرباعي $ADGF$ مستطيل لأن $(AD) \parallel (FG)$ و $(DG) \parallel (AD)$ متعامدان. ومنه قطران $[AG]$ و $[FD]$ متقاطسان ... (1)

وكذلك الرباعي $AEGC$ مستطيل لأن $(AE) \parallel (CG)$ و $(EG) \parallel (AE)$ متعامدان. ومنه قطران $[AG]$ و $[EC]$ متقاطسان ... (2)



وبنفس الطريقة نبين أن $[EC]$ و $[HB]$ لهما نفس المنتصف ... (3)

من (1) و (2) و (3) نجد أن $[AG]$ و $[EG]$ و $[FD]$ لها نفس المنتصف... (4)
الرابع $AOGM'$ متوازي أضلاع، لأن $AO=GM'$ و $(GM')\parallel(AO)$ ومنه قطراء $[AG]$ و $[OM']$
متناصفان ... (5)
وبنفس الطريقة نبين أن $[AG]$ و $[LN']$ لها نفس المنتصف و $[HB]$ و $[MO']$ لها نفس المنتصف
و $[FD]$ و $[NL']$ لها نفس المنتصف و ... (6)
من (4) و (5) و (6) نجد أن $[AG]$ و $[FD]$ و $[EG]$ و $[HB]$ و $[LN']$ و $[MO']$ و $[NL']$ و ...
لها نفس المنتصف وهو مركز المكعب ... (4)

الجزء الثاني: $ABCDEFGH$ مكعب طول حرفه $5cm$ ، النقط L و M و N و O منتصفات أحرفه

[EA] و [BF] و [AB] على الترتيب.
1. احسب المساحة الكلية وحجم المنشور $ALCDENGH$ ؟
2. تحقق من أن المثلث DCF قائم، واحسب DF ، وجيب تمام الزاوية FDC ، ثم باستعمال الآلة الحاسبة وأخذ المدور إلى الدرجة احسب FDC .
3. بين أن المثلث EDG متقارن الأضلاع، واحسب مساحته.
4. لتكن النقطة R تقاطع المستقيمين (OM) و (NL) ما نوع المجسم $RDCGH$ ؟ احسب حجمه، وقارنه بحجم المكعب.
. $AT = \frac{2}{5}CF$ حيث CF ، احسب الطول T . 5

حل

1. المنشور القائم $ALCDENGH$ قاعدته شبه منحرف قائم $ADCL$ ، وارتفاعه AE




المساحة الكلية تساوي مجموع مساحتي القاعدين والمساحة الجانبية.

$$S_1 = 2 \times \left(\frac{(2,5+5) \times 5}{2} \right) = 37,5 \text{ cm}^2$$

لحساب المساحة الجانبية نحسب أولا الطول:

الموازي للمستقيم (AD) و يقطع (DC) في نقطة نسميها L_1 . المثلث LL_1C قائم في L_1 وفيه $LL_1=5 \text{ cm}$ ومنه $CL_1=2,5 \text{ cm}$:



$$LC = 5,6 \text{ cm} \quad LC^2 = L_1C^2 + L_1L^2 = (2,5)^2 + (5)^2 = 31,25$$

المساحة الجانبية:

$$S_2 = 5 \times (2,5 + 5 + 5,6) = 90,5 \text{ cm}^2$$

ومنه المساحة الكلية هي :


$$S = S_1 + S_2 = 37,5 + 90,5 = 98 \text{ cm}^2$$

حجم المنشور القائم يساوي جداء مساحته قاعدته وارتفاعه

$$\text{مساحة القاعدة } S = \frac{(5 + 2,5) \times 5}{2} = 18,75 \text{ cm}^2 \text{ ، ومنه الحجم يساوي}$$

$$V = 18,75 \times 5 = 93,75 \text{ cm}^3$$

2. المثلث DCF قائم في C لأن المستقيم (DC) عمودي على المستوى $(BCGF)$ فهو عمودي على $\cdot(CF)$



حساب $:DF$

$$DF^2 = DC^2 + CF^2 = DC^2 + (CG^2 + GF^2) = 75$$


ومنه $DF = 8,66 \text{ cm}$

$$\cos FDC = \frac{DC}{DF} = \frac{5}{8,66} \approx 0,577$$

وباستعمال الآلة الحاسبة وأخذ دورن التاج إلى الدرجة نجد $FDC = 55^\circ$

3. أضلاع المثلث EDG هي أقطار في مربعات متقايسة فهي متقايسة، ومن المثلث EDG متقايس EDG للأضلاع.

بما أن المثلث EDG متقايس الأضلاع فإن الارتفاع المتعلق بالقاعدة منصف لها.



$$\frac{5\sqrt{2}}{2}$$

ليكن EC_1 الارتفاع المتعلق بالقاعدة $[DG]$ ، إن $DG = \frac{1}{2}DG$ أي

ومنه $DC_1 =$

$$EC_1 = \sqrt{ED^2 - DC_1^2} = \sqrt{50 - \frac{25}{2}} = 5\sqrt{\frac{3}{2}}$$

ومنه مساحة المثلث EDG تساوي $S = \frac{1}{2} \times 5\sqrt{\frac{3}{2}} \times 5\sqrt{2} = 12,5\sqrt{3} \approx 21,65 \text{ cm}^2$


4. المجسم $RDCGH$ هو هرم قاعدته المربع $DCGH$ ورأسه النقطة R (نقطاع (OM) و (LN)) وارتفاعه RS حيث النقطة S هي نقطة تقاطع قطرى قاعده.

حجم الهرم $RDCGH$ يساوى

$$V = \frac{1}{3} \times 5 \times 5 \times 5 = 41,67 \text{ cm}^3$$

حجم المكعب يساوى $V' = 5 \times 5 \times 5 = 125 \text{ cm}^3$

نلاحظ أن حجم الهرم $RDCGH$ يساوى ثلث حجم المكعب




5. لحساب الطول AT (نجعله في مثلث قائم على سبيل المثال). نرسم المستقيم الذي يشمل النقطة T ويوازي (BF) فيقطع $[BC]$ في نقطة V سمّيّها V .

إن المثلث AVT قائم في V لأن $(VT) \parallel (BF)$ و (BF) عمودي على المستوى $(ABCD)$.

يكفي عندئذ حساب VT و BV بتطبيق نظرية طالس في المثلث BCF ، وحساب AV من المثلث القائم AVT .

حساب VT و BV :



$$CV = \frac{2}{5}CB = 2 \text{ cm} \quad \text{و} \quad VT = \frac{2}{5}BF = 2 \text{ cm} \quad \text{ومنه} \quad \frac{CT}{CF} = \frac{CV}{CB} = \frac{VT}{BF} = \frac{2}{5}$$

لدينا $CT = 2 \text{ cm}$ ولدينا $VT = 2 \text{ cm}$ ومنه $AV = \sqrt{AT^2 - VT^2} = \sqrt{AT^2 - 4} = \sqrt{41} \text{ cm}$


$$AV^2 = AB^2 + VB^2 = 41 \text{ cm}^2 \quad \text{ومنه} \quad AV = \sqrt{41} \text{ cm}$$

$$AT = \sqrt{AV^2 + VT^2} = \sqrt{41 + 4} = \sqrt{45} \text{ cm}$$

تمارين وسائل

أصحيح أم خطأ؟

14. إذا كان مستويان متوازيان تماماً، فكل مستقيم من أحدهما يوازي المستوي الآخر.
15. من نقطة معلومة في الفضاء يمكن رسم:
- مستقيم وحيد عمودي على مستقيم معلوم.
 - مستقيم وحيد يوازي مستقيماً معلوماً.
 - مستقيم وحيد يوازي مستوي معلوماً.
 - مستوى وحيد عمودي على مستوى معلوماً.




16. الشكل المقابل هو تمثيل بالمنظور متساوي القياس لجزء مقطوع من مكعب طول حرفه 6 cm، ارسم تمثيلاً للجزء الآخر.

17. إذا كانت A, B, C, D أربع نقاط ليست من نفس المستوى، و M نقطة من $[AB]$ و N نقطة من $[AC]$ كما في الشكل فإن:

- المستقيم (AC) يقطع المستقيم (BD) .
- المستقيم (MN) يقطع المستقيم (CD) .
- المستقيم (MN) محظوظ في المستوى (ABC) .
- المستقيم (MN) يقطع المستوى (BCD) في النقطة S .

التمثيل بالمنظور متساوي القياس

18. $ABCD$ رباعي وجوه حيث الوجه (ABC) يقع في مستوى الواجهة (انظر الشكل المقابل).




- a. بين أنّ الناظر يقع تحت $[BC]$ والنقطة تقع A وفق $[BC]$.
- b. تحقق من أنّ المثلث ABC هو في الحقيقة مثلث قائم ومتتساوي الساقين.

- c. ارسم تمثيلاً لنفس المجسم باعتبار الناظر والنقطة A يقعان فوق $[BC]$.

1. في تمثيل المجسمات باستعمال المنظور متساوي القياس:

- المستقيمان المتوازيان على الرسم يمثلان مستقيمين متوازيين في الحقيقة.
- المستقيمان المتقاطعان على الرسم يمثلان دواماً مستقيمين متقاطعين في الحقيقة.
- الزاوية القائمة على الرسم تمثل دواماً زاوية قائمة في الحقيقة.
- الدائرة على الرسم تمثل دواماً دائرة في الحقيقة.



في التمارين من 2 إلى 11 نعتبر الشكل المقابل، وهو تمثيل لمكعب بالمنظور متساوي القياس، و M نقطة من $[CF]$ و N نقطة من $[BC]$.

2. الناظر والنقطة A يقعان فوق المستوى $(DCGH)$.
3. السطح $ABCD$ يقع في مستوى الواجهة.

4. المستقيم (MN) غير محظوظ في المستوى (BGF) .

5. النقط B, F, M, N, G تعين نفس المستوى.

6. المستقيمان (MN) و (DE) متوازيان.

7. المستقيمان (AF) و (AD) متعامدان.

8. المستقيم (MN) يقطع المستوى $(HGEF)$.


9. المستقيم (MN) عمودي على المستوى $(HGEF)$.

10. المستويان (DBE) و (HCF) متوازيان.

11. المستويان (EBH) و (AFG) متعامدان.

12. كلّ مستقيمين موازيين لنفس المستوى متوازيان.


13. يمكن لمستقيمين عموديين على نفس المستقيم ألا يكونا من نفس المستوى.



- أ. أي مجسم يمثله الجزء المقطوع؟
ب. أي جزء منه يقع في مستوى الواجهة.
ج. أنجز تمثيلاً للجزء المقطوع وتصميماً له.


23. أ. باستعمال المنظور متساوي القياس ارسم تمثيلاً لهم مننظم $ABCDEFG$ رأسه A ، وطول حرفه 6cm ، وقاعدته سداسي منتظم طول ضلعه 2cm ، وبحيث يقع أحد أسطحه الجانبية في مستوى الواجهة.
ب. علم النقط I ، J ، K ، L ، M ، N ، O ، P ، Q ، R ، S ، T ، U ، V ، W ، X ، Y ، Z منتصفات أحرفه، ما نوع المجسم $? BCDEFGIJKLMNOP$

24. الأشكال الآتية مكونة من مثلثات متقايسة الأضلاع وهي تصاميم لمجسمات. أنجز تمثيلاً لكل منها، ثم شكل المجسم وارسم تمثيلاً له بالمنظور متساوي القياس.



الأوضاع النسبية لكل من مستويين، مستقيمين مستقيم ومستوى

25. الشكل المقابل هو تمثيل بالمنظور متساوي القياس لمتوازي مستطيلات $ABCDEFGH$.
نقطة من $[BC]$ و N نقطة من $[BF]$.
اذكر الوضع النسبي - مع تبرير الجواب -
لكل من:




19. $ABCD$ رباعي وجوه منتظم (أحرفه متقايسة)، النقطة I منتصف $[AD]$ (انظلا الشكل المقابل).

أ. تحقق من أنَّ الوجه (ABC) يقع في مستوى الواجهة.

ب. انقل الشكل وارسم المستقيم (D) الموازي (BD) الذي يشمل I


ج. علم النقطتين M و N منتصفى $[BC]$ و $[CD]$ على الترتيب
ماذا يمثل كلٌ من:
1. المستقيم (AM) بالنسبة للمثلث ABC
2. المستقيم (AN) بالنسبة للمثلث ACD

20. كلٌ من الأشكال الآتية هو بداية لتمثيل متوازي مستطيلات بالمنظور متساوي القياس، مطلوب منك نقل الشكل وإكماله.




21. الشكلان مرسومان باستعمال تقنية المنظور متساوي القياس، اكتشف الأخطاء المركبة في كلٍ منها.

مكعب




رباعي وجوه منتظم



22. قطعة خشبية على شكل متوازي مستطيلات، قطعنا منها جزء ممثلاً بالشكل الملون (انظر الشكل أدناه).

ما هو عدد المستويات وعدد المستقيمات التي تعينها هذه النقطة.

.32. A, B, C, D أربع نقاط ليست من نفس المستوى، L نقطة من $[AB]$ و S نقطة من



.33. $ABCD$ رباعي وجوه ، وال نقطتان L و M منتصفان $[AC]$ و $[AB]$ على الترتيب ، و N نقطة من $[AD]$ حيث $AD=6AN$ ، ارسم شكلاً مناسباً، ثم أجب عن الأسئلة الآتية:
أ. هل المستقيم (ML) يقطع المستوى (BCD) . بـ جوابك.
ب. أنشئ تقاطع المستوى (NML) مع كل وجه من أوجه رباعي الوجوه .

.34. $ABCDEFGH$ متوازي مستطيلات. L نقطة من $[AE]$ ، و M نقطة من $[FG]$ ، و N نقطة من $[AD]$ كما في الشكل.
أنجز مثيلاً لهذا الشكل، وأنشئ تقاطع المستوى (LMN) ومتوازي المستطيلات $.ABCDEFGH$

.35. $ABCD$ رباعي وجوه ، و L منتصف $[AB]$ و M مركز ثقل المثلث ADC (نقطة تلاقي متوسطاته).
أ. أنجز شكلاً مناسباً، وبين أن المستقيم (LM) يقطع المستوى (BCD) .
ب. أنشئ النقطة E تقاطع المستقيم (LM) والمستوى (BCD) ، وبين أن الرباعي $DBCE$ متوازي أضلاع.

- أ. المستقيم (MN) والمستوى (BCF) .
- ب. المستقيم (MN) والمستوى $(ABFE)$.
- ج. المستقيم (MN) والمستوى $(ADHE)$.
- د. المستقيم (MN) والمستقيم (CG) .
- هـ. المستقيم (EB) والمستقيم (HC) .
- و. المستوى (NBM) والمستوى (BEH) .
- ز. المستوى (NBM) والمستوى (AEH) .

.26. باستعمال معطيات الشكل الوارد في التمرين السابق، بين أن المستقيمين (MN) و (AB) ليسا من نفس المستوى.


.27. نفس سؤال التمرين السابق بالنسبة إلى المستقيمين (MN) و (EF) .

.28. باستعمال معطيات الشكل الوارد في التمرين رقم 25، عين تقاطع المستقيم (MN) مع كلّ من:

- أ. المستوى (ABE) .
- بـ. المستوى (DCH) .
- جـ. المستوى (EFG) .


.29. الشكل $ABCD$ يمثل رباعي وجوه ، و L نقطة من $[BC]$ ، و M نقطة من المستوى (ADC) .

- أ. أنجز مثيلاً للشكل المعطى.
- بـ. أنشئ تقاطع المستويين (BDC) و (ABM) .
- جـ. أنشئ تقاطع المستويين (BDC) و (ALM) .



.30. باستعمال معطيات الشكل الوارد في التمرين رقم 25، عين تقاطع المستوى (ANM) مع كلّ وجه من أوجه المجسم $.ABCDEFGH$

.31. A, B, C, D, E خمس نقاط من الفضاء حيث كلّ أربع منها ليست من نفس المستوى.



ب. بين أن القطع $[IJ]$ ، $[EG]$ ، $[FH]$ لها نفس المنتصف.

41. بين أنه إذا كانت النقط E و F و G و H و I منتصفات أحرف رباعي وجوه منتظم فإنها رؤوس سداسي وجوه منتظم.


42. ارسم رباعي وجوه $ABCD$ ، وعلم نقطة M من $[AB]$ ، ولتكن (P) المستوي الذي يشمل القطة M ويواري المستوي (BCD) . أنشئ تقاطع المستوي (P) ورباعي الوجه $.ABCD$

43. (P) مستويان متوازيان، A ، B ، C ، D ثلات نقط متمايزة من المستوي (P) و D ، E ، H ثلات نقط متمايزة من المستوي (P) حيث $(BC) \parallel (DH)$ ، والمستويان (EBC) و (ADH) متتقاطعان.
أ. أنجز شكلا مناسبا.
ب. بين أن مستقيم تقاطع المستويين (EBC) و (ADH) يوازي كلا من المستويين (P) و (P') .

44. هرم $ABCDE$ قاعدته $BCDE$ مربع، (P) مستوي يشمل المستقيم (DC) ويقطع $[AB]$ و $[AE]$ في نقطتين M و N على الترتيب. ما نوع الرباعي $? DCMN$

45. مكعب $ABCDEFGH$ (انظر الشكل)،
أ. بين أن المستويين (BGE) و (ACH) متوازيان.
ب. بين أن المستويين (BGE) و (ACH) يقسمان إلى ثلاثة قطع متقاربة.


36. ABC مثلث، و (P) مستوي لا يوازي المستوي (ABC) ، المستقيمات (AC) ، (AB) ، (BC) تقطع المستوي (P) في النقط A' ، B' ، C' على الترتيب. بين أن النقط A' ، B' ، C' في استقامية.



37. $ABCDEFGH$ مكعب، النقط N ، M ، J ، H منتصفات القطع $[DC]$ ، $[AE]$ ، $[EF]$ على الترتيب. أنشئ تقاطع المستوي (MNJ) مع المكعب $ABCDEFGH$ ، وبين أنه سداسي منتظم.

التواري: مستقيمان - مستقيمان - مستوي ومستوى


38. الشكل أدناه هو تمثيل بالمنظور متساوي القياس لمتوازي مستطيلات $ABCDEFGH$ ، النقاط L ، N ، M منتصفات أضلاعه $[BF]$ ، $[DC]$ ، $[AB]$.
أ. المستقيم (MN) يوازي المستقيم (DG) .
ب. المستوي (NLM) يوازي المستوي (ADF) .
ج. المستقيم (AL) يوازي المستوي (MNC) .



39. رباعي وجوه F مركز نقل المثلث ABC ، G مركز نقل المثلث ADC ، H مركز نقل المثلث ABD .
أ. أنجز شكلا مناسبا، وبين أن المستقيم (HF) يوازي المستوي (BCD) .
ب. بين أن المستويين (BCD) و (FGH) متوازيان.

40. رباعي وجوه، النقط E و F و G و H و I و J منتصفات أحرفه $[AB]$ و $[BC]$ و $[CD]$ و $[AD]$ و $[AC]$ و $[BD]$.
أ. بين أن كل من المستقيمات (EI) و (IH) و (EH) يوازي المستوي (BCD) .

المستقيم (DF) عمودي على المستوى (BGE) ، وعَيْن نقطة تقاطعهما.



52. رباعي $ABCD$ وجوه، حيث كل من الزوايا DAC و BAC قائمة، والنقطة E ، H ، G ، F منتصفات أحرفه $[CD]$ ، $[BC]$ ، $[AB]$ ، $[DA]$ على الترتيب.
أ. بين أن الرباعي $EFGH$ مستطيل.
ب. متى يكون الرباعي $EFGH$ مربعا؟

53. الشرط الكافي لكي يكون مستقيم عموديا على مستوى

اثبت أنه إذا كان مستقيم عموديا على مستقيمين متلقعين من مستوى فإنه عمودي على كل مستقيمات هذا المستوى (أي عمودي على المستوى).

54. مثلث متساوي الساقين رأسه الأساسي A ، A نقطة من المستقيم العمودي على المستوى (ABC) ويشمل النقطة M ، M منتصف $[BC]$.
أ. بين أن المستقيمين (MD) و (BC) متعامدان.
ب. استنتج طبيعة المثلث BCD .

أطوال - مساحات - حجوم

55. هرم $ABCDEFG$ رأسه A ، أحرفه الجانبية متقابلة وطول كل منها $6cm$ ، وقاعدته سداسي منتظم طول ضلعه $2cm$. أرسم قادته بدقة واحسب مساحته الكلية وحجمه (تعطى النتائج بالتدوير إلى $0,01$).

56. هرم $ABCDE$ ارتفاعه $8cm$ وقاعدته مربع طول ضلعه $4cm$ ، ورأسه A ينتمي

46. $ABCDEFGH$ مكعب، L ، M ، N نقط من أحرفه $[AD]$ ، $[BC]$ ، $[BF]$ على الترتيب.
 $AN = BM = BL$ حيث $(CDEF) \parallel (LMN)$ متوازيان.
ب. ماذا يحدث عندما تتطبق النقطة L على النقطة F ؟


تعامد: مستقيمان - مستقيم ومستو - مستويان

47. رباعي $ABCD$ وجوه حيث $AD = DC$ و M منتصف $[AC]$ ، $AB = BC$ منتصف $[AC]$.
أ. بين أن المستقيم (AC) عمودي على المستوى (BDM) .
ب. استنتج أن المستقيم (AC) عمودي على المستقيم (BD) .

48. رباعي $ABCD$ وجوه منتظم، M منتصف $[CD]$.
أ. بين أن المستقيم (CD) عمودي على المستوى (ABM) .
ب. ما هي مجموعة نقط الفضاء المتساوية المسافة عن طرف في قطعة المستقيم $[CD]$ ؟



49. $ABCDEFGH$ مكعب، N منتصف $[DH]$ على الترتيب، E ، M ، C ، N تتبع إلى نفس المستوى.
ب. بين أن المستقيمين (EC) و (MN) متعامدان. (إرشاد: يمكن الاستفادة من الرباعي $(EMCN)$)

50. بين أن في مكعب كل وجهين مشتركين في رأس من رؤوس المكعب متعامدان.




51. الشكل المقابل هو تمثيل بالمنظور متساوي القياس لمكعب $ABCDEFGH$ ، بين أن

- أ. احسب r .
 ب. أجز مجسم مناسباً لهذه
 الحالة.
 3. احسب β زاوية رأس المخروط
 (باستعمال الآلة الحاسبة والتدوير إلى
 الدرجة).




- مكعب ABCDEFGH . 60**
- القطة طول حرفه a .
 - القطة L, K, J, I مراكز المربعات $ABCD$, $EFGH$, $BCGF$, $ABFE$, $ADHE$ على الترتيب.
 - أ. بين أن المجسم $MIJKLN$ منتظم (أحرفه متساوية).



- ب. احسب طول حرف المجسم $MIJKLN$ بدلالة a .
- ج. احسب حجم المجسم $MIJKLN$ بدلالة a , ثم جد النسبة بين حجم $MIJKLN$ وحجم المكعب $ABCDEFGH$.
- د. ارسم تصميماً للمجسم $MIJKLN$.

- إلى العمودي على المستوى $(BCDE)$ الذي يشمل مركز المربع.
 أ. بين أن الأحرف الجانبية للهرم متقاربة.
 ب. احسب طول الحرف الجانبي للهرم $ABCDE$ (أعط النتائج بتقرير $0,01$).
 ج. احسب المساحة الجانبية للهرم $ABCDE$ وكذا حجمه (أعط النتائج بتقرير $0,01$).

- 57.** $ABCDEFGH$ متوازي مستطيلات، فيه $AE=18cm$ و $AD=3,5cm$ و $[BF]$ نقطتان من $[AB]$ و $FN=y$ و $AM=x$: حيث y و x على الترتيب



- أ. بين أن المقطع الذي يكنته كل من المستويين (ENH) و (EMH) مع متوازي المستطيلات $ABCDEFGH$ هو مستطيل.
- ب. عين قيمة كل من x و y التي من أجلها يقسم المستويان (ENH) و (EMH) متوازي المستطيلات إلى ثلاثة أجزاء متساوية الحجم.

- 58.** اسطوانة دوران (C) ارتفاعها $10cm$ ونصف قطر قاعدتها $5cm$, يقطعها مستوى (P) يوازي محورها حيث المسافة بين مركز القاعدة والمستوى (P) تساوي $3cm$.

- أ. ارسم شكلا مناسباً بالمنظور متساوي القياس بحيث يقطع المستوى (P) في مستوى الواجهة.

- ب. بين أن المقطع الذي يحده المستوى (P) في الاسطوانة (C) هو مستطيل، واحسب مساحته.


- 59.** يمثل الشكل (2) تصميماً لمخروط دوران، وهو مقطع من قرص نصف قطره a محدد بزاوية مركزية قيسها α درجة، ودائرة نصف قطرها r .

- 1. أوجد العلاقة بين α و a و r .
- 2. نعتبر أن $\alpha = 90^\circ$ و $a = 10\text{ cm}$ و $r =$

مسائل

ج. احسب حجم تمام الزاوية ABH
باستعمال الآلة الحاسبة أعط قيمة ABH
بالتدوير إلى الدرجة.

2. لتكن النقط I, J, K منتصفات $[AC]$, $[AB]$, $[AD]$ على الترتيب.
أ. بين أن المستويين (IJK) و (BCD) متوازيان.
ب. بين أن المستوي (IJK) يشمل منتصف $[AH]$.
ج. ما نوع المجسم $AIJK$?
د. احسب بدلالة a المساحة الكلية لرباعي الوجوه $ABCD$, وكذا حجمه.
ه. عبر بدلالة a عن المساحة الكلية للمجسم $IJKBCD$ وكذا حجمه.



63. مكعب $ABCDEFGH$ طول حرفه 6cm , النقط N, M, L, K, J منتصفات القطع $[AD]$, $[FE]$, $[FG]$, $[CG]$, $[DC]$, $[EA]$, على الترتيب .

- أ. بين أن النقط I, J, K, L, M, N تتبع إلى نفس المستوى.
ب. ما هو نوع الشكل $IJKLMNOP$? احسب مساحته.
ج. بين أن النقط I, J, K, L, M, N متساوية المسافة عن النقطة B ، وكذا عن النقطة H .
د. بين أن (BH) عمودي على المستوى $(IJKLMNOP)$ ، وعین نقطة تقاطعهما.
ه. استنتج مما سبق طبيعة المجسم $BIJKLMNOP$ ، واسحب حجمه ومساحته الجانبية.

64. مكعب $ABCDEFGH$ طول حرفه a ، N نقطة من $[AB]$ بحيث $AB = 3BN$.

- أ) عين تقاطع المستوى (FGN) مع كل من المستويين $(ABCD)$ و $(DCGH)$.
ب) احسب كلا من الطولين FN و GN بدلالة a .

- ج) لتكن النقطة M تقاطع المستوى (FGN) و $[DC]$ ، ما نوع المجسم $BFNCGM$?
د) احسب المساحة الكلية للمجسم $BFNCGM$ وكذا حجمه بدلالة a .

61. مجسم على شكل هرم قاعدته مستطيل $ABCD$ ، رأسه S نقطة من المستقيم العمودي على المستوى $(ABCD)$ في النقطة O تقاطع قطري القاعدة.

1.

أ. أنجز باستعمال التمثيل بالمنظور المتساوي القياس شكلا مناسبا لهذا المجسم في كل من الحالتين الآتتين:

- المشاهد ونقطة S فوق المستوى (ABC)
- المشاهد ونقطة S في جهتين مختلفتين بالنسبة إلى المستوى (ABC)

ب. كيف تبدو طبيعة الرباعي $ABCD$ في الشكل الذي أنجزته.

ج. بين أن المستويين (SBD) و $(ABCD)$ متعمدان، وأن المستويين (SAC) و (SBD) غير متعمدان.

د. بين أن المستويين (DCS) و (ABS) متتقاطعين، وأنشئ تقاطعهما.

ه. بين أن كلا من المثلثات SAD و SCD و SAB و SCB متساوي الساقين، وأن المثلثين SAD و SCB متقابسة، وكذلك المثلثان SCD و SAB متقابسان.

2. تعتبر فيما يلي $AB = 8\text{ cm}$ و $AD = 6\text{ cm}$ و $SO = 5\sqrt{3}\text{ cm}$

أ. احسب الطول AS .

ب. احسب الزاوية SAO .

ج. احسب المساحة الكلية للمجسم وكذا حجمه.

62. $ABCD$ رباعي وجوه منتظم طول حرفه a .

1.

أ. نقطة تقاطع المستقيم AH الذي يشمل النقطة A والعمودي على المستوى (BCD) ، بين أن النقطة H هي مركز ثقل المثلث BCD .

ب. احسب الارتفاع AH .

الهندسة المستوية

الكفاءات المستهدفة

يتعلق الأمر في هذا الباب بإعادة تناول كفاءات التعليم المتوسط والعمق فيها حسب المجالات الآتية:

- متوازي الأضلاع، ومتوازيات الأضلاع الخاصة: المستطيل، المربع، المعين.
- المثلثات الخاصة، والمستقيمات الخاصة في مثلث.
- الزوايا والدائرة.
- نظرتي طالس وفيثاغورس وعكس كلّ منهما، وتوظيفها في حلّ مسائل هندسية.
- التسبيب التثلثية.
- المثلثات المقايسة والمثلثات المتشابهة.
- التحويلات النقطية.

تعتبر الهندسة من أقدم العلوم التي ابتكرها الإنسان، حيث كانت بداية ظهورها مرتبطة ب حاجته إلى قياس الأرضي التي يعدها للزراعة و الري أو لبناء المنازل. و تطورت بعد ذلك موازاة مع تطور علم الحساب، و مصدر كلمة هندسة في جميع لغات العالم هو كلمة "إندازه" الفارسية، و التي تعني "علم قياس الأرض".



صفحة من كتاب حل شكوك إقليدس لابن الهيثم تحمل الجزء الأخير من إثباته لمبرهنة فيثاغورس.

لقد أظهرت الأبحاث أنَّ هذا العلم سبق إليه البابليون والمصريون القدماء، غير أنَّ أول من ألف في الهندسة كعلم، هو الرياضي اليوناني المشهور إقليدس (عاش في القرن الثالث قبل الميلاد) حيث كتب كتاباً أعطى فيه للهندسة النظام البديهي المعروف عنها حالياً فكان إعلاناً ببروز مفهوم البرهان. يتالف هذا الكتاب من ثلاثة عشرة مقالة، المقالة الأولى منها تشتمل على تسع بديهيات، وخمس مسلمات وثلاثة وعشرين تعريفاً، وثمانية وأربعين مبرهنة، و الجدير بالذكر أنَّ المبرهنة السابعة والأربعين هي التي عرفت فيما بعد بمبرهنة فيثاغورس . وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية تحت عنوان (كتاب الأصول) لأول مرة من طرف الحجاج بن يوسف بن مطر ترجمتين الأولى تسمى بالنفق الهاروني نسبة إلى هارون الرشيد، والثانية تسمى بالنقل المأموني نسبة إلى المأمون ابن هارون الرشيد، وترجم مرة أخرى من قبل إسحاق ابن حنين (الذي عاش من 809 م - 873 م) و ذلك في عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، وأصلاح هذه الترجمة الرياضي الكبير ثابت ابن قرة (835 م - 900 م) . ولم يكتف علماء دار الإسلام بالترجمة فقط، بل تطرقوا إلى قضايا و بحوث لم ينطروا إليها إقليدس، فأدخلوا تعديلات وتقديرات على هندسة إقليدس منها فرضية التوازي التي جاءت في كتابه كبديهية

خامسة، حيث كانت المحاولات العديدة لبرهانها من طرف الجوهرى وثبتت ابن قرة وابن الهيثم و عمر الخيم حافزاً قوياً و دليلاً واضحاً لبعض علماء الرياضيات في العصر الحديث لوضع هندسات غير إقليدية وهي هندسة ريمان و هندسة لوباتشيفيتسكي ، وقسم العلماء في الحضارة العربية الإسلامية الهندسة إلى قسمين هما: هندسة عقلية؛ وهي التي تعرف وتقهم أو التي تسمى الهندسة البحتة. والهندسة الحسية وهي التي ترى بالعين وتدرك باللمس، أي الهندسة التطبيقية. وقد استخدموها في حل المعادلات ذات الدرجة الثانية والثالثة.

أنشطة


نشاط 1. متوازي الأضلاع

أ) عُلم على ورقة غير مسطرة ثلاثة نقاط A ، B ، O ليست في استقامية .

ب) أنشئ نقطتين C و D نظيرتي نقطتين A و B بالنسبة إلى النقطة O على الترتيب.

ج) ما هي طبيعة الرباعي $ABCD$ ؟

د) تحقق من أن:



1. القطعتين $[AC]$ و $[BD]$ متناصفتان.

2. كل ضلعين مقابلين متقابisan.

3. كل زاويتين مقابلتين متقابستان.


هـ) عُلم النقط A' ، B' ، C' ، D' من (AB) و (BC) و (CD) و (DA) على الترتيب حيث $BA' = CB' = DC' = AD'$ و $ABCD$ لا تنتهي إلى أضلاع رباعي $A'B'C'D'$ ؟ (إرشاد: يمكن البدء بنوع كل من الرباعيين $A'CC'A$ و $D'BB'D$)

نشاط 2. متوازيات الأضلاع الخاصة


1. أنشئ - باستعمال المدور والمسطرة فقط - متوازي أضلاع قطراته متعمدان، تتحقق أنّ أضلاعه متقابسان، ماذا نسمى متوازي الأضلاع في هذه الحالة ؟

2. أنشئ متوازي أضلاع إحدى زواياه قائمة، بين أن كل زواياه قائمة، ماذا نسمى متوازي الأضلاع في هذه الحالة ؟ متى يكون مربعا ؟

نشاط 3. المثلثات والمستقيمات الخاصة في مثلث



3. مثلثا كييفيا، المنصفان الداخليان لزوايا الرأسين A و B ينقطاعان في النقطة S .
أ. بين أن المنصف الداخلي لزاوية الرأس C يشمل النقطة S .
ب. عين مركز الدائرة التي تمس أضلاع المثلث ABC من الداخل، وارسمها.



نشاط 4. مبرهنة فيثاغورس

1. الشكل المقابل يمثل مثلث ABC قائما في C أطوال أضلاعه a ، b ، c ، و BDE مثلث يقابس المثلث ABC حيث النقط C ، B ، D في استقامية.

- أ) بين أنَّ الزَّاوية ABC قائمة.
 ب) ما نوع الرباعي $ACDE$ ؟
 ج) أحسب مساحة الرباعي $ACDE$ بطرريقتين مختلفتين.
 د) استنتج العلاقة بين c^2 و a^2 ، b^2 .


- . 2. ABC مثلث متقارب الأضلاع طول ضلعه 6cm ، النقطة D منتصف $[BC]$.
 أ) بين أنَّ (AD) منصف زاوية الرأس A .
 ب) احسب الطول AD ، واستنتج كلاً من $\tan 30^\circ$ ، $\cos 30^\circ$ ، $\sin 30^\circ$ ،

نشاط 5. الزوايا والدائرة

1. ارسم دائرة (C) مركزها O ونصف قطرها 5cm ، و $[AB]$ قطر فيها، و M نقطة من الدائرة حيث $AM=4\text{cm}$

- أ) باستعمال الآلة الحاسبة وتدوير النتيجة إلى $0,1$ اسحب قيس الزاوية ABM ، استنتج
قيس الزاوية MAB .
 ب) ما نوع المثلث AOM ؟ واحسب أقياس زواياه.
 ج) استنتاج العلاقة بين الزاويتين AOM و ABM .

- . 2. M ، B ، A ، A' ثلات نقط متمايزة من دائرة (C) مركزها O ، المستقيم (AO) يقطع الدائرة
في النقطة A' . نضع $MAB = \alpha$ و $MAB' = \beta$ و $MOB = \beta$



- أ) بين أنَّ كلاً من المثلثين AOM و BOM متساوي الساقين، ثمَّ عبر عن قيس الزاوية MAA' بدلالة قيس
الزاوية MOA' ، وعن قيس الزاوية BAA' بدلالة
قيس الزاوية BOA' .

- ب) استنتاج العلاقة بين α و β
 ج) عبر عن الزاوية $BA'M$ بدلالة β ، ثمَّ بدلالة α ، واستنتاج العلاقة بين الزاويتين
 BAM و $BA'M$.
 د) نقطة من القوس الكبري BM استنتاج مما سبق العلاقة بين الزاويتين BAM و
 BDM .

نشاط 6. المثلثات المتقاربة


- أ) باستعمال معطيات الجدول أدناه أنشئ في كلَّ حالة مثلثاً ABC . (وحدة الطول هي السنتمتر)

\widehat{C}	\widehat{B}	\widehat{A}	BC	AC	AB	
			5,6	3	4,5	الحالة 1
40°			6	7		الحالة 2
	45°	70°			8	الحالة 3

- ب) باستعمال الورق الشفاف قارن المثلث الذي رسمته مع المثلث الذي رسمه زميلك، ماذا تستنتج؟


نشاط 7. المثلثات المتشابهة

(1) قس باستعمال المنقلة زوايا كل مثلث فيما يأتي، ثم صنف المثلثات الستة الآتية حسب تقسيس الزوايا.



ماذا يمكن أن نقول عن مثلثات كل صنف؟

(2) في كل من الشكلين (1) و (2) المستقيمان BC و $B'C'$ متوازيان.



الشكل (2)


(أ) بين أن زوايا المثلث ABC تقاس زوايا المثلث $AB'C'$.

(ب) ماذا يمكن أن نقول عن المثلثين ABC و $AB'C'$ ؟

(ج) بين أن أطوال أضلاع المثلث ABC متناسبة مع أطوال أضلاع المثلث $AB'C'$.

نشاط 8. التحويلات التقطيعية

1. ارسم على ورقة غير مسطرة مثلثا ABC و شعاعا \vec{v} كما في الشكل.




(أ) أنشئ باستعمال المدور ومسطرة غير مردّجة المثلث $A'B'C'$ صورة المثلث ABC بالانسحاب الذي شعاعه \vec{v} .

(ب) ما هي العلاقة بين (AB) و $(A'B')$ ؟

(ج) ماذا يمكن أن نقول عن المثلثين ABC و $A'B'C'$ ؟

2. تحقق باستعمال الورق الشفاف أن المثلث ABC يقاس كلا من المثلثين $A'B'C'$ و $A''B''C''$.



(أ) بين أن المثلثين ABC و $A'B'C'$ متناظران بالنسبة إلى مستقيم، يطلب إنشاؤه.

(ب) بين أن المثلثين ABC و $A''B''C''$ متناظران بالنسبة إلى نقطة، يطلب تعليمها.


(ج) في أية حالة من الحالتين السابقتين نقول أن تقاس المثلثين مباشر.

3. انقل الشكل المقابل على ورقة غير مسطرة، ثم أنشئ باستعمال المدور ومسطرة غير مردّجة المثلث $A'B'C'$ صورة المثلث ABC بالدوران الذي مركزه النقطة O وزاويته 90° عكس اتجاه عقارب الساعة.

ماذا يمكن أن نقول عن المثلثين ABC و $A'B'C'$ ؟

الدرس

1. متوازي الأضلاع تعريف 1




متوازي الأضلاع هو رباعي حاملا كلَّ ضلعين متقابلين فيه متوازيان.

مثال:

[$(AD) \parallel (CB)$, $(AB) \parallel (CD)$] و [$(AD) \parallel (CB)$, $(AB) \parallel (CD)$]

خواص:



من أجل كل رباعي $ABCD$ معناه $[BD] \parallel [AC]$ و $[AC] \parallel [BD]$ متوازي أضلاع.

.1. معناه $ABCD$ متوازي أضلاع $[AD = BC]$ و $[AB = DC]$.

.2. معناه $ABCD$ متوازي أضلاع $[AB = DC]$ و $[AD = BC]$.


.3. معناه $ABCD$ متوازي أضلاع $[AB \parallel (DC)]$ و $[AD \parallel (BC)]$.

.4. معناه $ABCD$ متوازي أضلاع $[BAD = BCD]$ و $[ABC = ADC]$.

• متوازيات الأضلاع الخاصة


المعین: هو متوازي أضلاع له ضلعان متتاليان متقابسان.

مثال:




(3) إذا كان $ABCD$ معيناً فإنّ $[AC] \perp [BD]$ ينصف كلاً من الزاويتين $[ADC]$ و $[ABC]$ و $[BCD]$ و $[BAD]$ ينصف كلاً من الزاويتين $[ABC]$ و $[ADC]$

[$A = B = C = D = 90^\circ$] مستطيل معناه $ABCD$ (1)
[$AC = BD$, $[BD] \parallel [AC]$] مستطيل معناه $ABCD$ (2)




المستطيل: هو متوازي أضلاع له زاوية قائمة.

مثال:




(1) $A = B = C = D = 90^\circ$ معناه $ABCD$ مربع و $[AB = BC = CD = DA]$
(2) $[AC] \perp [BD]$ و $AC = BD$ معناه $ABCD$ مربع و $[BD] \parallel [AC]$ متوازيان



المربع: هو متوازي أضلاع له ضلعان متتاليان متقابسان وزاوية قائمة.


مثال:



2. المثلثات، والمستقيمات الخاصة في مثلث


• المثلثات الخاصة

المثلث قائم الزاوية




- فيه زاوية قائمة
 $ABC = 90^\circ$

المثلث متقارن الأضلاع



- أضلاعه متقارنة
 $ABC = ACB = BAC = 60^\circ$

المثلث متساوي الساقين




- فيه ضلعان متقارنان
 $ABC = ACB$

• المستقيمات الخاصة في مثلث

ارتفاعات مثلث متقطع في نقطة واحدة.


$$\begin{aligned} A(ABC) &= \frac{1}{2} AA' \times BC \\ &= \frac{1}{2} BB' \times AC \\ &= \frac{1}{2} CC' \times AB \end{aligned}$$



الارتفاع في مثلث هو المستقيم الذي يشمل أحد رؤوس المثلث ويعامد الضلع المقابل.

محاور مثلث متقطع في نقطة واحدة.


نقطة تقاطع محاور مثلث هي مركز الدائرة المحيطة بهذا المثلث (التي تشمل رؤوسه).



المحور في مثلث هو محور أحد أضلاعه.

متوسطات مثلث متقطع في نقطة واحدة.


نقطة تقاطع متوسطات مثلث هي مركز ثقل هذا المثلث.



المتوسط في مثلث هو المستقيم الذي يشمل أحد رؤوس المثلث ومنتصف الضلع المقابل.

منصّفات الداخليّة في مثلث متقطعة في نقطة واحدة.

نقطة تقاطع المنصّفات الداخليّة في مثلث هي مركز الدائرة المرسومة داخل هذا المثلث (أي التي تمسّ أضلاع المثلث من الداخل).




المنصف في مثلث هو منصف إحدى زواياه.

3. مبرهنة فيثاغورس - النسب المثلثية

• مبرهنة فيثاغورس وعکسها

مبرهنة 2 (عكس مبرهنة فيثاغورس)




إذا كان $BC^2 = AB^2 + AC^2$ ، $\triangle ABC$ مثلاً قائم في A .
فإنَّ

مبرهنة 1 (مبرهنة فيثاغورس)


إذا كان $\triangle ABC$ مثلاً قائماً في A .
فإنَّ
 $BC^2 = AB^2 + AC^2$

مثال 2: $ABCD$ مربع طول ضلعه يساوي a .
إنَّ $BD = a\sqrt{2}$.




مثال 1: $\triangle ABC$ مثلاً متقارن الأضلاع طول ضلعه يساوي a . الارتفاع المتعلق بالضلع $[BC]$.

$$AH = a \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{و} \quad CH = \frac{a}{2}$$



نتائج:

إذا كان $\triangle ABC$ مثلاً قائماً في A ، و (AH) الارتفاع المتعلق بالضلع $[BC]$
فإنَّ:




$$AB \times AC = AH \times BC \quad (\text{أ})$$

$$AB^2 = BH \times BC \quad (\text{ب})$$

$$AC^2 = CH \times CB \quad (\text{ج})$$

$$AH^2 = HC \times HB \quad (\text{د})$$

• النسب المثلثية في مثلث قائم تعريف 2



مثلاً $\triangle ABC$ قائم في C ،
جيب الزاوية α : $\sin \alpha = \frac{\text{طول الضلع المقابل لـ } \alpha}{\text{طول الوتر}} = \frac{BC}{AB}$
جيب تمام الزاوية α : $\cos \alpha = \frac{\text{طول الضلع المجاور لـ } \alpha}{\text{طول الوتر}} = \frac{AC}{AB}$
ظل الزاوية α : $\tan \alpha = \frac{\text{طول الضلع المقابل لـ } \alpha}{\text{طول الضلع المجاور لـ } \alpha} = \frac{BC}{AC}$

خواص:

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$



أ) من التعريف نجد أنَّ:

$$(\sin \alpha)^2 + (\cos \alpha)^2 = 1$$

ب) باستعمال مبرهنة فيثاغورس يمكن أن نبين أنَّ:

٤. مبرهنة طالس

• مبرهنة طالس وعكسها



مبرهنة 4 (عكس مبرهنة طالس)

إذا كانت كل من النقط A, B, D والنقط C, E على استقامة واحدة وبنفس الترتيب حسب أحد الشكلين أعلاه، وكان

$$\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE} , \text{ فإن:}$$

(Δ') يوازي (Δ)

$[(CB) \text{ هو } (\Delta)]$ و $(EC) \text{ هو } (\Delta)$

مبرهنة 3 (مبرهنة طالس)

إذا كان لدينا مستقيمان متلقيان في نقطة A يقطعهما مستقيمان (Δ) و (Δ') في النقط B, D في النقط C, E حسب أحد الشكلين أعلاه، وكان (Δ) يوازي (Δ'), فإن:

أطوال أضلاع المثلث ABC متناسبة مع أطوال الأضلاع الموافقة لها من المثلث

$$\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE} = \frac{BC}{DE} \quad \text{أي:}$$


• حالة خاصة: مستقيم المتنصفين في مثلث

مثلث ABC كيفي M و N نقطتان من (AB) و (AC) على الترتيب

• إذا كانت النقطتان M و N متنصفى $[AB]$ و $[AC]$ على الترتيب

$$\text{فإن: } MN = \frac{1}{2} BC \quad \text{و} \quad (MN) \parallel (BC)$$

• إذا كانت النقطة M متنصف $[AB]$ وكان $(MN) \parallel (BC)$ فإن N متنصف $[AC]$.




٥. الزوايا والدائرة

مفردات وأصطلاحات:

• دائرة مركزها O ، و A, B, C, M, N نقط من الدائرة (C) حيث O تنتهي إلى $[AN]$.

• $[AN]$ تسمى قطرا، وكل من $[AN], [AM], [AB], [BM], [AM]$ تسمى وترًا في الدائرة (C).

• النقطتان المتمايزتان A, B تعيّنان على الدائرة (C) فوسين كل منها نرمز لها بالرمز \widehat{AB} .



• (XY) مستقيم يشتراك مع الدائرة (C) في نقطة وحيدة A , يسمى (XY) مماسا للدائرة (C).

• الزاوية \widehat{AOM} رأسها مركز الدائرة تسمى زاوية مركزية، نقول إنّها تحصر القوس \widehat{AM} .


• الزاوية \widehat{ABM} رأسها نقطة من الدائرة تسمى زاوية محيطية، نقول إنّها تحصر القوس \widehat{AM} .

• الزاوية \widehat{XAB} تسمى أيضاً زاوية محطيّة، نقول إنّها تحصر القوس \widehat{AB} .

مِنْ هَذَا

في كل دائرة، الزاوية المركزية تساوي ضعف الزاوية المحيطية التي تحصر نفس القوس.

مثال: A ، B ، M ثلث نقاط متمايزة من دائرة مركزها O .



$$\widehat{AOB} = 2 \widehat{AMB}$$

نتائج:

1. الزاوية المحيطية، في دائرة، التي تحصر نفس القوس، أو تحصر أقواساً متقايسة تكون متقايسة.

2. عندما تكون نقطتان A ، B من دائرة متقابلتين قطرياً، و M نقطة من نفس الدائرة وتختلف عن A و B فإن المثلث ABM قائم في M .

3. تكون رؤوس رباعي المحتسب $ABCD$ من نفس الدائرة إذا تحقق أحد الشرطين:
 (أ) $\widehat{DBC} = \widehat{DAC}$
 (ب) الزوايا \widehat{BCD} و \widehat{BAD} متكاملتان.

6. المثلثات المتقايسة


• تقابس مثلثين

تعريف 3

نقول عن مثلثين إنهم متقابسان إذا كانوا قابلين للتطابق.

نتيجة:

المثلثان المتقابسان أطوال أضلاعهما متساوية متشاً، وزواياهما متقايسة متشاً.



مثال: المثلثان ABC و $A'B'C'$ متقابسان، يمكن تطبيق أحدهما على الآخر بالسحب والتدوير أو التدوير والسحب، نقول إن تقابسهما مباشر.

المثلثان ABC و $A''B''C''$ متقابسان، لا يمكن تطبيق أحدهما على الآخر إلا بعد قلب أحدها، نقول إنهم تقابسهما غير مباشر.

ملاحظة: المثلثان ABC و $A'B'C'$ هما في نفس الاتجاه (عكس عقارب الساعة)، بينما المثلثان ABC و $A''B''C''$ من اتجاهين متعاكسين.

٠ خواص (حالات تقاضی مثبتین)

يتقاضي مثلثان إذا كانت أطوال أضلاعهما متساوية متى مثلي.

خاصية (2): يتقايس مثلثان إذا تقابليت زاوية والضلعين اللذان يحصراها من أحد المثلثين مع زاوية والضلعين اللذين يحصراها من المثلث الآخر.

خاصية (3): يتقايس مثلثان إذا تقابس ضلع والزوايا المعاورتان له من أحد المثلثين مع ضلع والزوايا المعاورتين له من المثلث الآخر.

نتيجة: يتقايس متلثان إذا كان أحدهما صورة للمثلث الآخر بانسحاب، أو تناظر محوري أو تناظر مركزي أو دوران.

7. المثلثات المتشابهة

• تشابه مثلثین

تعريف4

قول عن مثليين إنّهما متشابهان إذا كانت زوايا أحدهما تساوي زوايا الآخر.

مثال:

المثلثان ABC و $A'B'C'$ متشابهان.

الرؤوس المتماثلة

الأضلاع المتماثلة: $[A'B']$ و $[AB]$

$[B'C']$ و $[BC]$ ، $[A'C']$ و $[AC]$

ملاحظات:

1. يكفي تساوي زاويتين من أحد المثلثين مع زاويتين من المثلث الآخر للقول إن المثلثين متشابهان، ذلك لأنّ مجموع زوايا المثلث يساوي 180° .
 2. إذا كان أحد مثلثين تصغير (أو تكبير) للأخر فإنّ هذين المثلثين متشابهان.
 3. المثلثان المتقابيان هما متشابهان، والعكس غير صحيح دائماً.

میر هنر ۶


المثلثان المتشابهان أضلاعهما المتماثلة متassية.

پیر هان

لیکن $\hat{A} = \hat{A}'$ و $ABC = A'B'C'$ متناظران متشابهان حيث $\hat{C} = \hat{C}'$ ، $\hat{B} = \hat{B}'$

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{A'C'}{AC} = \frac{B'C'}{BC}$$

من أجل ذلك نعلم نقطة E من $[AC]$ حيث $AE=A'C'$ ونقطة D من $[AB]$ حيث $AD=A'B'$.



المثلثان $A'B'C'$ و ADE فيهما: $AD=A'B'$ و $AE=A'C'$ و $B'A'C'=DAE$ ، فهما متقابسان.
ومنه $C'B'=ED$ و $\widehat{A'C'B'}=\widehat{AED}$
لـ $(DE) \parallel (BC)$ وبالتالي فإن $\widehat{AED}=\widehat{ACB}$ ، ومنه نستنتج أن $\widehat{A'C'B'}=\widehat{ACB}$
حسب مبرهنة طالس في المثلثين ABC و $A'FE$ نجد

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$$

ومنه $\frac{A'B'}{AB} = \frac{A'C'}{AC} = \frac{B'C'}{BC}$


• خواص حالات تشابه مثلثين

خاصية (1): يتشابه مثلثان إذا تفقيس زاويتان من أحد المثلثين مع زاويتين من المثلث الآخر.




مثال: بما أن $\widehat{B}=\widehat{B}'$ و $\widehat{A}=\widehat{A}'$
فإن المثلثين ABC و $A'B'C'$ متتشابهان.

خاصية (2): يتشابه مثلثان إذا تفقيس زاوية من أحد المثلثين مع زاوية من المثلث الآخر، وكان طولاً الضلعين الذين يحصاران إحدى هاتين الزاويتين متناسبين مع طولي الضلعين الذين يحصاران الزاوية الأخرى.



مثال: بما أن $\widehat{A}=\widehat{A}'$ و $\frac{A'B'}{AB} = \frac{A'C'}{AC}$
فإن المثلثين ABC و $A'B'C'$ متتشابهان.

خاصية (3): يتشابه مثلثان إذا كان أطوال الأضلاع المتماثلة فيهما متناسبة.



مثال: بما أن $\frac{A'B'}{AB} = \frac{A'C'}{AC} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{1}{3}$
فإن المثلثين ABC و $A'B'C'$ متتشابهان.

• نسبة تشابه مثلثين

تعريف 5

ليكن ABC و $A'B'C'$ مثلثان متتشابهين، نسمى **نسبة تشابه** هذين المثلثين العدد الموجب غير

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{A'C'}{AC} = \frac{B'C'}{BC} = k$$

المعدوم k حيث:

ملاحظات: لتكن k نسبة تشابه مثلثين ABC و $A'B'C'$ حيث $A'B'C'$ هو تصغير للمثلث ABC .

1. إن $\frac{1}{k}$ هي أيضاً نسبة تشابه للمثلثين ABC و $A'B'C'$.

2. إذا كان $k < 1$ فإن المثلث $A'B'C'$ هو تصغير للمثلث ABC ، ونسمى k نسبة (أو عامل) التصغير.


3. إذا كان $k > 1$ فإن المثلث $A'B'C'$ هو تكبير للمثلث ABC ، ونسمى k نسبة (أو عامل) التكبير.

4. إذا كان $k = 1$ فإن المثلث $A'B'C'$ يفaiس للمثلث ABC .


8. التحويلات النقاطية

• التحويلات النقاطية - تعاريف


(1) تعريف 6 (التناظر المحوري)



(2) تعريف 7 (التناظر المركزي)




(3) تعريف 8 (الانسحاب)



(4) الدوران

(أ) توجيه المستوى




تعريف 9

توجيه المستوى يعني اختيار اتجاه واحد على كل دوائر هذا المستوى.

ملاحظة: لتوجيه مستوى عادة ما نختار الاتجاه المباشر (عكس اتجاه حركة عقارب الساعة)

(ب) تعريف 10 (الدوران)



• التحويلات النقاطية - خواص

(1) القط الصامدة

تعريف 11

نقول عن نقطة إنها صامدة بتحويل نقطي، إذا كانت منطبقه على صورتها بواسطة هذا التحويل.

أمثلة:

- التناظر المحوري الذي محوره مستقيم (١) يقبل كلّ نقطـة هذا المستقيم نقطـة صامدة.
- التناظر المركزي الذي مركزـه نقطـة A يقبل نقطـة صامدة وحيدة هي A نفسها.
- الانسحاب الذي شعاعـه غير معـدوم لا يقبل نقطـة صامدة.
- الدوران الذي مركزـه نقطـة O وزاوـيـته α (حيث $\alpha \neq 2k\pi$ و k عدد صـحـيـحـ نـسـبـيـ) يقبل نقطـة صامدة وحيدة هي مركزـه O .


(٢) حفظ المسافات (التقايس)

مبرهنة ٦ وتعريف ١٢

كلـ من التناظر المحوري، والتـناـظـرـ المـركـزـيـ، والـانـسـحـابـ، والـدورـانـ يـحـافظـ عـلـىـ المـسـافـاتـ.

يـسـمـيـ التـحـوـيلـ الـذـيـ يـحـافظـ عـلـىـ المـسـافـاتـ تقـايـسـاـ.

مثال: في الأشكـالـ (١)، (٢)، (٣)، (٤) صـورـةـ [AB] بتـناـظـرـ مـحـورـيـ، بتـناـظـرـ مـرـكـزـيـ، بـانـسـحـابـ، بـدورـانـ عـلـىـ التـرـتـيبـ



لديـنـاـ فـيـ كـلـ حـالـةـ مـمـاـ سـبـقـ

(٣) حفظ الاستقامةية

مبرهنة ٧

إذا كانت A ، B ، C ثـلـاثـ نقطـةـ فـيـ اـسـتـقـامـيـةـ فإنـ صـورـهـ A' ، B' ، C' بتـقاـيـسـ تكونـ فـيـ اـسـتـقـامـيـةـ.

نتـيـجـةـ:

صـورـةـ مـسـتـقـيمـ بتـقاـيـسـ(تناـظـرـ مـحـورـيـ، تـناـظـرـ مـرـكـزـيـ، اـنـسـحـابـ، دـورـانـ) هوـ مـسـتـقـيمـ.

(٤) حفظ أقياس الزوايا

مبرهنة ٨

صـورـةـ زـاوـيـةـ بتـقاـيـسـ هيـ زـاوـيـةـ تقـايـسـهاـ.


يمـكـنـ إـثـبـاتـ هـذـهـ المـبرـهـنـةـ باـسـتـعـالـ تـقاـيـسـ المـلـثـلـاتـ، وـنـسـتـنـجـ مـنـهـاـ:

- إذا كان مـسـتـقـيمـانـ مـتـواـزـيـنـ فـيـ صـورـتـيهـماـ بتـقاـيـسـ مـتـواـزـيـانـ أـيـضاـ.
- إذا كان مـسـتـقـيمـانـ مـتـعـامـدـيـنـ فـيـ صـورـتـيهـماـ بتـقاـيـسـ مـتـعـامـدـانـ أـيـضاـ.

طرائق وتمارين محلولة

• متوازي الأضلاع

استعمال متوازي الأضلاع في البحث عن منتصف قطعة مستقيم



$ABCD$ متوازي أضلاع، E, F, G, H نقط من $[BC]$ ، $[AB]$ ، $[CD]$ على الترتيب، حيث

1. بين أن القطعتين $[EG]$ و $[FH]$ نفس المنصف، وعيّنه.


2. استنتج طبيعة الرباعي $EFGH$.

حل

.1


بما أن $AH = FC$ و $(AH) \parallel (FC)$ فإن الرباعي $AFCH$ متوازي أضلاع.

ومنه للقطعتين $[AC]$ و $[HF]$ نفس المنصف . . . (1)



بما أن $AE = GC$ و $(AE) \parallel (GC)$ فإن الرباعي $AEGC$ متوازي أضلاع.

ومنه للقطعتين $[AC]$ و $[EG]$ نفس المنصف . . . (2)



من (1) و (2) نجد أن للقطعتين $[HF]$ و $[EG]$ نفس المنصف. منتصف القطعتين $[HF]$ و $[EG]$ هو منصف $[AC]$ ، وبالتالي هو مركز متوازي الأضلاع $ABCD$.

2. بما أن للقطعتين $[HF]$ و $[EG]$ نفس المنصف، فإن الرباعي $EFGH$ متوازي أضلاع.

تعاليق

إن إنجاز شكل مناسب بدقة يساعد على تخمين طريقة الإثبات.

نرسم قطع المستقيمات $[AC]$ ، $[HF]$ ، $[EG]$ ، $[BD]$ فنلاحظ أنه يمكن أن نبين أن لكل من القطعتين $[FH]$ و $[EG]$ نفس المنصف مع قطعة أخرى مثل $[AC]$ أو $[DB]$.

يكون رباعي متوازي أضلاع إذا كان فيه ضلعان متقابسان وحاملاهما متوازيين.


طريقة

لإثبات أن قطعتي مستقيم متتسقان يمكن إثبات أنهما قطران في متوازي أضلاع.

لإثبات أن رباعي هو متوازي أضلاع يمكن إثبات أن قطريه متتسقان.

• المثلثات

(1) استعمال متوازي الأضلاع لإثبات أن المتوسطات في مثلث متقطعة في نقطة واحدة




مثلث ABC متوازي كيفي.

1. بين أن متوسطاته (AA') ، (BB') ، (CC') متقطعة في نقطة واحدة G (تسمى النقطة G مركز نقل المثلث ABC).

2. بين أن $AG = 2GA'$ ، واستنتج أن $BG = 2GB'$ و $CG = 2GC'$.

تعاليق

حل



1. نرسم المتوسطين (CC') ، (BB') ، (AA') فيتقاطعان في نقطة نسميها G ، ولنبين أنَّ المتوسط (AA') يشمل G ولنبيان أنَّ (AG) يشمل A' منتصف $[BC]$ أو (AG) يشمل A'' منتصف $[AA']$.
لتكن $"A"$ نظيرة النقطة A بالنسبة إلى النقطة G .
- بتطبيق مبرهنة مستقيم المنتصفين في المثلث ACA'' نجد $ACA'' \sim (B'G) \parallel (CA'')$.
 - بتطبيق مبرهنة مستقيم المنتصفين في المثلث ABA'' نجد $C'G \parallel (BA'')$.
 - بتطبيق مبرهنة مستقيم المنتصفين في المثلث BGA' نجد $(BG) \parallel (CA'')$ و $(BG) \parallel (BA'')$ نجد أنَّ $BGCA''$ متوازي أضلاع، وقطراه $[GA'']$ و $[BC]$ متتسقان.
 - ومنه المستقيم (AG) يشمل A' مننصف $[BC]$.
2. لدينا $AG = GA''$ لأنَّ A نظيرة النقطة A'' بالنسبة إلى النقطة G .
و $GA'' = 2GA'$ لأنَّ $BGCA''$ متوازي أضلاع.
ومنه $AG = 2GA'$.
لدينا $BG = 2GB'$ ، $A''C = BG$ و $A''C = 2GB'$ ، ومنه $CG = 2GC'$
ونفس الطريقة نجد $AH = 2GH$.

- إن وجود منتصفات أضلاع مثلث في نص المسألة يساعد على تخمين طريقة للإثبات اعتماداً على مبرهنة مستقيم المنتصفين.
- $[AA']$ يشمل G معناه $[A] \sim (AG)$ يشمل A' معناه أيضاً $[A'G]$ يشمل A .
- نستعمل نقطة أخرى من المستقيم (AG) ولتكن $"A"$ نظيرة النقطة A بالنسبة إلى النقطة G والاستفادة من كون G مننصف $[AA']$.


طريقة

- لإثبات أنَّ ثالث مستقيمات متتقاطعة في نقطة واحدة، يمكن أن نثبت أنَّ أحدهما يشمل نقطة تقاطع الآخرين.

(2) مستقيم أولر (*)


3. بين أنَّ النقطة O ، G ، H في استقامية. (يسمى المستقيم (OH) مستقيم أولر)

4. بين أنَّ $HG = 2GO$



حل

1. لتكن D نقطة من الدائرة المحيطة بالمثلث ABC مقابلة قطرياً للنقطة A لدينا (CH) و (BD) متوازيان لأنَّ كلاً منهما عمودي على (AB) .
و (CD) و (BH) متوازيان لأنَّ كلاً منهما عمودي على (AC) .
ومنه الرباعي $CDBH$ متوازي أضلاع.
ومنه نستنتج أنَّ النقطة A' (مننصف $[CB]$) هي مننصف $[HD]$. كلٌ من (AA') و (HO) متوسط في المثلث AHD ، ومنه مركز نقل المثلث AHD (نقطة تقاطع متوسطاته) تقسم كلاً من $[HO]$ ، $[AA']$ بنسبة إثنين




تعاليق

- الشكل الأولي.
- نبين أنَّ المستقيم المعين بنقطتين من

(*) أولر (ليونارد) عالم سويسري (1707-1783) اشتهر في العلوم الفيزيائية والفالك وترك عدَّة قوانين وخواص في الرياضيات تحمل اسمه.

إلى ثلاثة، فهي النقطة G . ومنه النقطة G ، O ، H في استقامية.
2. بما أن G مركز تقل المثلث AHD فإن $HG = 2 GO$ (يمكن الاستفادة من التمرين السابق $(1 \cdot 2)$)




- ملاحظة: بطريقة مماثلة للطريقة السابقة يتم البرهان في حالة المثلث ABC منفرج الزاوية.

النقطة H ، O ، G يشمل النقطة الثالثة، وفي هذه الحالة سنبين أن المستقيم (HO) يشمل النقطة G .

- طريقة
- لإثبات أن ثلات نقط في استقامية، يمكن أن نثبت أن المستقيم المعين بنقطتين منها يشمل النقطة الثالثة.
 - لإثبات أن ثلات نقط في استقامية، يمكن أن نثبت أنها تنتمي إلى نفس المستقيم.

• مبرهنة فيثاغورس - النسب المثلثية

(1) استعمال مبرهنة فيثاغورس أو عكسها للتأكيد من أن مثلثا قائم أو غير قائم
مربع $ABCD$ طول ضلعه $AB = 5 cm$ ، $DC = 5 cm$ منتصف L من $[DC]$ و نقطة من $[BC]$ هي $CN = 1,25 cm$ حيث $BN = 3,75 cm$ ، $AN = 2,75 cm$
أي المثلثين ANB ، ALM هو مثلث قائم ؟



حل

أولاً: حساب مربع طول كل ضلع من أضلاع المثلث ANB بتطبيق مبرهنة فيثاغورس

• في المثلث ANB :

$$AN^2 = AB^2 + BN^2 = 5^2 + (3,75)^2 = 39,0625$$

• في المثلث ALM :

• في المثلث LCM :

$$LM^2 = LC^2 + CM^2 = (2,5)^2 + (1,25)^2 = 7,8125$$

نلاحظ أن $AM^2 = AL^2 + LM^2$:

وحساب المبرهنة العكسية لمبرهنة فيثاغورس فإن المثلث ANB قائم في L

ثانياً: حساب مربع طول كل ضلع من أضلاع المثلث ANB فنجد:

$$NB^2 = 10,5625 \quad AB^2 = 25 \quad AN^2 = 7,5625$$

لو كان المثلث ANB قائماً، لكان قائماً في N ، لأن $[AB]$ هو أطول ضلع فيه، ولكن $AB^2 = AN^2 + NB^2$ حسب مبرهنة فيثاغورس.

لكن $AB^2 \neq AN^2 + NB^2$ و منه $AN^2 + NB^2 = 18,125$ ومنه المثلث ANB ليس قائماً.

تعاليق

- نلاحظ أنه يمكن تطبيق مبرهنة فيثاغورس لحساب مربع طول كل ضلع من أضلاع المثلث ANB .

- لا داعي لحساب أطوال الأضلاع، إذ يمكن الالتفاء بمربعاتها.

طريقة

- لإثبات فيما إذا كان مثلث ما قائماً (أو غير قائم)، يمكن حساب مربع طول كل ضلع من أضلاعه، ثم تطبيق مبرهنة فيثاغورس أو عكسها.

(2) استعمال النسب المثلثية في مثلث قائم لحساب أطوال

يمثل الشكل مثلثا ABC قائما في B ، و D نقطة من $[BC]$ حيث $DAC = 13^\circ$ ، $AB = 10 \text{ cm}$ $BAD = 23^\circ$. احسب CD (تعطى القيمة مدوررة إلى الوحدة).


حل	تعاليق
<p>لدينا $CD = CB - DB$ ومنه نبدأ بحساب CB و DB.</p> <p>$\tan 36^\circ = \frac{BC}{10} : \widehat{ABC}$ ، منه $CB = 10 \tan 36^\circ$</p> <p>في المثلث القائم ACD ، $\tan BAC = \frac{CD}{AB} : ACD$ ، منه $DC = 10 \tan 23^\circ$</p> <p>ومنه $CD = 10 \tan 36^\circ - 10 \tan 23^\circ = 10(\tan 36^\circ - \tan 23^\circ)$ وتنظر الآلة الحاسبة الناتج الآتي:</p> <p>$10(\tan 36^\circ - \tan 23^\circ) = 3,020677118$</p> <p>وبالتدوير إلى الوحدة نجد $CD \approx 3 \text{ cm}$</p>	<ul style="list-style-type: none"> يمكن حساب أطوال أضلاع كل من المثلثين القائمين ABC ، ACD باستعمال النسب المثلثية.

طريقة

- لحساب أطوال باستعمال النسب المثلثية نبدأ بتحديد المثلث القائم الذي سنطبق عليه النسبة (أو النسب) المثلثية المناسبة.

• مبرهنة طالس

(OY) و (OX) نصفا مستقيمين متتقاطعين في النقطة O ، النقطتان L ، M من (OX) والنقطتان B ، C من (OY) حيث $LM = 1,6 \text{ cm}$ ، $OL = 3 \text{ cm}$ ، $OC = 6,5 \text{ cm}$. (LB)//(MC) و (OB)//(OC)



1. احسب الطول BC (تعطى القيمة مدوررة إلى $0,01$)

2. نقطة من (OB) و N نقطة من (OC) حيث: (MA)//(NB) هل المستقيمان (LA) و (NC) متوازيان؟ برر جوابك.

حل	تعاليق
<p>1. بما أن L من (OM) و B من (OC) و (OB)//(OC) فإن $\frac{OL}{OM} = \frac{LB}{MC}$ (حسب مبرهنة طالس) . لدينا: $\frac{3}{4,6} = \frac{OB}{6,5}$ ومنه $OB \approx 4,24$ و $BC = OC - OB = 6,5 - 4,24 = 2,26 \text{ cm}$</p> <p>2. بما أن L من (OM) و B من (OC) و (OB)//(OC) فإن $\frac{OL}{OM} = \frac{LB}{MC}$ (1) ... بما أن N من (OM) و B من (OA) و (OB)//(OA) فإن $\frac{ON}{OM} = \frac{NB}{AB}$</p>	<ul style="list-style-type: none"> نطبق مبرهنة طالس مباشرة ونبدأ بحساب الطول OB. أضلاع المثلثين OLB و OMC متناسبة


و $(NB) \parallel (MA)$
 فإنّ $\frac{OM}{ON} = \frac{OA}{OB} = \frac{MA}{NB}$
 من (1) و (2) ...
 $OM \times OB = OL \times OC = ON \times OA$
 ومنه $\frac{OL}{ON} = \frac{OA}{OC}$
 وبما أنّ كلاً من النقط O, L, N, A, C في استقامية
 وبنفس الترتيب.
 فإنّ $(LA) \parallel (NC)$ (حسب المبرهنة العكسية لمبرهنة طالس)

- بما أنّ كلاً من النقط O, C, A, L, N في استقامية وبنفس الترتيب، نقارن النسبتين $\frac{OA}{OC}$ و $\frac{OL}{ON}$.

طريقة

- لتطبيق مبرهنة طالس نبدأ أولاً بتحديد عناصر الشكل التي تسمح بكتابة التنااسب، ثم الاستفادة من هذا التنااسب حسب الحاجة.
- لتطبيق عكس مبرهنة طالس نبحث عن نسبتين متساويتين، تمكّنا من استنتاج توازي مستقيمين.

• الزوايا والدائرة



في الشكل المقابل (C) دائرة مركزها O منتصف [AB] و نقطتان متباينتان من (C)، المستقيم الذي يشمل النقطة N و يوازي (MA) يقطع (C) في النقطة F، والمستقيم الذي يشمل النقطة N و يوازي (MB) يقطع (C) في النقطة E.
 1. ما نوع الرباعي AEBF ؟
 2. بين أن $MN = AF$

حل
 1. بما أنّ \widehat{AMB} قائمة (لأنّ [AB] قطر في الدائرة (C))

و $(MB) \parallel (NE)$ و $(MA) \parallel (NF)$.
 فإنّ \widehat{ENF} قائمة.
 ومنه $[EF]$ قطر في الدائرة (C)
 نستنتج أنّ $\widehat{EF} = \widehat{AB}$ و $\widehat{EF} = \widehat{MN}$ متناظران ومتقابسان ومنه
 الرباعي AEBF مستطيل.

2. لدينا $(MA) \parallel (NF)$ و $(MF) \parallel (NE)$ قاطع لهما ومنه فإنّ $\widehat{AMF} = \widehat{MFN}$ بالتبادل الداخلي، وبما أنّ كلاً منهما زاوية محيطية فإنّ القوسين اللذين تحصرا بهما متقابسان. أي $\widehat{MN} = \widehat{AF}$ ومنه $MN = AF$

- لدراسة طبيعة الرباعي AEBF يمكن البحث عن الخواص المتعلقة بقطريه $[FE]$ و $[AB]$.

- لإثبات أنّ $MN = AF$ يكفي أن نثبت أنّ $\widehat{MN} = \widehat{AF}$.

طرائق

- لدراسة طبيعة رباعي يمكن البدء بدراسة فيما إذا كان قطران متناظران أو متعامدين أو متقابسان أو
- لإثبات أنّ قطعة مستقيم هي قطر في دائرة يكفي أن نثبت أنها وتر في مثلث قائم رؤوسه من هذه الدائرة.
- لإثبات أنّ وتران في دائرة متناظران يكفي أن نثبت أنّ القوسين اللذين تحصرا بهما متقابسان.

المثلثات المتقايسة والمثلثات المتشابهة


(1) استعمال المثلثات المتقايسة لإثبات تقايس قطعى مستقيم (تساوي طولين) أو تقايس زاويتين

دائرتان لهما نفس المركز O , $[BB']$ قطر في

\cdot قطر في (C) و $[AA']$ قطر في (C')

\cdot بين أن $AB = A'B'$

\cdot بين أن $\widehat{OAB} = \widehat{OA'B'}$




حل	تعالق
<p>لدينا $\widehat{AOB} = \widehat{A'OB'}$ بال مقابل بالرأس $OB = OB'$ و B من الدائرة نفسها $OA = OA'$ و A من الدائرة نفسها ومنه فإن المثلثين OAB و $O'A'B'$ متقايسان.</p> <p>نكتب الرؤوس المتماثلة:</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> $O \quad A \quad B$ $O \quad A' \quad B'$ </div> <p>نستنتج أن</p> $\cdot AB = A'B' \quad .1$ $\cdot \widehat{OAB} = \widehat{OA'B'} \quad .2$	<ul style="list-style-type: none"> يمكن ملاحظة أن المثلثين $A'OB'$ و AOB متناظران بالنسبة إلى النقطة O، ومنه استنتاج تقايسهما. كتابة الرؤوس المتماثلة في مثلثين متقايسين يساعد على استنتاج العناصر المتقايسة.

طرائق
<ul style="list-style-type: none"> لإثبات تقايس قطعى مستقيم (تساوي طولين)، يمكن إثبات أنهما ضلعان متماثلان في مثلثين متقايسين. لإثبات تقايس زاويتين، يمكن إثبات أنهما زاويان متماثلان في مثلثين متقايسين.

(2) استعمال المثلثات المتشابهة لإثبات العلاقات المترية في المثلث القائم وبرهان مبرهنة

فيثاغورس



حل	تعالق
<p>لدينا في المثلثين القائمين \widehat{ABC} و \widehat{ACH} الزاوية A مشتركة، ومنه المثلثان ABC و ACH مشابهان.</p> <p>نكتب الرؤوس المتماثلة</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; display: inline-block;"> $A \quad B \quad C$ $H \quad A \quad C$ </div> <p>ومنه</p> $\frac{AB}{HA} = \frac{AC}{HC} = \frac{BC}{AC}$ <p>(أ) من النسبة الأولى والثالثة نجد</p> $AB \times AC = AH \times BC$ <p>وتكتب</p> <p>(ب) من النسبة الثانية والثالثة نجد</p> $AC \times AC = HC \times BC$ <p>وتكتب</p> $AC^2 = CH \times CB$ <p>بنفس الطريقة السابقة نجد من تشابه المثلثين ABH و ABC أن</p> $AB^2 = BH \times BC$	<ul style="list-style-type: none"> يكفي لتشابه مثلثين قائمين أن تقايس زاوية حادة من أحدهما مع زاوية من الآخر.

ج) لدينا $\widehat{CAH} + \widehat{HAB} = \widehat{ABH} + \widehat{HAB} = 90^\circ$ لأن $\widehat{CAH} = \widehat{ABH}$

وبالتالي فالمتلثان AHB و CHA متشابهان

$$\begin{array}{c|c} A & H & B \\ C & H & A \end{array} \quad \text{الرؤوس المتماثلة} \quad \frac{AH}{CH} = \frac{AB}{CA} = \frac{HB}{HA} \quad \text{ومنه}$$

من النسبة الأولى والثالثة نجد $AH \times HA = CH \times HB$

وتكلب $AH^2 = HC \times HB$

$$\begin{aligned} \text{د) من الجزء (ب) نجد} \quad AB^2 + AC^2 &= (BH \times BC) + (CH \times CB) \\ &= BC \times (BH + HC) = BC^2 \end{aligned}$$


طريقة

- لكتابة التناسب بين أطوال الأضلاع المتماثلة لمثلثين متشابهين يستحسن البدء بكتابة الرؤوس المتماثلة تحت بعضها.

- لإثبات صحة مساواة تحتوي على جداء أطوال يمكن استعمال التناسب الناتج عن تشابه مثلثين حيث الأطوال الواردة في المطلوب هي بعض أطوال أضلاعهما.

• التحويلات النقاطية

استعمال الدوران لإثبات أنّ نقطا في استقامية




[AB] قطعة مسنقيم، C نقطة منها، كل من المثلثين ACE و BDC متباين الأضلاع قطعة المستقيم [EB] [CD] نقطتين M في النقطة M ، N نقطة من [CE] حيث $CN = CM$. بين أنّ النقط A ، N ، D في استقامية.

حل

تعالق

- لدينا $\widehat{ECD} = 60^\circ$ $\widehat{ACE} = \widehat{DCB} = 60^\circ$ ومنه $\widehat{ACD} = 60^\circ$
- نعتبر الدوران الذي يرتكزه النقطة C وزاويته 60° في الاتجاه المباشر، إنه يحوال النقطة B إلى النقطة D ، النقطة M إلى النقطة N والنقطة E إلى النقطة A . وبما أنّ النقط D ، B ، M ، E في استقامية فإنّ النقط D ، N ، A في استقامية أيضا.

- إن $CE = CA$ و $CB = CD$ لأن كلاً من المثلثين BDC و ACE متباين الأضلاع.




طريقة

- لإثبات أنّ نقطا هي في استقامية يمكن إثبات أنها صور نقط في استقامية بتناسب.

تعلم البرهنة

نالج في هذه الفقرة مسألتين بهدف تعلم الاستدلال بواسطة التحليل والتركيب في الإنشاءات الهندسية والبحث عن مجموعات النقط.



المشأة الأولى:

زاوية XOY و I نقطة لا تنتمي إلى أحد ضلعها.

علم نقطة M من (OX) و N من (OY) بحيث تكون النقطة I منتصف $[MN]$.

حل

مرحلة التحليل:

وفيها نمثل الشكل المطلوب إنشاؤه برسم مناسب، لتحليل ودراسة بعض خواص عناصره والتي يمكن أن يستخلص منها قواعد للإنشاء.



ومنه صورة النقطة N بالتناظر بالنسبة إلى النقطة I هي النقطة M .


وبما أن النقطة N تنتمي إلى نصف المستقيم (OY) فإن النقطة M تنتمي إلى $(O'Y')$ صورة (OY) بالتناظر بالنسبة إلى النقطة I .

ومنه فالنقطة M هي تقاطع (OX) و $(O'Y')$.

مرحلة التركيب

نشي $(O'Y')$ نظير (OY) بالنسبة إلى النقطة I

(وذلك بتعيين O' نظيرة O بالنسبة إلى I ، و A' نظيرة نقطة A من (OY) بالنسبة إلى I)



يقطع (OX) و (OY') في نقطة M لأن $(OY) \parallel (O'Y')$ نرسم (MI) فيتقاطع مع (OY) في نقطة N .

ومنه النقطتان M و N تتحققان المطلوب.


ملاحظة: نحصل على نفس الحل برسم صورة (OX) بالتناظر بالنسبة إلى النقطة I .

خلاصة:

لإنشاء نقطة (أو مجموعة نقط) تحقق شروط معينة، يمكن إتباع المراحل الآتية:

1. مرحلة التحليل: وفيها نفرض أن المسألة حلا، ونرسم شكلًا مناسباً عادةً ما يتم رسمه بالعكس (أي بدء بتمثيل المطلوب)، ثم ندرس الخواص والارتباطات بين عناصر الشكل واستخلاص القواعد التيتمكن من إنجاز الشكل المطلوب بدقة.

2. مرحلة التركيب: وفيها يتم إنجاز الشكل المطلوب باستعمال القواعد والخواص المتحصل عليها في مرحلة التحليل، والتتأكد من أن النقطة (أو مجموعة النقط) المنجزة تتحقق المطلوب، وكذلك عدد الحلول الممكنة.




إعادة استثمار

رسم أحمد زاوية XOY فوق رأسها خارج حيز الورقة ، وعلم نقطة


M كما هو مبين في الشكل. بين كيف سيشي المستقيم الذي يشمل

النقطتين M ، O باستعمال حيز الورقة فقط أي دون تعليم النقطة O .

المسالة الثانية:



(C) دائرة مركزها O ، و A نقطة ثابتة من (C) ، و M نقطة متغيرة من (C) . نرمز بـ N لمنتصف $[AM]$. ما هي مجموعة النقطة N عندما تمسح النقطة M كلّ نقط الدائرة (C) .



نرسم عدة نقاط ونستغلها لتخمين النتيجة، والتي هي في هذه الحالة دائرة قطرها $[AO]$

حل

نرمز بـ (E) لمجموعة النقطة N المطلوبة، ولتكن (C') دائرة التي قطرها $[AO]$ ، ولنبين أن $(C') = (C)$.

إنّ المجموعة (E) ليست خالية، لأنّها على الأقل تشمل النقطتين A و O :


1. إذا كانت النقطة M متطبقة على النقطة A فإنّ N هي النقطة A نفسها.

2. إذا كانت النقطة M مقابلة قطرياً للنقطة A فإنّ النقطة N هي النقطة O .

لتبين أن كلّ نقطة من (E) تتبع إلى (C') أي (E) محتواء في (C') .

لتكن M نقطة ما من (C) مختلفة عن A وغير مقابلة قطرياً لها، و N منتصف $[AM]$.

إنّ المثلث AOM متساوي الساقين ($OA = OM$)، و (ON) متوسط متعلق بالضلع $[AM]$ ، ومنه فإنّ $(ON) \perp (AM)$



نسنترج أنّ المثلث ANO قائم في N ومنه فإنّ النقطة N تتبع إلى الدائرة التي قطرها $[AO]$.


أي النقطة N تتبع إلى الدائرة (C') .

2. لتبين أن كلّ نقطة من (C') تتبع إلى (E) أي (C') محتواء في (E) .

لتكن N نقطة ما من (C') مختلفة عن A وعن O ، و M نقاط (AN) و (C) .

إنّ $ONA = 90^\circ$ ومنه فإنّ (ON) ارتفاع في المثلث AOM

وبما أنّ المثلث AOM متساوي الساقين فإنّ (AN) متوسط و منه N منتصف $[AM]$



نسنترج مما سبق أنّ مجموعة النقط N منتصف $[AM]$ عندما تمسح النقطة M الدائرة (C) هي الدائرة (C') التي قطرها $[OA]$.

خلاصة

البحث عن مجموعة نقط تحقق شروط معينة، يمكن إثبات المراحل الآتية:


1. **تخمين النتيجة:** ننجز شكلاً فيه النقطة المتحركة في عدة وضعيات، ونستغلها لتخمين حول ما قد تكون المجموعة المطلوبة: مستقيم، أو جزء من مستقيم، أو دائرة، ... إلخ. (تشير إلى أن برامج الإعلام الآلي الخاصية بالهندسة المتحركة تساعد على التخمين في هذا المجال)

2. **إثبات التخمين:** نبين تساوي المجموعة التي وجدناها أثناء التخمين مع المجموعة المطلوبة.

إعادة استئمار

(C) دائرة مركزها O ، و B نقطة منها و A نقطة خارجها. المستقيم (AB) ينبع من النقطة D .

ما هي مجموعة النقط M منتصف $[BD]$ عندما تمسح النقطة B الدائرة (C) ؟



استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال

تمهيد: تسمى ثلاثة الأعداد الطبيعية (5 ; 4 ; 3) ثلاثة فيثاغورسية من الأعداد الطبيعية لأنَّ الأعداد 3 ، 4 ، 5 تصلح لأنَّ تكون أطوال أضلاع مثلث قائم الزاوية.

الهدف من هذا الشاطئ هو البحث عن ثلاثة فيثاغورسية من الأعداد الطبيعية باستعمال برنامج EXCEL .

1. x و y عدوان طبيعيان حيث $y > x$. بين أن ثلاثة الأعداد $(x^2 - y^2 ; 2xy ; x^2 + y^2)$ هي ثلاثة فيثاغورسية، أي تصلح لأنَّ تكون أطوال أضلاع مثلث قائم الزاوية.

2. نعتبر الآن مثلثاً ABC قائماً في A ، حيث: $AB = x^2 - y^2$ و $AC = 2xy$ مع $x > y$ ، فيكون $BC = x^2 + y^2$ ، ولنبحث عن AB ، AC ، BC باستعمال برنامج EXCEL ، من أجل ذلك:

- افتح برنامج EXCEL
- أكتب في السطر الأول اسم المشروع: "البحث عن ثلاثة فيثاغورسية من الأعداد الطبيعية"
- سُمِّي الأعمدة في السطر الثاني كما هو موضح في الشكل.
- أدخل في الخلية $C3$ الدستور $=A3^2 - B3^2$ ثمْ أضغط على المسة سيظهر عندئذ العدد 0 في الخلية $C3$.

البحث عن ثلاثة فيثاغورسية من الأعداد الطبيعية								
		AB	AC	BC		$AB^2 + AC^2$	BC^2	
1	x	y				$=C3^2 + D3^2$	$=E3^2$	
2			$-A3^2 - B3^2$	$-2 * A3 * B3$	$-A3^2 + B3^2$			
3								
4								

- كرر العملية السابقة في الخلية $D3$ والدستور $=2 * A3 * B3$ ، وفي الخلية $E3$ الدستور $=A3^2 + B3^2$ ، وفي الخلية $G3$ الدستور $=C3^2 + D3^2$ ، وفي الخلية $H3$ الدستور $=E3^2$. تحصل على جدول كما في الشكل.


البحث عن ثلاثة فيثاغورسية من الأعداد الطبيعية								
		AB	AC	BC		$AB^2 + AC^2$	BC^2	
1	x	y						
2			0	0	0			
3						0	0	
4								

- أكتب العدد 2 في الخلية $A3$ والعدد 1 في الخلية $B3$ ولاحظ النتائج.
- غير القيم المرفقة للعددين x و y ولاحظ النتائج.
- يمكنك استعمال أسطر أخرى بنقل العبارات المدخلة في السطر الثالث.

البحث عن ثلاثة فيثاغورسية من الأعداد الطبيعية								
		AB	AC	BC		$AB^2 + AC^2$	BC^2	
1	x	y						
2	2	1	3	4	5	25	25	
3	3	1	8	6	10	100	100	
4	3	2	5	12	13	169	169	
5	4	1	15	8	17	289	289	
6	4	2	12	16	20	400	400	
7	4	3	7	24	25	625	625	
8	4	5	24	10	26	676	676	

حل مسألة إدماجية

نص المقالة



(C) و (C') دائرتان مركزاهما O و O' ونصفا قطريهما $6cm$ و $2cm$ على الترتيب، ومتستان خارجيا في النقطة A . (A) مماس مشترك لهما خارجيا في نقطتين M و N على الترتيب. المماس المشترك لهما في النقطة A يقطع (A) في النقطة B .

١. بين أن $BA = BM = BN$ واستنتج نوع المثلث $.AMN$
 ٢. ما نوع المثلث ' BOO' ؟ برب جوابك.
 ٣. أحسب MN (تعطى القيمة مدورة إلى $0,01$)
 ٤. أحسب قيس الزاوية ' BOO '، واستنتج الأقياس \widehat{C}
 ٥. نسمّي E نقطة تقاطع (OB) ، (AM) و F نقطة $AFBE$ ؟ احسب مساحته (تعطى القيمة مدورة إلى $0,01$)
 ٦. بين أن $(MO) // (NO)$

حل

- بما أنّ (4) مماس للدائرة (C) في النقطة M , فإن المثلث OMB قائم في M . فحسب مبرهنة فيثاغورس نجد

$$BM = \sqrt{OB^2 - OM^2}$$
 بما أنّ (AB) مماس للدائرة (C) في النقطة A , فإن المثلث OAB قائم في A . فحسب مبرهنة فيثاغورس نجد

$$BA = \sqrt{OB^2 - OA^2}$$
 ولدينا $OM = OA$ (من الدائرة (C)) ومنه

$$OB^2 - OM^2 = OB^2 - OA^2$$
 وبالتالي

$$BM = BA \quad (1)$$
 وبنفس الطريقة السابقة نبين أن

$$BN = BA \quad (2)$$
 من (1) و (2) نجد

$$BA = BM = BN$$
 نستنتج أن النقط A و M و N تنتهي إلى الدائرة التي مركزها النقطة B منتصف $[MN]$, ومنه المثلث AMN قائم في A .

2. المثلث BOO' قائم في B لأنّ:

لدينا (BO') محور $[AN]$ (كل من النقطتين B و O' متساوية المسافة عن طرفيها) و (BO) محور $[AM]$ (كل من النقطتين B و O متساوية المسافة عن طرفيها) وبما أن $(BO) \perp (BO')$ فأن $(AM) \perp (AN)$.

$$BA^2 = AO \times AO' \\ = 6 \times 2 = 12$$

$$BA = 2\sqrt{3} \text{ cm}$$

و منه

في المثلث ABO القائم في A لدينا $BA = 2\sqrt{3} \text{ cm}$ و $OA = 6 \text{ cm}$ وبالتالي

$$\widehat{BOA} = 30^\circ \text{ ومنه } \tan(\widehat{BOA}) = \frac{2\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$


نستنتج أن:

(لأن المثلث BOO' قائم في B) $\widehat{BOO'} = 60^\circ$
 و $\widehat{AMN} = 30^\circ$ (لأن MOA مركزية و AMN محاطة وتحصران نفس القوس \widehat{AM})
 و $\widehat{MNA} = 60^\circ$ (لأن المثلث MNA قائم في A)

5. لدينا مما سبق: $(EA) \perp (EB)$ و $(FA) \perp (FB)$ و $(AM) \perp (AN)$ مستطيل.

$$FA = \frac{1}{2} NA = \frac{1}{2} BA = \sqrt{3} \text{ cm} \quad , \quad EA = \frac{1}{2} MA = \frac{1}{2} OA = 3 \text{ cm}$$

و منه مساحة $AFBE$ تساوي :



6. لتكن L نقطة تقاطع (Δ) و (OO')

- بما أن N من (LB) و A من $(NA) \parallel (BO)$ و

$$(I) \dots \frac{LN}{LB} = \frac{LA}{LO} = \frac{NA}{BO}$$

- بما أن B من (LM) و O' من $(BO') \parallel (MA)$ و

$$(2) \dots \frac{LB}{LM} = \frac{LO'}{LA} = \frac{BO'}{MA}$$


من (I) و (2) نجد $\frac{LN}{LM} = \frac{LO'}{LO}$

$$\frac{LN}{LM} = \frac{LO'}{LO}$$


و منه

وبما أن كلًا من النقط L, N, M والنقط L, O', O في استقامة وبنفس الترتيب.
 فإن $(NO') \parallel (MO)$ (حسب المبرهنة العكسية لمبرهنة طالس)


تمارين و مسائل




12. نستنتج من بيانات الشكل المقابل أنّ:
 $(EF) \parallel (GH) \parallel (BC)$




13. نستنتج من بيانات الشكل المقابل أنّ:
 أ) الزاوية \widehat{ABC} تساوي 60°
 ب) $BC = a \frac{\sqrt{3}}{2}$



14. أجب باستعمال بيانات الشكل.
 أ) النقط D, C, B, A تتبعن إلى دائرة واحدة.
 ب) الدائرة التي تشمل النقط A, D, C, B مرکزها منتصف $[AD]$.
 ج) محور $[AD]$ يشمل منتصف $[BC]$.




15. نستنتج من بيانات الشكل المقابل أنّ المثلث A, B, C قائم في A .



16. نستنتج من بيانات الشكل المقابل أنّ القطعتين $[AB]$ و $[CD]$ متتقابستان.

17. في المثلث ABC القائم في A إذا كان $BC=12,5\text{cm}$ و $AC=12\text{cm}$ فإنّ $AB=5\text{cm}$

18. الدائرة المحيطة بالمثلث الوارد في التمرين 17 قطرها 13cm .



19. لدينا في الشكل المقابل:
 أ) بيانات الشكل لا تكفي لحساب الطول $.BC$
 ب) $BC \approx 6,4\text{cm}$

أصحح أم خطأ؟

1. إذا كان في رباعي ضلعان متقابلان متقاربين وحملان الضلعين الآخرين متوازيين فإنّ الرباعي متوازي أضلاع.

2. كل رباعي يقبل مركز تناظر هو متوازي أضلاع.

3. الرباعي $ABCD$ الممثل متوازي أضلاع.

4. إذا كان $[AB]$ و $[CD]$ قطران في دائرة فإنّ $ABCD$ هو مستطيل أو مربع.

5

- أ) كل رباعي قطران متعامدان هو معين.
 ب) كل رباعي أضلاعه متقاربة هو معين.
 ج) متوازي الأضلاع الذي إحدى زواياه قائمة هو مستطيل

6. يوجد مثلث فيه منصفان متعامدان.


7. نستنتج من بيانات الشكل $(AO) \perp (BC)$ المقابل أنّ

8. مركز الدائرة المرسومة داخل مثلث هي نقطة تقاطع متواسطاته.

9. المتوسط في مثلث يقسمه إلى جزئين لهما نفس المساحة

10. لا يوجد مثلث أطوال أضلاعه $2,4\text{cm}$, $7,2\text{cm}$, 5cm


11. المثلث الذي أطوال أضلاعه 24cm , 7cm , 25cm هو مثلث قائم.




.27. معين ، النقطة A' نظيرة النقطة

بالنسبة إلى النقطة D ، النقطة B' نظيرة
النقطة C بالنسبة إلى النقطة B ، النقطة C'
نظيرة النقطة C بالنسبة إلى النقطة D .
أنجز شكلاً مناسباً، وعيّن نوع كلٍ من
. $ACA'C'$ ، $ACB'D$ ، الرّباعيّين

.28. متوازي أضلاع، المستقيم العمودي
على (BD) الذي يشمل النقطة O يقطع $[AD]$
و $[BC]$ في E و F على الترتيب.
ما نوع الرباعي $? BFDE$




.29. متوازي أضلاع ، نقطة من M نظيرة من
 (EH) يوازي (AD) ويشمل النقطة M
 (FG) يوازي (AB) ويشمل النقطة M ،
 (FG) ،



قارن بين مساحة $EBFM$ ومساحة $.HDGM$

.30. متوازي أضلاع ، M نقطة داخله.




قارن بين مجموع مساحتى CDM ، ABM ،
ومجموع مساحتى $.BCM$ ، ADM .

.31. متوازي أضلاع ، النقطة
 $[CD]$ ، $[BC]$ ، $[AB]$ منصفات أضلاعه H
 $[DA]$ على الترتيب.

(أ) ما طبيعة الرباعي $? EFGH$
(ب) بين أن لقطع $[AC]$ ، $[BD]$ ، $[EG]$ ، $[FH]$ نفس المنتصف.

(ج) قارن بين مساحتى $ABCD$ و $.EFGH$




20. باستعمال معطيات

الشكل المقابل:

- (أ) لا يمكن حساب الطول AM
- (ب) $AM \approx 2,5$

21. $[BD]$ و $[AC]$ وتران من دائرة
متقاطعان في النقطة E .



(أ) المستقيمان (AD) و (BC)

متوازيان.

(ب) المثلثان DEC و AEB

متشابهان.

$$AE \times EC = DE \times EB \quad (ج)$$


.22

(أ) للمثلث المتقايس الأضلاع مركز تناظر.

(ب) التناظر المركزي لا يحفظ استقامية الخط.

(ج) صورة مثلث بانسحاب هو مثلث يقايسه.

23. يوجد أكثر من تحويل نقطي واحد يحول أحد
مستقيمين متوازيين إلى الآخر.



.24. مربع مرکزه O ،

ال نقطتان M و N منتصفان

الضلعين $[AB]$ و $[BC]$ على
الترتيب.

(أ) النقطة A هي صورة النقطة B بالدوران
الذي مركزه النقطة D وزاويته 45° .

(ب) النقطة A هي صورة النقطة B بالدوران
الذي مركزه النقطة O وزاويته 90° .

(ج) يوجد دوران مركزه النقطة D يحول
النقطة N إلى النقطة M .

متوازي الأضلاع

25. متوازي أضلاع ، منصفان
الزوايا ADC و DCB متقاطعان في النقطة
 M .

ما نوع المثلث $? CDM$ ؟

26. في الشكل المرفق $ABCD$ متوازي أضلاع
 $[DH]$ ، $[CE]$ ، $[BF]$ ، $[AG]$ منصفات زواياه.
ما نوع الرباعي $? HGFE$

32. بين أن $[DB]$ و $[BM]$ تقسمان شبه المنحرف $ABCD$ إلى ثلاثة أجزاء لها نفس المساحة.

39. ABC مثلث كيقي (AM) المتوسط المتعلق بالرأس A ، B' ، C' ، B ، C ، A' المسقطان العموديان لل نقطتين B ، C على (AM) على الترتيب.
 أ) بين أن $CC' = BB'$.
 ب) بين M منتصف $[B'C']$ ، واستنتج طبيعة الرباعي $BB'CC'$.

40. ABC مثلث كيقي ، النقطتان D و E منتصفان $[BC]$ و $[AC]$ على الترتيب. G نقطة تقاطع $[AD]$ و $[BE]$. M نقطة تقاطع $[CG]$ و $[AB]$.
 أ) بين أن M منتصف $[AB]$.
 ب) ماذا تستنتج بالنسبة إلى المتوسطات في مثلث.
 ج) بين أن $AG = 2GD$ و $CG = 2GM$ و $BG = 2GE$.

41. $ABCD$ متوازي أضلاع ، النقطتان M ، N منتصفان $[AB]$ ، $[BC]$ على الترتيب. $[DM]$ و $[DN]$ يقطعان $[AC]$ في النقطتين G و H على الترتيب.
 بين أن: $AG = GH = HC$

42. أ) ABC مثلث متساوي الساقين رأسه الأساسي A ، بين أن نقطة تلاقي محاوره ونقطة تلاقي ارتفاعاته ، ونقطة تلاقي متوسطاته ، ونقطة تلاقي منصفاته في استقامية.
 ب) كيف تصبح هذه النقط في مثلث متقارب الأضلاع؟

43. A ، B ، C ، G ثلات نقط ليست في استقامية. أنشئ نقطة M بحيث تكون النقطة G مركز ثقل المثلث ABC .

44. A ، B ، C ، H ثلات نقط ليست في استقامية. أنشئ نقطة M بحيث تكون النقطة H نقطة تلاقي أعمدة المثلث ABC .

32. $ABCD$ متوازي أضلاع حيث $AB \neq AD$

أ) النقطتان A' و C' المسقطان العموديان

لل نقطتين A و C على (BD) على الترتيب.

ب) النقطتان M' و N' المسقطان العموديان

لل نقطتين M و N على (BD) على الترتيب.

بين أن الرباعي $MM'NN'$ متوازي أضلاع .

المثلثات والمستقيمات الخاصة في مثلث


33. (C) و (C') دائرتان لهما نفس المركز O ، المستقيمان

(AB) و (CD) يشمان النقطة

O ، ويقطعان (C) و (C') في

C ، D ، A و B على الترتيب .

بين أن: $(AD) \parallel (BC)$



34. بين أن مساحة المثلث تساوي نصف جداء محيطه ونصف قطر الدائرة المرسومة داخله.

35. بين أن:

أ) كل متوسط في مثلث يقسمه إلى جزئين لهما نفس المساحة.

ب) المتوسطات في مثلث تقسمه إلى ستة أجزاء لها نفس المساحة.

36. ABC مثلث كيقي ، A' نظيره


B بالنسبة إلى B' ، B' نظيره A

C' نظيره C بالنسبة إلى

A بالنسبة إلى

احسب مساحة المثلث $A'B'C'$ بدلالة مساحة المثلث

$.ABC$



37. ABC مثلث متساوي الأضلاع ، M نقطة

داخله ، M_1 ، M_2 ، M_3 المسقطات العمودية


للنقطة M على أضلاع المثلث ABC . بين أن

$MM_1 + MM_2 + MM_3$ ثابت.

38. $ABCD$ شبه منحرف طول قاعدته $[DC]$ ضعف طول قاعته $[AB]$ ، M منتصف

مبرهنة فيثاغورس - النسب المثلثية

49. احسب كلا من AC و ACB في كل الحالتين الآتتين: (تعطى النتائج مدورّة إلى




50. ABC مثلث قائم في A حيث $BC=10cm$ و $\widehat{ABC}=37^\circ$ احسب (بالتدوير إلى الوحدة) مساحة ومحيط هذا المثلث.

51. أنشئ مثلثاً ABC أطوال أضلاعه $5cm$ ، $13cm$ ، $12cm$ ، وحدد طبيعته.

عين مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC ونصف قطرها.

52. مربع $ABCD$ طول ضلعه 10cm ، منتصف $[BC]$ و M نقطة من $[DC]$ حيث $AM=12,5\text{cm}$ ما نوع المثلث ALM ؟ برهن جوابك.

53. ABC مثلث قائم في A ، الارتفاع المتعلق بالضلع $[AB]$ يساوي 3cm و $CD=1\text{cm}$ احسب كلا من الأطوال : AC ، AB ، BD (تعطى النتائج مدوره إلى 10^{-2})




54. مثلث قائم في A حيث $BC=10\text{cm}$ و $\angle ABC=37^\circ$ احسب (بالتدوير إلى الوحدة) محيط ومساحة هذا المثلث.

55. ارسم متوازي أضلاع $ABCD$ حيث $\angle BAD = 115^\circ$ و $AD = 4,5\text{cm}$ و $AB = 9\text{cm}$ واحسب مساحته.
 (تعطى النتائج مدورة إلى 10^{-2})

أ) أنشئ مثلثاً ABC بحيث تكون النقطة G مركز ثقله.


ب) هل يوجد مثال وحيد يحقق المطلوب؟



46. I ، B ، C . ثالث نقط ليست في استقامية كما في الشكل.
 c ————— B أنشئ نقطة A بحيث تكون مركز الدائرة المرسومة داخل المثلث ABC .

47. ارسم مثلثاً كيفيًا ABC ، والدائرة المحيطة به (C) ، سمّ H نقطة تلاقي ارتفاعاته ، ونظيره H بالنسبة إلى (BC) ، ونظيره K بالنسبة إلى I منتصف $[BC]$.
بين أنّ K لا ينتمي إلى H ، H تنتمي إلى (C) .

48. دائرة التقط التسع أو "دائرة أولر"




ABC مثلث كيسي ، ارتفاعاته $[AH_2]$ ، $[AH_1]$ ، $[AH_3]$ مقاطعة في النقطة H و A' ، B' ، C' منصفات أضلاعه $[AB]$ ، $[AC]$ ، $[BC]$ على الترتيب ، M_1 ، M_2 ، M_3 منصفات $[CH]$ ، $[AH]$ ، $[BH]$ على الترتيب.

لإثبات إن النقط التسع H_1 ، H_2 ، H_3 ، A' ، B' ، C' تنتهي إلى دائرة واحدة (دائرة ثالثة).

أ) بين أن الرباعي $OA'HM$ متوازي أضلاع واستنتج أن القطب H_I ، A' ، M_I تنتهي إلى دائرة يطلب تعريفها.

ب) كرر نفس الاستدلال بالنسبة إلى النقط الأخرى.




60. وحدة الطول هي السنتيمتر، نريد إنشاء قطعة مستقيم طولها $\sqrt{5}$.
رسم دائرة (C) قطرها [AB] حيث $AB=5$ ، وعلم على [AB] نقطة C حيث $AC=1$ حيث I . ارسم المستقيم العمودي على (AB) الذي يشمل النقطة C فيقطع الدائرة (C) في نقطتين D ، D'.
بين لماذا كل من قطعتي المستقيم [AD] ، [AD'] طولها $\sqrt{5}$?
(نقول إننا أنشأنا العدد $\sqrt{5}$ ، ونقول أيضاً أن العدد $\sqrt{5}$ قابل للإنشاء)

61. أنشي العدد $2\sqrt{3}$

مبرهنة طالس


62. وحدة الطول هي السنتيمتر، والشكل المقابل مرسوم باليد الحرة.
أ) هل البيانات المسجلة عليه كافية للحكم فيما إذا كان المستقيمان (DE) و (AC) متوازيين أم لا ؟
ب) إذا علمت أن $AE=6 \text{ cm}$ ، فهل $? (DE) \parallel (AC)$

63. إذا علمت أن في الشكل المرفق $(CE) \parallel (DF)$ و $(AC) \parallel (BD)$ ، فيبين أن $.(AE) \parallel (BF)$



56. في الشكل المقابل للمثلث ABC قائم في A و $AC=2,5 \text{ cm}$ قائم في D و متساوي $ABC=20^\circ$ الساقين و $ACB=40^\circ$ احسب محيط و مساحة الرباعي $ACBD$ (تعطى النتائج مدورّة إلى 10^{-2})


57. في الشكل أدناه [AB] قطعة مستقيم طولها نقطة من المستقيم العمودي على (AB) في النقطة A حيث $AD=2,7 \text{ cm}$ ، و نقطة من المستقيم العمودي على (AB) في النقطة B حيث $BC=6 \text{ cm}$
(أ) عين موضع النقطة M من [AB] بحيث يكون للزوايا AMD و BMC نفس القياس.
(تعطى النتائج مدورّة إلى 10^{-2})
(ب) احسب بالتدوير إلى الوحدة قيس الزاوية \widehat{AMD} .




58. مكعب $ABCDEFGH$. النقطة M منتصف $[CD]$ ، والنقطتان L ، N ، مركزا المربعين $BFGC$ على الترتيب.
(أ) احسب أطوال أضلاع المثلث LMN بدلالة a .
(ب) احسب قيس الزاوية \widehat{LMN} بالتدوير إلى $0,1$.

59. في الشكل المرفق ABC ، ABD مثمنان قائمان في B ، $AB=40 \text{ m}$ ، $BAC=20^\circ$ ، احسب الطول $CAD=35^\circ$

- أ) $BF = FG = GD$
 ب) استنتج أنّ النقطة O منتصف $[FG]$.
 ج) $CG = 2 GM$



69. ABC مثلث كيقي ، (D) مستقيم يقطع N ، M ، L في النقطة (BC) ، (AC) ، (AB) على الترتيب.



$$\frac{LA}{LB} \times \frac{NB}{NC} \times \frac{MC}{MA} = 1$$

أ) ارسم الموازي لـ (D) الذي يشمل النقطة (AB) ، C ، W تقاطعه مع (AB) .

$$\frac{MC}{MA} = \frac{LE}{LA} \quad \text{و} \quad \frac{NB}{NC} = \frac{LB}{LE}$$

$$\frac{LA}{LB} \times \frac{NB}{NC} \times \frac{MC}{MA} = 1$$

70. وحدة الطول هي السنتيمتر، لإنشاء قطعة

مستقيم طولها $\frac{5}{3}$ ارسم نصف مساقطين (AX)

، (AY) ، W على (AX) نقطتين C ، B بحيث $AC=3$ و $AB=5$ ، W نقطة I على (AY) بحيث $AI=I$. ارسم الموازي للمستقيم (CI) الذي يشمل B فيقطع (AY) في النقطة E .

أ) AE قطعة المستقيم طولها $\frac{5}{3}$ ؟


71. أنشئ العدد $\frac{6}{7}$

72. ABC مثلث ، D نقطة من $[BC]$ حيث $BC=3DC$. BC الموازي لـ (AB) الذي يشمل D يقطع (AC) في النقطة E . النقطتان H و F هما المسقطان العموديان للنقطتين A و E على (BC) على الترتيب.

- أ) JG العلاقة بين الطولين AH و EF .
 ب) G عن مساحة المثلث ABC بدلاً مساحة المثلث CDE .

64. وحدة الطول هي السنتيمتر ، والشكل المقابل مرسوم باليد الحرّة . إذا علمت أنّ $AE=5,6cm$ ، فهل $(DE) \parallel (AC)$ ؟

65. في الشكل أدناه A ، C ، B ، D أربع نقاط من مستقيم (A) ، C' ، B' ، A' و مساقطها العمودية على (A') على الترتيب حيث




66. ABC مثلث ، النقطة D منتصف $[BC]$ والنقطة E منتصف $[AD]$ ، F نقطة من

$$AF = \frac{1}{3} AC \quad \text{حيث} \quad [AB]$$

أ) W النقطة B ، E ، F في استقامية.


ب) W أنّ $BF = 4 \times EF$ ؟

67. لقياس عمق بئر فوهتها دائرة قطرها $2,4m$ يقف على حافتها مراقب ارتفاع عنينه عن المستوى الواقف عليه $1,6m$ ويبعد عنها وفق خط مستقيم يشمل مركز الدائرة التي تمثل فوهه البئر ، وعندما يتوارى عنه قعرها يجد أنه ابعد عن حافة البئر مسافة $1,2m$ ما هو عمق هذه البئر ؟



68. $ABCD$ متوازي أضلاع مركزه O . N ، M منتصفان $[BC]$ ، $[AD]$ على $[BC]$ ، $[AN]$ ، $[CM]$ ، $[AD]$ ، $[AN]$ تقطعان الترتيب . F ، G على $[BD]$ في النقطتين F ، G على الترتيب .

77. مستقيم سيمسون
- مثلث ABC نقطة M من الدائرة المحيطة به، النقاط T, S, R هي المساقط العمودية للنقطة M على (AB) ، (AC) ، (BC) على الترتيب.
- نريد أن نبين أن النقطة T, S, R تنتهي إلى نفس المستقيم (يسمى مستقيم سيمسون)
- (أ) بين أن للزوايا \widehat{BCM} ، \widehat{RAM} نفس القيس.
- (ب) بين أن النقطة M, S, A, R تنتهي إلى دائرة واحدة، واستنتج تساوي الزوايا \widehat{RSM} ، \widehat{RAM} .
- (ج) بين أن النقطة C, T, S, M تنتهي إلى دائرة واحدة، واستنتج علاقة بين الزوايا \widehat{TCM} ، \widehat{MST} .
- (د) احسب قيس الزاوية RST ، وماذا تستنتج؟




78. نقطتان متمايزتان ، علم باستعمال المدور فقط دون استعمال المسطرة النقطة A' نظيرة النقطة A بالنسبة إلى النقطة B . ببرر طريقة إنشائك.

79. مثلث زواياه حادة ، H نقطة تلاقي ارتفاعاته $[AM]$ ، $[BN]$ ، $[CL]$.
- (أ) بين أن (AM) منصف للزاوية \widehat{LMN} .
- (إرشاد: حدد الرباعيات الدائرية في الشكل)
- (ب) ماذا تمثل النقطة H بالنسبة إلى المثلث LMN ؟

80. ارسم دائرة (C) مركزها O ، علم نقطة A خارجها. المماسان للدائرة (C) اللذان يشتملان النقطة A يمساها في النقطتين L ، M .
- (أ) ما نوع المثلث ALM ؟
- (ب) بين أن النقطة H نظيرة النقطة O بالنسبة إلى (LM) هي نقطة تلاقي أعمدة المثلث $.ALM$
- (ج) ماذا تمثل النقطة E منتصف $[AO]$ بالنسبة إلى المثلث $.ALM$

- ج) بين أن المثلثين EDF و ABH متشابهان ، واستنتاج العلاقة بين مساحتيهما

73. لدينا في الشكل أدناه ABC مثلث قائم في B حيث $AC=2,4cm$ و ABD مثلث قائم في D حيث $BD=4cm$ ، و $[AD]$ ، $[BC]$ متقاطعان في E .
- (أ) احسب EF مسافة النقطة E عن (AB) .
- (إرشاد: عبر عن $\frac{BF}{AB}$ و $\frac{AF}{AB}$ بدلالة وأكمل ...)
- (ب) المستقيم (EF) يقطع $[CD]$ في النقطة G . بين أن E منتصف $[FG]$.




الزوايا والدائرة

74. ارسم دائرة (C) مركزها O ، علم نقطة A خارجها.
- أنشئ المماس للدائرة (C) الذي يشمل النقطة A .


75. (C) و (C') دائرتان مركزاهما O و O' متقاطعتان في نقطتين A و B ، $[AC]$ ، $[AD]$ قطر في (C) ويقطع (C') في النقطة M ، و $[AD]$ قطراً في (C') ويقطع (C) في النقطة N .
- (أ) ارسم شكلاً مناسباً.
- (ب) بين أن النقط C, B, A, D في استقامية.
- (ج) بين أن المستقيمات (AB) ، (CN) ، (MD) متقاطعة في نقطة واحدة.

76. ارسم رباعياً $ABCD$ حيث $\widehat{BAD}=110^\circ$ و $\widehat{BCD}=70^\circ$
- (أ) بين أن رؤوسه تنتهي إلى دائرة واحدة يطلب تعين مركزها O .
- (ب) احسب أقياس زوايا المثلث BOD ؟

الشكل (1)



الشكل (2)




.85. $\triangle ABC$ مثلث ، أنشئ على ضلعه $[AB]$ و $[AC]$ مثلثين ABD و ACE على الترتيب، حيث كلّ منهما متقايس الأضلاع. بين أن المثلثين AEB و ACD متقايسان، واستنتج أن $BE=CD$.


في التمارين 86 ، 87 ، 88 مطلوب التحقق فيما إذا كان المثلثان ABC ، ADE متشابهين أم لا ، وفي حالة الإجابة بنعم عين نسبة التشابه إن أمكن.

.86. المثلث ABC فيه $\widehat{ACB}=70^\circ$ ، $\widehat{ABC}=35^\circ$.
المثلث ADE فيه $\widehat{ADE}=75^\circ$ ، $\widehat{ADE}=35^\circ$.

.87. وحدة الطول هي السنتيمتر.




.81. OY و OX نصفا مستقيمين متعمدان في النقطة O ، نفترض ABC كوسا ونحرّكه بحيث B تتحرك على $[OX]$ و C تتحرك على $[OY]$.



- (أ) ما هو المسار الذي تتحرك عليه النقطة M منتصف $[BC]$ ؟
(ب) ما هو المسار الذي تتحرك عليه النقطة A ؟
(إرشاد: بين الزاوية AOB ثابتة)


.82. زعم ياسين أن المعطيات المبينة في الشكل أدناه كافية لحساب مساحة الجزء الملون. هل هو حقّ ؟

(C) و (C') دائريتان لهما نفس المركز O ، نقطتان A ، B من (C) حيث (AB) مماس للدائرة $AB=10cm$ (C') و (C)




المثلثات المتقايسة والمثلثات المتشابهة

.83. انقل الشكل أدناه على ورقة مسطرة باحترام الأبعاد، ثم أنشئ النقطة C' بحيث يكون المثلثان $A'B'C'$ ، ABC متقايسين (يوجد موضعين للنقطة C عينهما).



.84. في كلّ من الشكلين (1) و (2) أدناه المثلثان $A'B'C'$ ، ABC متشابهان. انقل كلاً من الشكلين على ورقة مسطرة ، وأكمل المثلث $A'B'C'$ (أعط كلّ الحلول الممكنة).

.93. دائرتان مركزاهما O و O' ونصفا قطرهما r و r' على الترتيب ، ومتماستان خارجيا في النقطة A . (BB') مستقيم يشمل النقطة A ويقطع (C) و (C') في نقطتين B و B' على الترتيب. المستقيم (OB) يقطع (C) في النقطة E ، والمستقيم $(O'B')$ يقطع (C') في النقطة E' .




أ) بين أن المستقيمين (BB') و (EE') متعمدان في النقطة A

ب) بين أن المثلثين ABE ، $AB'E'$ متشابهان.


$$\text{ج) استنتج النسبة } \frac{AB}{AB'} = \frac{r}{r'}$$

.94. مثلث زواياه حادة ، M نقطة من $[AB]$ ، الدائرة التي قطرها $[BM]$ تقطع $[BC]$ في النقطة E ، والدائرة التي قطرها $[CM]$ تقطع $[BE]$ في النقطة F ، $[EF]$ و $[AM]$ متتقاطعان في G .
بين أن المثلثين AFG و EGM متشابهان، واستنتاج أن $GA \times GM = GF \times GE$

.95. مثلثان كلّ منها قائم ومتساوي الساقين كما هو مبين في الشكل، $[CE]$ و $[BD]$ متتقاطعان في النقطة F .
أ) بين أن المثلثين ACE و ABD متقابسان.
ب) بين أن النقطة F ، C ، B ، A تتنمي إلى دائرة واحدة ، وعمران مركزها.
ج) نفس السؤال السابق بالنسبة إلى النقطة A ،




.88. وحدة الطول هي السنتمتر.



.89. زاوية XAY ، (BH) عمودي على $[OX]$ ، و (CG) عمودي على $[OY]$

أ) بين أن $AB \times AG = AH \times AC$

ب) كيف تصبح العلاقة السابقة عندما تنطبق النقطة G على النقطة B ؟



.90. مثلث ABC مثلاع A' ، B' ، C' منتصفات أضلاعه $[AB]$ ، $[AC]$ ، $[BC]$ على الترتيب.

أ) بين أن المثلثين $A'B'C'$ ، ABC متشابهان، وعمران نسبة التشابه.

ب) احسب النسبة $\frac{\text{مساحة } (ABC)}{\text{مساحة } (A'B'C')}$

.91. مثلث ABC مثلاع معطى ، أنشئ مثلثا مشابها للمثلث ABC مساحته تساوي 9 مرات مساحة المثلث ABC .


.92. مثلث ABC مثلاع متقابسان الأضلاع طول كل ضلع من أضلاعه a ، D نقطة من $[AB]$ حيث $[AC]$ ، $[BC]$ ، F ، E ، $AB=3AD$ حيث $BE=CF=AD$

أ) ما نوع المثلث DEF ؟


ب) بين أن (DE) عمودي على (BC) .

ج) احسب مساحة كلّ من المثلثين ABC ، DEF بدلالة a ، ثم جد العلاقة بين مساحتيهما.

شيء في كل حالة
حاب الذي شاعه




أنشئ صورة المثلث ABC بالدوران الذي
مركزه النقطة O وزاويته 60° .



.102. أنشئ مثلث قائم في M ، B نقطة من وتره
النقطتان L و N نظيرتا النقطة M
بالتسبة إلى (AB) و (BC) على الترتيب. ماذا
تمثل النقطة B بالنسبة إلى $[LN]$.

.103. $ABCD$ متوازي أضلاع ، E ، F ، G ، H نقط من $[AB]$ ، $[BC]$ ، $[CD]$ ، $[AD]$ على الترتيب حيث $AH=CF$ و $AE=CG$.
أ) ما هو التحويل النقطي الذي يحول A إلى C و D إلى B ؟
ب) ما هي طبيعة الرباعي $EFGH$ ؟




.104. علم أربع نقط A ، B ، A' ، B'
كما في الشكل المقابل.
اشرح كيف يمكن إنشاء مركز
الدوران الذي يحول A إلى A' و B إلى B' وأنشئه.

.96. ABC مثلث ، M نقطة تقاطع منصف زاوية
الرأس A و $[BC]$ ، C' ، B' المسلطان
العموديان للنقطة M على $[AB]$ و $[AC]$ على
الترتيب.

- (أ) بين أن المثلثين ACM ، $AB'M$ مقابisan.
- (ب) بين أن النقط A ، B' ، M ، C' تنتهي إلى دائرة واحدة يطلب تعين عناصرها.
- (ج) ما نوع الرباعي $AB'MC'$ عندما يكون المثلث ABC قائما في A ؟


.97. في الشكل المرفق $ABCD$ ، $BEFC$ ، $EGHF$ ثلات مربعات متماثلة طول ضلع كل منها a .

- نريد إثبات أن $\widehat{GCF} + \widehat{GDC} = 45^\circ$
- (أ) احسب أطوال كل من المثلثين GBD ، GFC ، ثم بين أحدهما متشابهان.
 - (ب) عين الزوايا المقايسة في المثلثين GBD ، GCF ، واستنتج أن $\widehat{GCF} + \widehat{GDC} = 45^\circ$




التحويلات النقطية

.98. أنجز مثيلاً للشكل المقابل على ورقة
مسطرة، ثم أنشئ الشكل (F_1) نظير الشكل
 (F) بالنسبة إلى النقطة O والشكل (F_2)
نظير



الشكل (F) بالنسبة إلى
المستقيم (D) .
أي الثنائيتين (F_1) ،
 (F_2) أم (F) فيها الشكلان مقابisan
مباشرة ؟

.99. انقل الأشكال أدناه، وأنشئ في كل حالة
صورة المثلث ABC بالتنازل بالنسبة إلى
المستقيم (D) :




105. A ، B نقطتان ثابتتان ومتمايزتان، عُلم نقطة M ، ثم أنشئ M_1 نظيرتها بالنسبة إلى A ، ونطيرة M_1 بالنسبة إلى B .

نقول إن النقطة M' هي صورة النقطة M بمركب التناظر بالنسبة إلى A والتناظر بالنسبة إلى B .

أ) عبر عن M' بدلالة AB

ب) استنتج نوع التحويل الناتج عن مركب تناظرتين مركزيتين.

105. يمثل الشكل المقابل ثلاثة مثلثات ABC ، ALM ، ADE كل منها مقايس الأضلاع حيث النقط B ، D ، L في استقامية. بين أن النقط C ، E ، M في استقامية.




110. تركيب تناظرتين بالنسبة إلى مستقيمين متتقاطعين

(D) و (D') مستقيمان متتقاطعان في نقطة O ، عُلم نقطة M ، ثم أنشئ M_1 نظيرتها بالنسبة إلى (D)، و M' نظيرة M_1 بالنسبة إلى (D'). أ) بين أن $OM = OM'$ ، وأن الزاوية MOM' ثابتة.

ب) استنتاج نوع التحويل الناتج عن مركب تناظرتين بالنسبة إلى مستقيمين متتقاطعين.

111. الهدف من التمرين هو إنشاء مماس مشترك خارجيا لدائرتين.

لتكن (C) و (C') دائرتان مركزاهما O و O' ونصف قطريهما r و r' على الترتيب ، حيث $r' > r$ كما في الشكل.



أ) ارسم دائرة (δ) مركزها O' ونصف قطرها ($r' - r$) يشمل النقطة O .
ب) أنشئ مماسا للدائرة (δ) يشمل النقطة O سُمّي A النقطة المشتركة بين الدائرة (δ) وهذا المماس.

ج) نصف المستقيم ($O'A$) يقطع الدائرة (C') في النقطة B . أنشئ المستقيم (T) صورة (OA) بالانسحاب الذي شعاعه AB .
د) تحقق من أن المستقيم (T) مماس مشترك خارجيا للدائرتين (C) و (C').

112. ارسم دائرتين (C) و (C') كما في التمرين السابق، وأنشئ مماسا مشتركا داخليا لهما.


106. يمثل الشكل مربعا $ABCD$ ، ومتثنين CDF ، CFD كل منها مقايس الأضلاع.

لإثبات أن النقط A ، F ، E في استقامية باستعمال الدوران.

أ) عُلم النقطة G بحيث يكون المثلث ACG مقايس الأضلاع و G ، B من جهتين مختلفتين بالنسبة إلى (AC).

ب) بين أن النقط B ، D ، G في استقامية.

(بيّن أنه يوجد دوران يحوال النقط B ، D ، E ، F ، A ، ثم استنتاج.



107. خذ معطيات التمرين رقم 95 وبين

باستعمال الدوران أن المستقيمين (BD) و (CE) متعمدان.

108. $ABCD$ مربع ، N ، M نقطتان من ضلعيه $[AB]$ و $[BC]$ على الترتيب حيث $AM = BN$ ، H نقطة تقاطع $[DM]$ و $[AN]$.
(بيّن أنه يوجد دوران يحوال $[DM]$ إلى $[AN]$).

ب) استنتاج طبيعة المثلث AHD .

ج) ما هي مجموعة النقط H عندما M تمسح $[AB]$ ؟


د) ما هي مجموعة النقط S منتصف $[MN]$ عندما M تمسح $[AB]$ ؟

109. تركيب تناظرتين بالنسبة إلى نقطتين متمايزتين


- لِإثبات أن $BC^2 = AB^2 + AC^2$ يكفي التحقق من أن مساحة المربع $BCFG$ تساوي مجموع مساحتي المربعين $ACHK$ ، $ABDE$.
 ليكن (AL) عموديا على (GF) في النقطة L' ، L ' نقطة تقاطع $[AL]$ و $[BC]$.
 أ) بين أن للمثلثين BED ، BED نفس المساحة ، وكذلك بالنسبة للمثلثين BGL' ، ABG .
 ب) بين أن المثلثين BCD ، ABG متقاربان.
 ج) ماذا تستنتج بالنسبة إلى مساحة المربع $ABDE$ ومساحة المستطيل' BGL' ؟
 د) كرر نفس الاستدلال بالنسبة إلى مساحة المربع $ACHK$ ومساحة المستطيل' CFL' .
 ه) استنتج مبرهنة فيثاغورس.

117. الهدف من هذه المسألة هو برهان خاصية للمنصف الداخلي لزاوية في مثلث بعدة طرائق مثلث ABC كافي ، $[AM]$ منصف زاوية الرأس A يقطع $[BC]$ في النقطة M . بين أن

$$\frac{MB}{MC} = \frac{AB}{AC}$$



ط₁: باستعمال مبرهنة طالس
 ارسم المستقيم الموازي لـ (AB) الذي يشمل النقطة C فيقطع (AM) في النقطة A .
 أ) ما نوع المثلث ABC ؟
 ب) استنتج أن $\frac{MB}{MC} = \frac{AB}{AC}$




ط₂: باستعمال تشابه المثلثات
 ارسم المستقيم (D) العمودي على (AM) الذي يشمل A ، عُلم B' و C' العموديان للنقطتين C و B على (D) على الترتيب.


- أ) بين لماذا $\frac{MB}{MC} = \frac{AB'}{AC'}$
 ب) بين أن المثلثين ABB' و ACC' متشابهان.
 ج) استنتج أن $\frac{MB}{MC} = \frac{AB}{AC}$

113. A ، B نقطتان متباينتان ومن نفس الجهة بالنسبة إلى مستقيم (Δ) ، عُلم على (Δ) نقطة C بحيث يكون $AC + CB$ أصغر ما يمكن.

114. انقل الشكل أدناه ، وعلم نقطتين C ، (Δ) من (Δ) ، (Δ) على الترتيب، بحيث يكون $AC + CD + DB$ أصغر ما يمكن.




115. انقل الشكل أدناه ، وعلم نقطتين C ، (Δ) من المستقيمين المتوازيين (Δ) و (Δ') على (Δ) ، (Δ') على الترتيب، بحيث يكون $AC + CD + DB$ أصغر ما يمكن و (CD) يوازي (EF) .




مسائل

116. إثبات مبرهنة فيثاغورس باستعمال المساحات: تنسب هذه الطريقة لإقليدس.



$BCFG$ مثلث قائم في A ، $ABDE$ ، A ، $ACHK$ مربعات منشأة على أضلاعه $[AB]$ ، $[AC]$ ، $[BC]$ على الترتيب.

ط3: باستعمال المساحات



(أ) بين لماذا $MH = MK$

(ب) عبر عن مساحة المثلث ABM باعتبار

كقاعدة، ثم باعتبار $[BM]$ كقاعدة.

كرر العملية مع المثلث $.ACM$

ج) استنتج أن

$$\frac{MB}{MC} = \frac{AB}{AC}$$

118. قوة نقطة بالنسبة إلى دائرة.

(C) دائرة مركزها O ونصف قطرها r ، ونقطة لا تنتمي إلى (C) ، نرسم مستقيمين (Δ)

، (Δ') يشملان النقطة M ويقطعان الدائرة (C) في النقاط A ، C و B ، D على الترتيب.

(أ) بين أن المثلثين CMB ، AMD متشابهان، واستنتج أن $MA \times MB = MC \times MD$



(ب) في حالة M خارج (C) ، كيف تصبح

العلاقة السابقة عندما يكون (Δ) مماسا للدائرة (C) في النقطة A ؟

(ج) نعتبر الآن أن (Δ') يشمل النقطة O .

احسب $MA \times MB$ بدلالة MO و r في كل

من الحالتين.



(لاحظ أن الجداء $MA \times MB$ مستقل عن المستقيم الذي يشمل النقطة M القاطع للدائرة (C) . يسمى قوة النقطة M بالنسبة إلى الدائرة $((C))$

تطبيق : إنشاء العددين α ، β عُلم فرقهما

$$\beta \times \alpha = r^2 = r$$

تطبيق : إنشاء العددين α ، β عُلم فرقهما

$$\beta \times \alpha = r^2 = r$$

ارسم دائرة مركزها O وقطرها r ، وعلم عليها نقطة A ، وارسم الماس لها الذي يشمل A ، وعلم على هذا المماس نقطة M حيث $AM=r$. ارسم

$[MO]$ فيقطع الدائرة في نقطتين D ، C .

تحقق من أن $MD \times MC$ يحققان المطلوب.

الكفاءات المستهدفة

- التّعرف على تساوي شعاعين.
- التّعرف على مجموع شعاعي وإنشاوه.
- التّعرف على جداء شعاع بعد حقيقى.
- التعليم على مستقيم، وفي المستوى.
- التّعرف على استقامية ثلاثة نقط.
- التّعبير عن توازى شعاعين واستقامية ثلاثة نقط في معلم.
- التّعرف على معامل توجيه مستقيم.
- إنشاء مستقيم علِّمت معادلة له.
- إيجاد معادلة لمستقيم.
- حل جملة معادلتين خطيتين لمجهولين.
- حل مسائل تؤدي إلى استخدام جملة معادلتين خطيتين لمجهولين.



يعتبر مفهوم الأشعة حدث التّشاؤ مقارنة مع مفاهيم أخرى في الرياضيات، فظهوره يعود إلى القرن التاسع عشر حينما لاحظ إرمان فنتر قراسمان سنة 1832م أنه بسبب اتجاه كل من AB و BA فإنّهما متعاكسان، وهي الفكرة التي وصل بها إلى مفهوم (المجموع الهندسي) الذي سمح فيما بعد بتمديد الدّستور $AB + BC = AC$ إلى ثلاثة نقط كيفية.

وقد عمل كل من قراسمان وهملتون وموبيوس على إعطاء

فاسبار مونج (1746م-1818م)
 ظهرت الصياغة الحالية للهندسة
 التحليلية في أعماله

عمليات وقواعد الحساب الشعاعي وجاء فيما بعد الرياضي ويليام كليفورد (1845م-1879م) فهذب هذه القواعد وصاغها في الشكل الذي نعرفه اليوم.


أما بالنسبة إلى الهندسة التحليلية التي وقرت لنا إمكانية تعريف كائن هندسي بواسطة علاقة تربط بين الإحداثيات، نجد أن العمل بها سابق لظهور الأشعة، فقد استعملت من قبل أبولونيوس (260-200 ق.م.) عندما عبر عن معادلات كل من القطع المكافئ والناقص والزايد واستعملت كذلك من طرف عمر الخيام والثابت ابن فرة غير ان روني ديكارت (1596-1665م) اعتبر أب الهندسة التحليلية بما أضاف لها مع بيار دو فيرما (1601-1665م).

في سنة 1795م أعطى الرياضي والفيزيائي فاسبار مونج للهندسة التحليلية الصياغة الحديثة التي نستخدمها اليوم في بحث له تحت عنوان "أوراق التحليل مطبقة في الهندسة"

أنشطة

نشاط 1. تساوي شعاعين


أ) لاحظ الأشكال الأربعية الآتية ثم أكمل الجدول أدناه بوضع (✓) علامة الصحة و (✗) علامة الخطأ في المكان المناسب.



للشعاعين \overrightarrow{AB} ، \overrightarrow{CD}	الشكل (1)	الشكل (2)	الشكل (3)	الشكل (4)
نفس المنحى				
نفس الاتجاه				
نفس الطول				

ب) في أي شكل لدينا $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

نشاط 2. مجموع شعاعين




- أ) انقل الشكل المجاور على ورقة مسطرة، وعلم النقطتين C ، B ، حيث $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{u}$ و $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{v}$.
- ب) ماذا يمثل الشعاع الناتج \overrightarrow{AC} بالنسبة إلى الشعاعين \overrightarrow{u} ، \overrightarrow{v} ؟
- ج) علم النقطتين N ، M ، حيث $\overrightarrow{LN} = \overrightarrow{u}$ و $\overrightarrow{LM} = \overrightarrow{v}$ ، ثم أنشئ النقطة P بحيث يكون رباعي $LMPN$ متوازي أضلاع.
- د) قارن بين الشعاعين \overrightarrow{AC} و \overrightarrow{LP} .
- هـ) ماذا يمثل الشعاع الناتج \overrightarrow{LP} بالنسبة إلى الشعاعين \overrightarrow{u} ، \overrightarrow{v} ؟

نشاط 3. جداء شعاع بعده حقيقي

أ) علم نقطتين متمايزتين A ، B ، ثم أنشئ النقطة C بحيث $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB}$

ب) قارن بين الشعاعين \overrightarrow{AC} و \overrightarrow{AB} من حيث المنحى والاتجاه والطويلة.

ج) عبر عن الشعاع \overrightarrow{AC} بدالة الشعاع \overrightarrow{AB} (أي أكمل ما يأتي: $\overrightarrow{AC} = \dots \times \overrightarrow{AB}$)



2) في الشكل المقابل كل من النقاطين R ، S تقسمان $[LM]$ ، $[LN]$ بنسبة 1 إلى 3 على الترتيب.

أ) قارن بين الشعاعين \overrightarrow{MN} و \overrightarrow{SR} من حيث المنحى والاتجاه والطويلة.

ب) عبر عن الشعاع \overrightarrow{SR} بدالة الشعاع \overrightarrow{MN} (أي أكمل ما يأتي: $\overrightarrow{SR} = \dots \times \overrightarrow{MN}$)

نشاط 4. الارتباط الخطى لشعاعين - التوازى - الاستقامية


أ) ارسم متوازى أضلاع $ABCD$ مركزه النقطة O ، وعلم النقاطين E ، F من $[BC]$ حيث $CE = EF = FB$.

$$\text{ب) أنشئ النقطة } G \text{ حيث } \vec{CG} = \frac{1}{2} \vec{CA} + \vec{CE}$$

ج) عَبَرْ عن الشَّعاع \overrightarrow{AG} بدلالة الشَّعاع \overrightarrow{AF} ، مَاذَا يُمْكِنُكَ أَنْ تَقُولَ عَنِ النَّقْطَ A ، F ، G ، A ؟

نشاط 5. المعلم على مستقيم، وفي المستوى

لتكن A ، B ، C ثلث نقط في معلم $(O; I, J)$ كما في الشكل المقابل.



أ) أَنْجِزْ عَلَى وَرْقَةِ مَسْطَرَةِ مِثِيلًا لِهَذَا الشَّكْل.

ب) اكتب إحداثي كلّ من النَّقْطَ C ، B ، A ، I .

ج) عَلَمْ مَنْتَصِفَ $[AB]$ وَعَيْنِ إِحْدَاثِيَّاهَا بِطَرِيقَتَيْنِ.

د) اكتب مركبتي كلّ من الشَّعاعين \overrightarrow{OA} ، \overrightarrow{BC} .

ه) عَلَمْ النَّقْطَ D الَّتِي إِحْدَاثِيَّاهَا $(4; -4)$ ، وَعَيْنِ

مَرْكَبَتِي كلّ من الشَّعاعين \overrightarrow{AB} ، \overrightarrow{DC} ، ثُمَّ

اسْتَنْتَجْ نَوْعَ الرِّبَاعِي $ABCD$.

و) نَصْعَ $i = \vec{OI}$ و $j = \vec{OJ}$

• عَلَمْ النَّقْطَ M الَّتِي مَعْرَفَتْ بِالْعَلَاقَةِ: $\vec{OM} = 2\vec{i} - 3\vec{j}$

• عَبَرْ عن الأشعة \overrightarrow{OA} ، \overrightarrow{OC} ، \overrightarrow{OB} بدلالة الشَّعاعين i ، j

نشاط 6. معادلة مستقيم

المستوى مزوّد بمعلم $(O; I, J)$

$$(1) \text{ نَعْتَرِ مَجْمُوعَةَ النَّقْطَ } M(x; y) \text{ بِحَثٍ } y = \frac{1}{3}x + 2$$

أ) أَكْمِلِ الجُدُولَ الَّتِي بَنَقْطَ مِنْ هَذِهِ الْمَجْمُوعَةِ.

ب) عَلَمْ النَّقْطَ A ، C ، B ، D ، وَمَاذَا تَلَاحَظَ ؟

ج) باسْتِعْمَالِ الشَّعاعِينِ \overrightarrow{AC} و \overrightarrow{AB} بَيْنَ أَنَّ النَّقْطَ A ، B ، C فِي اسْتَقَامَةِ.

د) هل مركبتي النَّقْطَ $E(3; 2)$ تَحْقِقُ الْمَعَادِلَةَ $y = \frac{1}{3}x + 2$ ؟ عَلَمْ النَّقْطَ E ، وَهُلْ هِيْ فِي

اسْتَقَامَةِ مَعَ النَّقْطَ A ، C ، B ، D ؟

(2) عَلَمْ النَّقْطَينِ $(I; -2, 3)$ ، $(A; 2, -2)$ ، وَارْسَمِ الْمَسْتَقِيمَ (AB) ، وَلَتَكَنْ $M(x; y)$ نَقْطَةً مِنْ (AB)

أ) عَبَرْ بَدَلَةَ x و y عَنِ الشَّعاع \overrightarrow{AM}

ب) اسْتَنْتَجْ عَلَاقَةَ بَيْنِ x و y تَرْجِمِ اسْتَقَامَةَ النَّقْطَ A ، B ، M .

نشاط 7. جملة معادلتين خطيتين لمجهولين

$$\begin{array}{l} (E_1) \dots \quad x + y = 5 \\ (E_2) \dots \quad -x + 2y = 4 \end{array} \left. \right\} \text{نَعْتَرِ جَمْلَةَ الْمَعَادِلَتَيْنِ}$$

أ) مَنْ بَيْنِ الثَّنَائِيَّاتِ الْأَنْتِيَّةِ بَيْنَ الَّتِي تَحْقِقُ الْمَعَادِلَةَ (E_1) فَقْطُ ، وَالَّتِي تَحْقِقُ الْمَعَادِلَةَ (E_2) فَقْطُ ، وَالَّتِي

تَحْقِقُ الْجَمْلَةَ: $(2; 0)$ ، $(0; 2)$ ، $(2; 1)$ ، $(5; 0)$ ، $(0; 5)$ ، $(-2; -7)$ ، $(-4; 0)$ ، $(0; -4)$ ، $(2; 3)$ ، $(3; 2)$.


ب) اكْتُبْ كَلَّا مِنْ الْمَعَادِلَتَيْنِ (E_1) ، (E_2) عَلَى الشَّكْلِ $y = ax + b$ ، ثُمَّ ارْسَمْ فِي مَعْلَم $(i; j)$ الْمَسْتَقِيمَينِ (D_1) ، (D_2) ، وَأَوْجِدْ إِحْدَاثِيَّ نَقَاطِعَهُمَا.

الدرس

1. الأشعة والحساب الشعاعي

• مفهوم الشعاع


تعريف 1



نقطتان من المستوى ينقول أن الثانية ($B ; A$) تعين شعاعاً نرمز له بالرّمز \overrightarrow{AB} أو \vec{v}

- إذا كانت النّقطة A منطبقّة على النّقطة B فإنّ الشّعاع \overrightarrow{AB} يصبح معدوماً ونكتب $\vec{v} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$
- يسّمى طول قطعة المستقيم $[AB]$ طول الشّعاع \overrightarrow{AB} ، ونكتب: $\overrightarrow{AB} // = AB$
- إذا كان \overrightarrow{AB} شعاعاً غير معدوم فإنّ منحى الشّعاع \overrightarrow{AB} هو منحى المستقيم (AB)
- إذا كان لشعاعين \vec{v} ، \vec{v}' نفس المنحى، وبوضع $\vec{v} = \overrightarrow{AB}$ و $\vec{v}' = \overrightarrow{AC}$ فإنه:

 - يكون للشعاعين \vec{v} ، \vec{v}' نفس الاتجاه إذا كانت النّقطة C تنتهي إلى نصف المستقيم (AB) .
 - يكون للشعاعين \vec{v} ، \vec{v}' اتجاهان متعاكسان إذا كانت النّقطة A تنتهي إلى قطعة المستقيم ($[AB]$) .



\vec{v} ، \vec{v}' لهما اتجاهان متعاكسان

\vec{v} ، \vec{v}' لهما نفس الاتجاه


ملاحظة: ليس للشعاع المعدوم منحى.

• تساوي شعاعين


تعريف 2

نقول عن شعاعين أنهما متساويان إذا كان لهما نفس المنحى، نفس الاتجاه، ونفس الطولية.

$$\vec{v} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{EF}$$



مثال:




من أجل كل أربع نقط A ، B ، C ، D من المستوى لدينا: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ معناه $[AD] \parallel [BC]$ ولهم نفس المنتصف

نتيجة

• مجموع شعاعين

تعريف 3



مجموع شعاعين \vec{u} و \vec{v} هو الشّعاع الذي نرمز له بالرّمز $\vec{u} + \vec{v}$ والمعرف


كما يأتي:

بفرض A نقطة كافية، نعلم نقطة B بحيث $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ ثم نقطة C بحيث $\overrightarrow{BC} = \vec{v}$ حيث $\overrightarrow{AC} = \vec{u} + \vec{v}$ يكون

نتائج

- من أجل كل ثلاثة نقاط A, B, C من المستوى فإن: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$) تسمى هذه العلاقة علاقه شال(

- إذا مثلا شعاعين \vec{u} و \vec{v} من نفس المبدأ A ، (مثلا $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ و $\overrightarrow{AC} = \vec{v}$) فإن مجموعهما $\vec{u} + \vec{v}$ يساوي \overrightarrow{AD} حيث $ABDC$ متوازي أضلاع.



- إذا كان $ABDC$ متوازي أضلاع فإن: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$

• الشعاع المتعاكسان


من أجل كل نقطتين A, B من المستوى فإن: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \overrightarrow{0}$ تعريف 4



نقول عن الشعاعين \vec{u} و \vec{v} أنهم متعاكسان. نكتب: $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$

تعريف 5

لحساب فرق الشعاعين \vec{u} و \vec{v} بهذا الترتيب، نضيف إلى الشعاع \vec{u} معاكس الشعاع \vec{v}



نكتب: $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$
مثال: $\vec{u} - \vec{v} = \vec{AB} - \vec{CB} = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$
ليكن $\vec{u} = \vec{AB}$ و $\vec{v} = \vec{CB}$ لدينا:

• جداء شعاع بعده حقيقي

تعريف 6


شعاع غير معروف k عدد غير معروف. جداء الشعاع \vec{u} بالعدد k هو الشعاع الذي نرمز له بالرمز $k\vec{u}$ والمعرف كما يأتي:
• $k\vec{u}$ لهما نفس المنحى ونفس الاتجاه إذا كان $k > 0$.
• $k\vec{u}$ لهما نفس المنحى واتجاهان متعاكسان إذا كان $k < 0$.
• طولية الشعاع $k\vec{u}$ تساوي جداء طولية \vec{u} بالعدد $|k|$ أي $\|k\vec{u}\| = |k| \|\vec{u}\|$.

ملاحظة: عندما $k\vec{u} = \vec{0}$ أو $k = 0$ نصطلح على وضع $\vec{0}$ أمثلة:

$$\vec{v} = -3\vec{u}$$

$$\overrightarrow{EF} = -\overrightarrow{EG}$$

$$\overrightarrow{AC} = \frac{5}{2}\overrightarrow{AB}$$



خواص: نقبل الخواص الآتية

\vec{u}, \vec{v} شعاعان ، و k, k' عدوان.

$$k(k'\vec{u}) = (kk')\vec{u} \quad ③$$

$$1\vec{u} = \vec{u} \quad ④$$

$$k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v} \quad ①$$

$$(k+k')\vec{u} = k\vec{u} + k'\vec{u} \quad ②$$

$$[\vec{u} = 0 \text{ و } k = 0] \text{ يكفي } k\vec{u} = 0 \quad ⑤$$

أمثلة:

بتطبيق الخاصية ① ثم علاقة شال

بتطبيق الخاصية ②

بتطبيق الخاصية ③ ثم الخاصية ④

يكافئ $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{0}$ ، وبالتالي النقطتان M و A منطبقتان بتطبيق الخاصية ⑤

$$5\overrightarrow{AB} + 5\overrightarrow{BC} = 5(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = 5\overrightarrow{AC} \bullet$$

$$7\overrightarrow{u} - 5\overrightarrow{u} = (7-5)\overrightarrow{u} = 2\overrightarrow{u} \bullet$$

$$\frac{4}{7} \times (\frac{7}{4}\overrightarrow{u}) = (\frac{4}{7} \times \frac{7}{4})\overrightarrow{u} = 1\overrightarrow{u} = \overrightarrow{u} \bullet$$

• توازي شعاعين

تعريف 7

نقول عن شعاعين \overrightarrow{u} و \overrightarrow{v} أنهما مرتبطان خطيا إذا كان أحدهما يساوي جداء الآخر بعده حقيقي.

أي إذا وجد عدد حقيقي k حيث $\overrightarrow{v} = k\overrightarrow{u}$.


ملاحظة: الشعاع المعدوم مرتبط خطيا مع أي شعاع. بالفعل من أجل كل شعاع \overrightarrow{u} لدينا: $\overrightarrow{u} = 0 \times \overrightarrow{u}$

نتيجة مباشرة

يكون الشعاعان غير المعدومين مرتبطين خطيا إذا وفقط إذا كان لهما نفس المنحى.

• التوازي والاستقامة

مبرهنة 1



يكون المستقيمان \overrightarrow{AB} و \overrightarrow{CD} متوازيين إذا وفقط إذا كان الشعاعان \overrightarrow{AB} و \overrightarrow{CD} مرتبطين خطيا.

ملاحظة: هذه المبرهنة هي نتيجة مباشرة للتعريف والنتيجة السابقة.

مبرهنة 2




تكون النقط A ، B ، C في استقامة إذا وفقط إذا كان الشعاعان \overrightarrow{AB} و \overrightarrow{AC} مرتبطين خطيا.

2. المعلم للمستوى

O ، I ، J ثلات نقط متمايزة من المستوى وليس في استقامة. نقول إن النقط J ، I ، O بهذا الترتيب تعين معلمam للمستوى مبدؤه النقطة O .
نضع $\overrightarrow{OI} = \overrightarrow{OJ} = i$. إن الشعاعين \overrightarrow{i} و \overrightarrow{j} غير مرتبطين خطيا نسميهما أشعة الأساس ، ونرمز للمعلم بالرمز $(j; i; O)$ ونسمي (OI) محور الفوائل ، و (OJ) محور التراتيب.


ملاحظة: توجد ثلاثة أنواع من المعلم للمستوى

معلم متعامد ومتجانس




$(OI) \perp (OJ)$ و $OI = OJ = 1u$ وحدة طول

معلم متعامد



$(OI) \perp (OJ)$

معلم كيافي



• إحداثيا نقطة - مركبنا شعاع

مبرهنة 3

ليكن $(O; \vec{i}, \vec{j})$ معلم للمستوي .

(1) من أجل كل نقطة M من المستوي ، توجد ثنائية وحيدة من الأعداد الحقيقية $(x; y)$


$$\overrightarrow{OM} = \vec{x}\vec{i} + \vec{y}\vec{j}$$

(2) من أجل كل شعاع \vec{u} ، توجد ثنائية وحيدة من الأعداد الحقيقية $(x; y)$


$$\vec{u} = \vec{x}\vec{i} + \vec{y}\vec{j}$$

برهان:

$(O; \vec{i}, \vec{j})$ معلم للمستوي، نضع $\vec{j} = \overrightarrow{OJ}$ و $\vec{i} = \overrightarrow{OI}$



2) ليكن \vec{u} شعاعا كيفيا من المستوي.
نرمز بالرمز M للنقطة المعرفة بالعلاقة $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$. حسب البرهان السابق توجد ثنائية من الأعداد الحقيقية $(x; y)$ بحيث $\vec{u} = \vec{x}\vec{i} + \vec{y}\vec{j}$ أي $\overrightarrow{OM} = \vec{x}\vec{i} + \vec{y}\vec{j}$
• في كل من (1) و (2) ثنائية من الأعداد الحقيقة $(x; y)$ وحيدة ، لأنه:
إذا كان $\vec{u}' = x'\vec{i} + y'\vec{j} = x\vec{i} + y\vec{j}$ فإن $x = x'$ و $y = y'$



مثال
 $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OL} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$
النقطة M إحداثياها $(3; 4)$
الشعاع \overrightarrow{OM} مركبته $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$
لدينا $\vec{u} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$ ومنه الشعاع \vec{u} مركباته $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$

نتائج:

$(O; \vec{i}, \vec{j})$ معلم للمستوي ، و \vec{u} شعاع مركبته $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ ، و \vec{v} شعاع مركبته $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ، و k عدد حقيقي.

1) تساوي شعاعين: $\vec{u} = \vec{v}$ يكافيء $[y = y' \text{ و } x = x']$

2) مجموع شعاعين: مركبنا المجموع $u + v$ هما $\begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}$

3) مركبنا الشعاع $k\vec{u}$ هما $\begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}$

برهان النتائج السابقة:

• $M = M'$ ، $\vec{OM} = \vec{OM}'$ حيث M' يكافيء M نضع $M = M'$. لدينا $\vec{v} = \vec{OM}'$ و $\vec{u} = \vec{OM}$.


وبالتالي $[y = y' \text{ و } x = x']$

$$\vec{u} + \vec{v} = (x\vec{i} + y\vec{j}) + (x'\vec{i} + y'\vec{j}) \quad (2) \text{ لدينا :}$$

$$= x\vec{i} + x'\vec{i} + y\vec{j} + y'\vec{j}$$

$$= (x + x')\vec{i} + (y + y')\vec{j}$$

$$k\vec{u} = k(x\vec{i} + y\vec{j}) = kx\vec{i} + ky\vec{j} \quad (3) \text{ لدينا :}$$



مثال :

لدينا في الشكل المقابل: $\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 3 + (-5) \\ 1 + 2 \end{pmatrix}$ ، ومنه $\vec{v} = \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \end{pmatrix}$ ، $\vec{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$


$$\cdot \vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ أي}$$

$$-2(\vec{u} + \vec{v}) = \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \end{pmatrix} \text{ ، ومنه } -2(\vec{u} + \vec{v}) = \begin{pmatrix} -2 \times (-2) \\ -2 \times 3 \end{pmatrix}$$

• حساب مركبتي شعاع وإحداثي منتصف قطعة مستقيم

مبرهنة 4

لتكن $(O; \vec{i}, \vec{j})$ في معلم $B(x_B; y_B)$ ، $A(x_A; y_A)$



$$\left(\begin{array}{l} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{array} \right) \text{ مركبنا الشعاع } AB \text{ هما}$$

$$\left(\begin{array}{l} \frac{x_A + x_B}{2} \\ \frac{y_A + y_B}{2} \end{array} \right) \text{ إحداثيا } M \text{ منتصف } [AB] \text{ هما}$$

برهان:

$$\vec{AB} = \vec{AO} + \vec{OB} = \vec{OB} - \vec{OA} \quad (1)$$

$$= (x_B\vec{i} + y_B\vec{j}) - (x_A\vec{i} + y_A\vec{j})$$

$$= (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j}$$

لدينا $\vec{OM} = \vec{AB} + \vec{AC}$ (أنظر طرائق وتمارين محلولة (1))

من تساوي شعاعين نجد: $y_M = y_A + y_B$ و $x_M = x_A + x_B$ ومنه المطلوب.

• شرط الارتباط الخطى لشعاعين

مبرهنة 5

ليكن $(O; \vec{i}, \vec{j})$ في معلم $\vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ ، $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

يكون الشعاعان \vec{u} و \vec{v} مرتبطين خطيا إذا و فقط إذا كان $x'y' - x'y = 0$

برهان:

- إذا كان $\vec{u} \neq \vec{v}$ مرتبطين خطيا ، فإن أحدهما يساوي جداء الآخر بعدد حقيقي: نفرض أن $\vec{u} = k \vec{v}$ (وبنفس الطريقة نبرهن في حالة $\vec{u} = k \vec{v}$)
 $x'y' - x'y = x(ky) - (kx)y = 0$ ، ومنه $x'y' = kx y$ و $y' = ky$ ، وبالتالي: إذا كان الشعاعان \vec{u} و \vec{v} مرتبطين خطيا فإن $x'y' - x'y = 0$

- إذا كان $\begin{pmatrix} x \\ y' \\ y \end{pmatrix} \vec{u} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ y \end{pmatrix} \vec{v}$ حيث $x'y' - x'y = 0$ لنبيان أنهما مرتبطان خطيا نميز الحالتين:

الحالة (1): الشعاعان \vec{u} ، \vec{v} معادمان ، وبالتالي فهما مرتبطان خطيا.

الحالة (2): أحد الشعاعين \vec{u} ، \vec{v} غير معادم ولتكن \vec{u} ، وبالتالي فإن إحدى مركباته x أو y غير معادمة، ولتكن $0 \neq y$ (وبنفس الطريقة نبرهن في حالة x).


$$\text{بما أن } 0 = \frac{y'}{y} x \text{ فإن } x'y' - x'y = 0$$

وبوضع $\begin{pmatrix} kx \\ ky \\ y \end{pmatrix} \vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ y \end{pmatrix}$ نجد $\frac{y'}{y} = k$ وبالتالي $x' = kx$ و $y' = ky$

ومنه $\vec{u} = k \vec{v}$ وبالتالي \vec{u} و \vec{v} مرتبطان خطيا.

وبالتالي: إذا كان $x'y' - x'y = 0$ فإن الشعاعين \vec{u} و \vec{v} مرتبطان خطيا.

مثال:



$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{u} = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

نستطيع التحقق من أن $6 \times (-1) - 2 \times (-3) = 0$ وكذلك

ملاحظة:

تسمى المساواة $x'y' - x'y = 0$ شرط الارتباط الخطى لشعاعين ويمكن أن تكتب

مركبنا الشعاع	x	y	$\times k$
مركبنا الشعاع	x'	y'	


وهي تترجم في جدول تناسبية كالتالي:

• المسافة بين نقطتين

برهان 6


ليكن $(O; \vec{i}, \vec{j})$ في معلم متعدد ومتجانس $B(x_B; y_B)$ ، $A(x_A; y_A)$

$$\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$



يمكن البرهان على أن $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ المثلث ABC .

مثال:



$$\vec{u} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$AB = \sqrt{(1 - 4)^2 + (3 - 1)^2} = \sqrt{13}$$


$$\|\vec{u}\| = \sqrt{(-2)^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$$

3. معادلة مستقيم

في كل ما سيأتي نعتبر المستوي مزود بعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$


• شعاع توجيهي مستقيم

كل نقطتين A و B متمايزتين تعينان مستقىما (AB) ، ومن أجل كل نقطة M من (AB) فإن \overrightarrow{AM} و \overrightarrow{AB} مرتبان خطيا. نقول أن \overrightarrow{AB} هو شعاع توجيهي للمستقيم (AB) .



تعريف 8

يسمى كل شعاع له منحى مستقيم، شعاع توجيهي لهذا المستقيم.



ملاحظة:

إذا كان \overrightarrow{AB} شعاع توجيهي للمستقيم (D) ، فكل شعاع غير معروف ومرتب خطيا بالشعاع \overrightarrow{AB} هو أيضا شعاع توجيهي للمستقيم (D)


مثال: كل من \overrightarrow{AB} ، \overrightarrow{u} ، \overrightarrow{i} هو شعاع توجيهي للمستقيم (D) .

تعريف 9

معامل توجيهي مستقيم هو المركبة الثانية لشعاع توجيهي لهذا المستقيم مركبته الأولى تساوي واحد.

في الشكل السابق معامل توجيهي (D) هو العدد a .

• معادلة مستقيم يوازي محور التراتيب



و B نقطتان لها نفس الفاصلة a أي $x_A = x_B = a$. كل نقطة M من المستقيم (AB) فاصلتها $x_M = a$. إن المستقيم (AB) يوازي محور التراتيب.

الشعاع \overrightarrow{u} هو شعاع توجيهي للمستقيم (AB)

مبرهنة 7


- (1) كل مستقيم يوازي محور التراتيب له معادلة من الشكل $x = a$ و a عدد حقيقي.
- (2) مجموعة النقط $M(x; y)$ بحيث $x = a$ و a عدد حقيقي هي مستقيم يوازي محور التراتيب.

• معادلة مستقيم لا يوازي محور التراتيب

إذا كان لل نقطتين A و B فاصلتان مختلفتان أي $x_A \neq x_B$ فإن المستقيم (AB) لا يوازي محور التراتيب

مبرهنة 8

كل مستقيم لا يوازي محور التراتيب له معادلة من الشكل $y = ax + b$



برهان:

ليكن (D) مستقيم لا يوازي محور التراتيب ويشمل النقطة $A(x_A; y_A)$ ، أن

$\cdot u \begin{pmatrix} 1 \\ a \end{pmatrix}$ له شعاع توجيهي من الشكل

لتكن M نقطة إحداثياتها $(x; y)$ ، أن $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \end{pmatrix}$

لدينا: M تتنمي إلى (D) يكافئ \overrightarrow{AM} و \overrightarrow{u} مرتبطان خطيا.

ومنه M تتنمي إلى (D) يكافئ $1 \times (y - y_A) = a \times (x - x_A)$

$$y = ax - ax_A + y_A : \text{أي}$$

$y = ax + b$ - تصبح المعادلة من الشكل $-ax_A + y_A = b$ وبوضع


مبرهنہ 9

عددان حقيقیان a, b ، مجموعۃ النقط $M(x; y)$ حيث $y = ax + b$ هي مستقیم (D) لا يوازي محور التراتیب.


المستقیم (D) هو التمثیل البیانی للدالة التالیفیة $x \mapsto ax + b$

الشعاع $\vec{u} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ a \end{pmatrix}$ هو شعاع توجیه للمستقیم (D) ، والعدد a هو معامل توجیهه.


مثال 1:




معادلة $y = 4$: (D_3)
شعاع توجیه لـ $\vec{u} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$
معامل توجیهه هو 0



معادلة $y = 2x + 5$: (D_2)
شعاع توجیه لـ $\vec{u} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$
معامل توجیهه هو 2



معادلة $x = -2$: (D_1)
شعاع توجیه لـ $\vec{u} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
لا يوجد معامل التوجیه



مثال 2: المعادلة $4x + 3y = 12$ تكتب على الشكل $4x + 3y = 12$ ، فھي معادلة مستقیم (D) معامل توجیهه هو $\frac{-4}{3}$
كل من $(0; 4)$ و $(0; 3)$ تحقق المعادلة: $4x + 3y = 12$ ، ومنه
ال نقطتين $(0; 4)$ ، $A(0; 3)$ تتنميان إلى (D) .

حساب معامل توجیه مستقیم

مبرهنہ 10

من أجل كل نقطتين $O; \vec{t}, j$ في معلم $(\vec{O}; \vec{t}, j)$ حيث $x_A \neq x_B$ ، معامل توجیه المستقیم (AB) يساوي $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.


برهان:

بما أن $x_A \neq x_B$ فالمستقیم (AB) لا يوازي محور التراتیب ، وبالتالي فله معادلة من الشكل $y = a$

وبما أن كل من نقطتين A ، B تتنمي إلى (AB) فإن $x_B + b$

$$\cdot a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \quad , \quad \text{وبالتالي} \quad y_B - y_A = a(x_B - x_A)$$

مثال: معامل توجيه المستقيم (AB) في الشكل المقابل يساوي



$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{5 - 3}{3 - (-2)} = \frac{2}{5}$$

$y = \frac{2}{5}x + b$ له معادلة من الشكل (AB)
(يمكن حساب b بسهولة)

• شرط متوازي مستقيمين

مبرهنة 11

يكون المستقيمان (D) و (D') متوازيان إذا وفقط إذا كان لهما نفس معامل التوجيه. أي: $a = a'$

برهان:

لدينا $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ a \end{pmatrix}$ هو شعاع توجيه للمستقيم (D) ، و $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ a' \end{pmatrix}$ هو شعاع توجيه للمستقيم (D') .
المستقيمان (D) و (D') متوازيان إذا وفقط إذا كان الشعاعان \vec{u} ، \vec{v} مرتبطين خطيا، أي $a' = a$.
وبالتالي $a = a'$.

4. جملة معادلتين خطيتين لمجهولين

نعتبر فيما يلي $(a; b) \neq (0; 0)$ و $(a'; b') \neq (0; 0)$. تعريف 10

نسمى جملة معادلتين خطيتين لمجهولين كل جملة $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ حيث a, a', b, b', c, c' أعداد معلومة.

ونعني بحل جملة معادلتين خطيتين لمجهولين إيجاد الثنائيات $(x; y)$ التي تحقق المعادلتين في آن واحد

• التفسير البياني لحل جملة معادلتين خطيتين لمجهولين

لتكن جملة المعادلتين $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$.
المعادلة $ax + by = c$

• تكتب على الشكل $x = \frac{c}{a}$ من أجل $b \neq 0$

• تكتب على الشكل $y = \frac{-a}{b}x + \frac{c}{b}$ من أجل $a \neq 0$

فهي في الحالتين معادلة مستقيم (D) ، وكذلك بالنسبة إلى كل من المستقيمين (D) و (D') .

($x; y$) حل لجملة المعادلتين معناه أن النقطة $M(x; y)$ تتبع إلى كل من المستقيمين (D) و (D') .
وهذان المستقيمان هما إما منتقاطان ، وإما متوازيان تماما ، وإما منطبقان.
وبالتالي:

جملة المعادلتين $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ إما لها حل وحيداً، وإما لا حل لها، وإما لانهاية لها من الحلول، وذلك حسب الوضع النسبي للمستقيمين (D) و (D') .



• عدد حلول جملة معادلتين خطيتين لمجهولين

مبرهنة 12

لتكن جملة المعادلتين (S) : $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$

- إذا كان $a'b' - ba' \neq 0$ فإنّ الجملة (S) تقبل حل وحيداً.
- إذا كان $a'b' - ba' = 0$ فالجملة (S) إما لا حل لها، وإما لانهاية لها من الحلول.

تفسير المبرهنة

$ab' - ba' = 0$	$ab' - ba' \neq 0$
	
$(D') = (D)$ والجملة لها لانهاية من الحلول	لا توجد نقطة مشتركة بين (D') ، (D) والجملة ليس لها حل

طرائق وتمارين محلولة

١. الحساب الشعاعي

• استعمال خواص مجموع شعاعين (علاقة شال)

• أربع نقاط A, B, C, D من المستوى.

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DB}$$

و كذلك

$$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$$

حل

تعاليف

$\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BC}$ وباستعمال علاقه شال لدينا:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BC}$$

بالجمع طرف إلى طرف نجد

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BC}$$

و بما أن $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{0}$

ذلک:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$$


$$(\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{DD} = \overrightarrow{0} \text{ لأن } \overrightarrow{DC} \text{ و } \overrightarrow{CD} \text{ مطلوب.})$$

$$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$$

- في التعبير عن شعاع باستعمال علاقه شال نستعمل نقطا مناسبة بالنظر إلى ما هو مطلوب.

طريقة

- في مجموع شعاعين يمكن تطبيق نفس الخواص المعروفة في المجموع الجبري، مثل: التبديل والتجميل.



• كيف نبين مساواة شعاعية؟

• ثلاثة نقاط C, B, A منتصف $[BC]$ ، I .

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} \quad (1)$$

$$2\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} \quad (2)$$

حل

تعاليف

(1) لدينا حسب علاقه شال $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB}$ ومنه $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = (-\overrightarrow{OA}) + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$

(2) لدينا حسب علاقه شال:

$$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BI}$$

$$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CI}$$

و بالجمع طرف إلى طرف نجد:

$$2\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + (\overrightarrow{BI} + \overrightarrow{CI})$$

و بما أن $\overrightarrow{BI} + \overrightarrow{CI} = \overrightarrow{0}$ لأن I منتصف $[BC]$ فإن

$$2\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$$

- الشعاعان AO و AI متعاكسان

$$\overrightarrow{AO} = -\overrightarrow{OA}$$

• نعبر عن الشعاع

باستعمال كل من

الشعاعين AB ، AC .

طريقة


- لإثبات صحة مساواة شعاعية يمكن تفكيك أحد الطرفين والوصول إلى الطرف الآخر

باستعمال علاقه شال وعبارات شعاعية تترجم وضعيات معطاة مثل:

$$\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{BI} \text{ أو } \overrightarrow{BI} = \overrightarrow{IC} \text{ أو } \overrightarrow{BI} + \overrightarrow{CI} = \overrightarrow{0} \dots \text{ للتعبير عن } I \text{ منتصف } [BC]$$

أو $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{MN}$ للتعبير عن M, N منتصفين $[AB], [AC]$ في المثلث ABC .

• جداء شعاع بعده حقيقي (استعمال الأشعة للبرهان على أنّ نقطا في استقامية)



$ABCD$ متوازي أضلاع ، و M منتصف $[AD]$ ، و N نقطة

$$\text{حيث } \overrightarrow{AN} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AC}$$

بَيْنَ أَنَّ النَّقْطَةَ B ، N ، M في استقامية.

حل

لدينا حسب علاقة شال:

$$(\overrightarrow{AN} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AC}) \quad (\text{لأن } \overrightarrow{BN} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{BA} + \frac{1}{3} \overrightarrow{AC})$$

$$= \overrightarrow{BA} + \frac{1}{3} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC})$$

$$= \overrightarrow{BA} - \frac{1}{3} \overrightarrow{BA} + \frac{1}{3} \overrightarrow{BC}$$

$$(1) \dots \overrightarrow{BN} = \frac{2}{3} \overrightarrow{BA} + \frac{1}{3} \overrightarrow{BC} \quad \text{ومنه}$$

$$\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BA} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AD} \quad \text{وكذلك:}$$

$$(\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}) \quad \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BA} + \frac{1}{2} \overrightarrow{BC} \quad \text{ومنه}$$

$$\frac{3}{2} \overrightarrow{BN} = \overrightarrow{BA} + \frac{1}{2} \overrightarrow{BC}$$

وبالتالي فإن $\frac{3}{2} \overrightarrow{BN} = \overrightarrow{BM}$ والشعاعان \overrightarrow{BN} ، \overrightarrow{BM} مرتبان خطيا.

ونستنتج أن النقط B ، N ، M في استقامية.


تعاليق

- سنبين أن الشعاعين \overrightarrow{BM} و \overrightarrow{BN} مرتبان خطيا.

- نعتبر عن كل من الشعاعين \overrightarrow{BN} ، \overrightarrow{BM} بدلالة الشعاعين \overrightarrow{BA} ، \overrightarrow{BC}

طريقة

- لإثبات أن نقاط M, N, B في استقامية يمكن إثبات أن شعاعين مثل \overrightarrow{BN} و \overrightarrow{BM} مرتبان خطيا.



• الارتباط الخطى لشعاعين (استعمال الأشعة لبرهان التوازى)

$ABCD$ متوازي أضلاع ، النقطة N منتصف $[CD]$ ، والنقطة

$$DM = 2AD \quad M$$

معرفة بالعلاقة M هي $DN = 2AD$.

بَيْنَ أَنَّ المستقيمين (BN) و (CM) متوازيان.

حل

لدينا:

$$\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AN}$$

$$= \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DN}$$

$$= \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DN} + \overrightarrow{AD}$$

$$\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{CN} + \overrightarrow{AD}$$

$$2\overrightarrow{BN} = 2\overrightarrow{CN} + 2\overrightarrow{AD}$$

$$= \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DM} = \overrightarrow{CM}$$

تعاليق

- نبحث عن علاقة من $\overrightarrow{CM} = k \overrightarrow{BN}$ الشكل

$$N \overrightarrow{CD} = 2 \overrightarrow{CN} \quad \text{لأن } [CD] \text{ منتصف}$$

-

طريقة

- لإثبات أن مستقيمين (BN) و (CM) متوازيان يمكن إثبات أن الشعاعين \overrightarrow{BN} و \overrightarrow{CM} مرتبان خطيا.

2. المعلم على مستقيم، وفي المستوى


• حساب إحداثي نقطة أو مركبتي شعاع

$$\vec{v} \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, A(-2; 1), O(0; 0)$$

معلم للمستوى ، $A(-2; 1)$ معلم للمستوى ، $O(0; 0)$

أ) احسب إحداثي النقطة A' صورة النقطة A بالانسحاب الذي شعاعه \vec{u} .

ب) احسب مركبتي الشعاع \vec{OM} حيث $\vec{OM} = 2\vec{u} - 3\vec{v}$.



حل

• مركبتا الشعاع AB هما $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$

• تساوي شعاعين معناه تساوي مركباتهما.

أ) نفرض $(x; y)$ أي $A'(x; y)$ ، فيكون $A(x; y)$ ، $A(x; y)$

$y = 4$ و منه $x = -1$ و $\begin{cases} x + 2 = 1 \\ y - 1 = 3 \end{cases}$ من $\vec{AA}' = \vec{u}$

و بالتالي $A'(-1; 4)$

ب) لدينا: $v = -4\vec{i}$ و $u = \vec{i} + 3\vec{j}$

$\vec{OM} = 2\vec{u} - 3\vec{v}$ و منه

$$\vec{OM} = 2(\vec{i} + 3\vec{j}) - 3(-4\vec{i}) = 2\vec{i} + 6\vec{j} + 12\vec{i}$$

$$\vec{OM} = 14\vec{i} + 6\vec{j}$$

و منه $\vec{OM} = \begin{pmatrix} 14 \\ 6 \end{pmatrix}$ وبالتالي

طريقة

- للبحث عن إحداثي نقطة أو مركبتي شعاع يمكن ترجمة مساواة شعاعية إلى جملة معادلتين
- لتبسيط الحسابات على مركبات الأشعة يمكن إجراؤها عموديا كما يأتي على سبيل المثال:

$$2u - 3v = \begin{pmatrix} 14 \\ 6 \end{pmatrix} \quad 2u - 3v = \begin{pmatrix} 2+12 \\ 6+0 \end{pmatrix} \quad 2u = \begin{pmatrix} 12 \\ 0 \end{pmatrix}$$


3. معادلة مستقيم

• البحث عن معادلة مستقيم معرف بنقطتين

$$A(-3; 1), B(4; 2)$$

معلم للمستوى . $A(-3; 1)$ ، $B(4; 2)$ نقطتان حيث

جد معادلة المستقيم (AB) .



حل

• المستقيم (AB) لا يوازي محور الترتيب

• يمكن تشكيل جملة معادلتين للبحث عن a ، b .

• يمكن الحصول على

بما أنَّ النقطتين A ، B ليس لهما نفس الفاصلة فإنَّ المستقيم (AB) معادلة من الشكل $y = ax + b$.

إحداثيا النقطة A تتحقق المعادلة $y = ax + b$ و منه

$$b = 3a + 1 = a(-3) + b$$

إحداثيا النقطة B تتحقق المعادلة $y = ax + b$ و منه

$$b = -4a + 2 = a(4) + b$$

وبالتالي : $a = \frac{1}{7}$ و $b = 1$ أي $a = 1$ و منه $3a + 1 = -4a + 2$

معامل توجيه المستقيم
من العلاقة: (AB)

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$b = 3 \times \frac{1}{7} + 1 = \frac{10}{7}$$

ومنه

$$y = \frac{1}{7}x + \frac{10}{7}$$

والنتيجة: المعادلة التي نبحث عنها هي:


- يمكن إيجاد معادلة للمستقيم (AB) باستعمال الارتباط الخطى للشعاعين \overrightarrow{AB} و \overrightarrow{AM} حيث النقطة $M(x, y)$ تنتوى إلى (AB) . احسب مركبى \overrightarrow{AB} ومركبى \overrightarrow{AM} ، ثم طبق شرط الارتباط الخطى للشعاعين \overrightarrow{AB} و \overrightarrow{AM}

طريقة

- لإيجاد معادلة مستقيم معرف ب نقطتين يمكن إتباع إحدى الطرق الآتية:

- البحث عن a, b في المعادلة $y = ax + b$ إذا كان هذا المستقيم لا يوازي محور التربيع .
- استعمال معامل توجيه المستقيم إذا كان هذا المستقيم لا يوازي محور التربيع .
- استعمال شرط الارتباط الخطى لشعاعين .

• البحث عن معادلة مستقيم يشمل نقطة معلومة ويواري مستقيما معلوما



حل

بما أن المستقيمين (D) و (D') متوازيان فإن لهما نفس معامل التوجيه -2
للمستقيم (D') معادلة من الشكل $y = -2x + b$
إحداثيا النقطة A تحقق المعادلة A $y = -2x + b$ ومنه
 $b = 7$ ومنه $3 = -2(2) + b$
والنتيجة: معادلة (D') هي: $y = -2x + 7$

تعاليق

- الشعاع $u \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ هو شعاع توجيه لكل من (D) ، (D')
- النقطة A تنتوى إلى (D')

طريقة

- لإيجاد معادلة مستقيم يشمل نقطة معلومة ويواري مستقيما معلوما يمكن استغلال ما يأتي:
- للمستقيمين نفس المعامل التوجيه a ، وتوظيفه في معادلة من الشكل $y = ax + b$.
 - للمستقيمين نفس شعاع التوجيه ، واستعمال شرط الارتباط الخطى لشعاعين.

4. جملة معادلتين خطيتين لمجهولين

• تعين عدد حلول جملة معادلتين خطيتين لمجهولين والبحث عنها

نعتبر جملة معادلتين الآتية: عين عدد حلول كل جملة ، وجدها.

$$\begin{cases} -x + 2y = 6 \\ 3x - 6y = -18 \end{cases} \quad (S_3)$$

$$\begin{cases} -x + 2y = 6 \\ 3x - 6y = 12 \end{cases} \quad (S_2)$$

$$\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x - 3y = -3 \end{cases} \quad (S_1)$$

حل

(1) بالنسبة إلى الجملة (S_1)
نكتب المعادلة المختزلة لكل من (D) و (D') :
 $y = -2x + 8$ $2x + y = 8$ تكافئ
 $y = \frac{1}{3}x + 1$ $x - 3y = -3$ و
بما أن $\frac{1}{3} \neq -2$ فإن المستقيمين (D) و (D') متقاطعان ،
ومنه الجملة (S_1) تقبل حلًا وحيدا
إذا $(x; y)$ حل للجملة (S_1) فإن $x = 3$ $y = 3$ (من المعادلة (2))
وبالتعويض في المعادلة (1) نجد $8 = 2(3) + y$ وهي
تكافئ $y = 2$.
وبالتعويض في المعادلة (2) نجد $3 = \frac{1}{3}(3) + 1$.
وبما أن الجملة (S_1) تقبل حلًا وحيدا فهو $(3; 2)$
(2) بالنسبة إلى الجملة (S_2)
نحسب المقدار $ab' - ba' = (-1)(-6) - 2 \times 3 = 0$ فنجد $a b' - b a'$.
وبالتالي فالجملة إما لها لانهاية من الحلول وإما ليس لها حل.
الجملة (S_2) تكافئ $\begin{cases} -x + 2y = 6 \\ -x + 2y = -4 \end{cases}$ بقسمة طرفي
المعادلة (2) على -3
لا توجد قيم $(x; y)$ تجعل $-x + 2y = 6$ و $-x + 2y = -4$ في آن واحد
ومنه الجملة (S_2) لا حل لها.
(3) بالنسبة إلى الجملة (S_3)
نحسب المقدار $ab' - ba' = (-1)(-6) - 2 \times 3 = 0$ فنجد $a b' - b a'$.
وبالتالي فالجملة إما لها لانهاية من الحلول وإما لا حل لها.
الجملة (S_3) تكافئ $\begin{cases} -x + 2y = 6 \\ -x + 2y = 6 \end{cases}$ بقسمة طرفي
المعادلة (2) على -3
كل نقطة من المستقيم (D) الذي معادلته $y = \frac{1}{2}x + 3$ إحداثياً لها تحقق الجملة (S_3) .
نستنتج أن الجملة (S_3) لها لانهاية من الحلول من الشكل:
 $(x, \frac{1}{2}x + 3)$ و x عدد حقيقي.


تعاليق

- في كل جملة تعتبر المعادلة الأولى هي معادلة مستقيم (D) والثانية مستقيم (D')
- يمكن التتحقق من عدد حلول الجملة (S_1) بحساب المقدار $a b' - b a'$
 $ab' - ba' = 2(-3) - 1 \times 1 = -7 \neq 0$
- يمكن حل الجملة (S_1) بطريقة تعتمد أساساً على الجمع.
- يمكن حل الجملة (S_1) بيانياً كما يأتي:
- يمكن التتحقق بيانياً من أن الجملة (S_2) لا حل لها.
- يمكن استعمال الحاسبة البيانية لحل جملة معادلتين خطيتين.

طريقة

- لمعرفة عدد حلول جملة معادلتين $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ يمكن حساب المقدار $ab' - ba'$
- فإذا كان غير معادوم ، فالجملة تقبل حلًا وحيدًا ببحث عنه بطريقة التعويض أو الجمع.
- وإذا كان معادوما ، نحو $\begin{cases} Ax + By = C \\ Ax + By = C' \end{cases}$ ونقارن بين C و C' في حالة $C \neq C'$ الجملة ليس لها حل . في حالة $C = C'$ للجملة لانهاية من الحلول.

تعلم البرهنة



الهدف: تعلم طريقة للبرهنة باستعمال معلم؟

متلث متوازي الأضلاع ABC ، M ، N ، L منتصف $[AC]$ ، $[AB]$ على الترتيب ، و P منتصف $[MN]$.

P نقطة معرفة بالعلاقة

$$\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AP}$$

بين أنَّ النُّقطَ B ، L ، P في استقامية.

حل

نعتبر المعلم $\overrightarrow{(B;BC;\overrightarrow{BA})}$

فيكون فيه $M(0; \frac{1}{2})$ ، $C(1;0)$ ، $A(0;1)$

حساب إحداثي النُّقطَة P .


لدينا $\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AP}$ ومنه

$$\begin{cases} 1 = 3x_p \\ -1 = 3(y_p - 1) \end{cases}$$

نجد أنَّ $x_p = \frac{1}{3}$ و $y_p = \frac{2}{3}$ ومنه

حساب إحداثي النُّقطَة L .

لدينا $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{MN} = 2(2\overrightarrow{ML})$



ومنه وبالتألي

$$\begin{cases} 1 = 4x_L \\ 0 = 4(y_L - \frac{1}{2}) \end{cases}$$

نجد أنَّ $x_L = \frac{1}{4}$ و $y_L = \frac{1}{2}$ ومنه

: \overrightarrow{BP} ، \overrightarrow{BL}

$\overrightarrow{BP} \left(\frac{1}{3}; \frac{2}{3} \right)$ و $\overrightarrow{BL} \left(\frac{1}{4}; \frac{1}{2} \right)$


بما أنَّ $0 = \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$ فإنَّ الشعاعين \overrightarrow{BL} ، \overrightarrow{BP} مرتبان خطيا.

نستنتج أنَّ النُّقطَ B ، L ، P في استقامية.

خلاصة

- عند حل بعض المسائل الهندسية يمكن اللجوء إلى تعريف معلم تكون فيه إحداثيات نقط الشكل بسيطة ، أو حسابها بسيط، ثم العمل فيه باستغلال ما توفره الهندسة التحليلية من قواعد حسابية لإثبات المطلوب.

إعادة استثمار



متوازي أضلاع ، النُّقطَة M منتصف $[CD]$ ، والنُّقطَة N

معروفة بالعلاقة

$$\overrightarrow{AN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$$

بين باستعمال معلم مناسب أنَّ النُّقطَ M ، N ، B في استقامية.

استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال

معلومات عن برنامج إكسيل (EXCEL)

تتكون ورقة الحساب في برنامج Excel من جدول له 65536 سطراً مرقمة من 1 إلى 65536 و 256 عموداً مرقمة بأحرف على المنسوب A, B, C, \dots, IV . فهي تحتوي على 16777216 خلية تعرف كل منها برقم العمود متبعاً برقم السطر مثل: B3 كما في الشكل المقابل.

B3	B	C
1		
2		
3		
4		

الخلية B3

الهدف من هذا النشاط هو حل جملة معادلتين بيانيًا باستعمال برنامج Excel


نعتبر جملة المعادلتين $\begin{cases} -x + y = 2 \\ x + y = 4 \end{cases}$

- أكتب كلاً من المعادلتين على الشكل $y = ax + b$
- افتح ورقة جديدة في برنامج Excel ، ثم اكتب في الخلايا A1 ، A2 ، A3 كلّ من x و $y=x+2$ و $y=-x+4$ على الترتيب.
- احجز العدد -3 في الخلية B1 و العدد 2 في الخلية C1 . حدد الخلتين B1 ، C1 وضع الزالق على الزاوية السفلى على اليمين الخلية C1 فيتحول إلى رمز + ثم انقر على الزر الأيمن للفأرة على الزاوية السفلى على اليمين الخلية C1 فيتحول إلى رمز + ثم انقر على الزر الأيمن للفأرة

A	B	C	D	E	F
1	x	-3	-2		
2	$y=x+2$				

A	B	C
1	x	-3
2	$y=x+2$	=B1+2


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	x	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
2	$y=x+2$	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9



- اضغط على معالج البيانات لفتح النافذة أدناه، ثم اضغط داخلها بالترتيب على

(1) ثم (2) ثم (3)

- يمكن الضغط على (2') لفتح نوافذ أخرى وتحصيص نوعية عرض الشكل لتحصل في النتيجة على ما يأتي:



حل مسألة إدماجية

($O; \vec{i}, \vec{j}$) معلم متعامد ومتجانس للمستوي.

أ) عُلم النقط A, B, C حيث $A(-2, 2)$ ، $B(3, 5)$ ، $C(4, 0)$ ، $\overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix}$ ، $\overrightarrow{OB} = 3\vec{i} + 5\vec{j}$.

ب) عُين إحداثي النقطة D بحيث $ABCD$ متوازي أضلاع.

ج) النقطة M منتصف $[BC]$ ، والنقطة N تحقق $3\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{CA}$.

- يُبيَّن أنَّ النقط M, N, D هي في استقامية.

- ماذا تمثل النقطة N بالنسبة إلى المثلث BCD ؟

د) اكتب معادلة للمستقيم (A) الذي يشمل النقطة B ويباوزي المستقيم (AC)

هـ) تتحقق من أن $y = \frac{3}{5}x - \frac{12}{5}$ هي معادلة للمستقيم (CD) . احسب إحداثي D' نقطة تقاطع (A) و(CD)

وـ) لتكن $E(4, 2)$ احسب أطوال أضلاع المثلث ACE ، واستنتج نوعه.

حل

أ) النقط $B(3, 5)$ ، ولتعليم النقطة C نحسب إحداثياتها

$$C(4, 0) \quad \text{أي} \quad \begin{cases} x_c = 4 \\ y_c = 0 \end{cases} \quad \text{وبالتالي} \quad \begin{cases} x_c + 2 = 6 \\ y_c - 2 = -2 \end{cases} \quad \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} x_c + 2 \\ y_c - 2 \end{pmatrix} \quad \text{لدينا}$$

بـ) $AD = BC$ متوازي أضلاع معناه $ABCD$

$$\begin{cases} x_d + 2 = 1 \\ y_d - 2 = -5 \end{cases} \quad \text{فإن} \quad \overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \end{pmatrix} \quad \text{أي} \quad \overrightarrow{AD} \begin{pmatrix} 4 - 3 \\ 0 - 5 \end{pmatrix} \quad \text{و، وبما أن}$$

$$D(-1, -5) \quad \text{أي} \quad \begin{cases} x_d = -1 \\ y_d = -5 \end{cases} \quad \text{ومنه}$$

جـ) النقطة M منتصف $[BC]$ إحداثياتها

$$\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{ولدينا} \quad \overrightarrow{CN} \begin{pmatrix} x_n - 4 \\ y_n - 0 \end{pmatrix} \quad \text{ومنه}$$

$$\begin{cases} 3(x_n - 4) = -6 \\ 3y_n = 2 \end{cases} \quad \text{تكافئ} \quad 3\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{CA}$$


$$N\left(2; \frac{2}{3}\right) \quad \text{أي} \quad \begin{cases} x_n = 2 \\ y_n = \frac{2}{3} \end{cases} \quad \text{ومنه}$$

ندرس الارتباط الخطى للشعاعين \overrightarrow{DN} و \overrightarrow{DM}

$$3 \times \frac{11}{2} - \frac{9}{2} \times \frac{11}{3} = 0 \quad \text{ومنه} \quad \overrightarrow{DN} \begin{pmatrix} 3 \\ \frac{11}{3} \end{pmatrix} \quad \text{و} \quad \overrightarrow{DM} \begin{pmatrix} \frac{9}{2} \\ \frac{11}{2} \end{pmatrix} \quad \text{لدينا}$$

وبالتالى فإنَّ الشعاعين \overrightarrow{DM} و \overrightarrow{DN} مرتبطان خطيا ، ومنه النقط D, N, M هي في استقامية.

وضعية النقطة N بالنسبة إلى المثلث BCD



نلاحظ أن $\overrightarrow{DM} = \frac{3}{2}\overrightarrow{DN}$ ومنه N هي مركز تقل المثلث BCD

د) معادلة للمستقيم (A)

$$a = \frac{0 - 2}{4 - (-2)} = -\frac{1}{3} \quad \text{نفس الميل } a \text{ حيث}$$

$$y = -\frac{1}{3}x + b \quad \text{ومنه للمستقيم } (A) \text{ معادلة من الشكل}$$

$$b = 6 \quad 5 = -\frac{1}{3} \times 3 + b \quad \text{وبما أن } B \text{ تتبع إلى } (A) \text{ فإن } 5 \text{ ، ومنه } 6$$

$$y = -\frac{1}{3}x + 6 \quad \text{هي معادلة للمستقيم } (A)$$

هـ) التحقق من أن $y = \frac{3}{5}x - \frac{12}{5}$ هي معادلة للمستقيم (CD) :

$$-\frac{3}{5} = \frac{3}{5} \times (-1) - \frac{12}{5} \quad \text{و} \quad 0 = \frac{3}{5} \times 4 - \frac{12}{5} \quad \text{لدينا}$$

أي أن كل من إحداثي النقطة C و النقطة D تتحقق المعادلة $y = \frac{3}{5}x - \frac{12}{5}$ ، وبالتالي فهي معادلة للمستقيم (CD)

حساب إحداثي نقطة تقاطع (A) و (CD) .

$$D'(9; 3) \quad \text{ومنه} \quad \begin{cases} x = 9 \\ y = 3 \end{cases} \quad \text{فجد} \quad \begin{cases} y = -\frac{1}{3}x + 6 \\ y = \frac{3}{5}x - \frac{12}{5} \end{cases} \quad \text{نحل جملة المعادلتين}$$

و) حساب أطوال أضلاع المثلث ACE

الطول AC يحسب من العلاقة: $AC = \sqrt{(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2}$ ، وبنفس الطريقة نحسب AE و CE .

$$AC = \sqrt{(4 - (-2))^2 + (0 - 2)^2} = 2\sqrt{10} \quad \text{لدينا}$$

$$AE = \sqrt{(2 - (-2))^2 + (4 - 2)^2} = 2\sqrt{5} \quad \text{و}$$

$$CE = \sqrt{(2 - 4)^2 + (4 - 0)^2} = 2\sqrt{5} \quad \text{و}$$


$$AE = CE \quad \text{ومنه}$$

كما نلاحظ أن $AE^2 + CE^2 = AC^2 = 40$ أي $AC^2 = 40$ و $AE^2 + CE^2 = 40$ ، وحسب عكسية نظرية فيثاغورس فإن المثلث ACE قائم في E .

نستنتج مما سبق أن المثلث ACE قائم في E ومتتساوي الساقين.

تمارين ومسائل

14. في الشكل أدناه لدينا:
 $\vec{OC} = 3(\vec{i} + \vec{j})$ ، $B(2 : 1)$ ، $C(1 : 3)$
 أ) $A(1 : 3)$ ، ب) $A(1 : 3)$ ، ج) $D(2 : 1)$
 د) لل نقطتين A و C نفس الفاصلة
 $\vec{AB} = -\vec{u}$ هـ



15. يوجد عدد حقيقي x بحيث $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ x \end{pmatrix}$ و $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ متساويان

16. يوجد عدد حقيقي x بحيث $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ x \end{pmatrix}$ و $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ مرتبان خطيا.

17. الشعاعان $\vec{u} \begin{pmatrix} -6 \\ 9 \end{pmatrix}$ ، $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ مرتبان خطيا.

18. الشعاعان $\vec{u} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ، $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ مرتبان خطيا.

19. إذا كان I منتصف $[AB]$ ، فإذا كان I منتصف $[AB]$ ، فإذا كان I منتصف $[AB]$ ، فإذا كان I منتصف $[AB]$

20. إذا كان I منتصف $[AB]$ ، فإذا كان I منتصف $[AB]$ ، فإذا كان I منتصف $[AB]$ ، فإذا كان I منتصف $[AB]$

21. الشعاع $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ هو شعاع توجيه للمستقيم ذي المعادلة $y = -2x + 1$

22. المستقيم ذو المعادلة $y = 7$ ليس له شعاع توجيه

23. المستقيم ذو المعادلة $x - 2y = 5$ يشمل مبدأ المعلم.

24. النقطة $(-2; 1)$ تنتهي إلى المستقيم ذي المعادلة $y = 5x + 11$

أصحى أم خطأ؟

1. للشعاعين المتعاكسين أو المتساويين نفس الطولية.

2. للشعاعين \vec{u} و \vec{v} نفس الاتجاه.

3. الشعاع معدوم.

4. الشعاع غير معدوم.

5. $5\vec{AB} + \vec{AC} = 5\vec{AC}$ ثلث نقط لدينا:

6. إذا كان $\vec{u} \equiv \vec{AC}$ فإن $\vec{u} \equiv \vec{AB} - \vec{AC}$

7. A, B, C, D ليست في استقامية.
 إذا كان $\vec{AB} + \vec{CD} = \vec{0}$ فإن رباعي $ABCD$ متوازي أضلاع.

8. النقطة M تنتهي إلى $[AB]$ معناه $\vec{AM} + \vec{MB} = \vec{AB}$


9. النقطة M تنتهي إلى $[AB]$ معناه $\vec{AM} + \vec{MB} = \vec{AB}$

10. الشعاعان المتعاكسان مرتبان خطيا.

11. إذا كان $\| -3\vec{u} \| = 21$ فإن $\| \vec{u} \| = 7$

12. كل ثلاثة نقط ليست في استقامية تعين معلماً للمستوى.

13. في متوازي الأضلاع $ABCD$ الذي مركزه I ، والقط E, F, G منتصفات أضلاعه كما في الشكل. لدينا : $\vec{AE} = \vec{CG}$ ، بـ $\vec{IB} + \vec{ID} = \vec{0}$



$$\vec{CD} = 2 \vec{HI} \quad (ج) \\ \vec{EF} = \vec{HG} \quad (د)$$

ب) بين أنّ النقطة E ، A ، F هي في استقامية

$$\begin{aligned} \vec{u} &= 2\vec{AC} + \vec{DA} - \vec{CA} - 2\vec{BC} \\ \vec{v} &= \vec{CA} + \vec{BC} - \vec{AC} + \vec{AD} \end{aligned}$$

أ) اكتب كل من \vec{u} ، \vec{v} على أبسط شكل ممكن

$$ب) احسب $\vec{u} + \vec{v}$.$$

33. ثالث نقط ليست في استقامية . C ، B ، A

أنشئ نقطتين M ، N العرقه كما يأتي : $\vec{AB} + \vec{NC} = \vec{AC} + \vec{BC}$ ، $\vec{AM} + \vec{AB} = \vec{AC}$

34. ثالث نقط ليست في استقامية . C ، B ، A

أ) انشئ نقطتين M ، N المعرفة كما يأتي : $\vec{AN} = -2\vec{AB}$ ، $\vec{CM} = 2\vec{AB} + \vec{AC}$

ب) بين أنّ النقطة C منتصف $[MN]$.

35. أربع نقط متمايزه ، بين أنّ D ، C ، B ، A $\vec{AB} + \vec{CD} = \vec{AD} + \vec{CB}$

36. ثالث نقط ، أي المساويات

الآتية تعني C مننصف $[AB]$ ؟

$$\begin{array}{ll} (أ) & CA = -CB \\ (ب) & \vec{AC} = \vec{CB} \\ (ج) & AC + \vec{CB} = \vec{0} \\ (د) & \vec{AC} + CB = \vec{0} \\ (هـ) & AB = 2AC \end{array}$$

37. نقطتان من المستوى.

أ) بفرض I مننصف $[AB]$. بين أنه من أجل

$$MA + MB = 2MI$$

ب) بفرض MI هي مننصف $[AB]$ بين أنّ النقطة

صغ في جملة واحدة ما برهنت على

صحته في الجزئين (أ) و (ب)

38. ABC مثلث . G مركز تقله . A' مننصف

$$[BC]$$

أ) بين أنّ $\vec{GB} + \vec{GC} = 2\vec{GA}'$

ب) بين أنّ $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{BC} = \vec{0}$

25. النقطة $(3, -3)$ تنتمي إلى المستقيم ذي

$$y = 5x + 11$$


26. جملة المعادلتين لها حل

$$\begin{cases} -x + 2y = 6 \\ \frac{1}{2}x - y = -3 \end{cases}$$

وحيد.


تساوي شعاعين – مجموع شعاعين

27. انقل الشكل أدناه ثم علم النقط L ، M ، N المعرفة كما يأتي : $\vec{BN} = 2\vec{u}$ ، $\vec{AM} = \vec{u}$ ، $\vec{NC} = 3\vec{u}$



28. انقل كل من الأشكال الآتية على ورقة

مسطرة ، ثم انشئ النقط L ، M ، N حيث : $\vec{ML} = \vec{LN}$ ، $\vec{BN} = \vec{u} - \vec{v}$ ، $\vec{AM} = \vec{u} + \vec{v}$



29. انقل الشكل أدناه على ورقة مسطرة ، ثم علم


النقط N ، M ، L بحيث :

$$\begin{aligned} \vec{OL} &= \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} \\ \vec{OM} &= -\vec{OA} + 2\vec{OB} + \vec{OC} \\ \vec{ON} &= \vec{OA} - (\vec{OB} + \vec{OC}) \end{aligned}$$

30. $ABCD$ متوازي أضلاع ، النقط A' ، B' ، C'

نظائر النقط A ، B ، C بالنسبة إلى

النقطة D



أ) ما هي الأشعة التي

كل منها يساوي AB ؟

ب) ما هي الأشعة التي

كل منها يساوي AC' ؟


31. ABC مثلث كيفي ، انشئ النقط

المعرفة كما يأتي : $\vec{CE} = -\vec{AB}$ ، $\vec{BD} = \vec{CB}$

$$\vec{BF} = -\vec{AC}$$

أ) بين أنّ الرباعي $AEBD$ متوازي أضلاع

جاء شعاع بعدد حقيقي – الارتباط الخطى لشعاعين



.45. ثلث نقط C ، B ، A ليس في استقامية.

أ) أنشئ النقطة M المعرفة بالعلاقة

$$\vec{AM} = 3\vec{AB} - 2\vec{AC}$$

ب) بين أن النقط M ، B ، C في استقامية. (ارشاد عبر عن الشعاع \vec{CM} بدلالة (\vec{AC}, \vec{AB}) الشعاعين

.46. M ، B و (AY) نصفا مستقيم .


نقطان من (AX) ، و C ، N نقطتان من (AY)

$$\vec{AN} = y \vec{AC} \quad \vec{AM} = x \vec{AB}$$

أ) بين أنه إذا كان \vec{BC} و \vec{MN} مرتبطين خطيا فإن $x=y$

ب) بين أنه إذا كان $x=y$ فإن \vec{BC} و \vec{MN} مرتبطان خطيا.

ج) ما هي النظرية التي برهنت عليها في هذا التمرين



.47. A و B نقطتان متمايزتان. الهدف من التمرين

هو إنشاء النقطة M المعرفة للعلاقة

$$\alpha \vec{MA} + \beta \vec{MB} = \vec{0} \quad \beta=3 \quad \alpha=2$$

أ) بين أنه إذا كان $\vec{MA} + 3\vec{MB} = \vec{0}$ فإن \vec{MA} و \vec{MB} مرتبطان خطيا.

ب) هل للشعاعين MA و MB نفس الاتجاه؟ وهل لهما نفس الطولية؟

ج) عبر عن \vec{AM} بدلالة \vec{AB} ، ثم أنشئ النقطة M .

.48. A و B نقطتان متمايزتان ، M نقطة بحيث

$$\frac{1}{2} \vec{MA} - \frac{1}{3} \vec{MB} = \vec{0}$$

عبر عن \vec{AM} بدلالة \vec{AB} ، ثم أنشئ النقطة M .

.39. متوازي أضلاع مركزه النقطة O .

M منتصف $[AB]$ ، المستقيم الذي يشمل النقطة D وموازي (AC) يقطع المستقيم الذي يشمل النقطة C وموازي (BD) في النقطة N . بين أن النقط M ، O ، N في استقامية.

.40. ارسم مثلث ABC ، وعلم النقطتين M و N

$$\vec{AN} = 3\vec{AC} \quad \vec{AM} = \frac{1}{3} \vec{AB}$$

حيث $\vec{AN} = 3\vec{AC}$ و $\vec{AM} = \frac{1}{3} \vec{AB}$

بين أن المستقيمين (CM) و (BN) متوازيان.

.41. \vec{u} ، \vec{v} شعاعان غير معادمين ومرتبطان خطيا.

أ) بين أن الشعاعين $\vec{v} + 3\vec{u}$ و $2\vec{u}$ مرتبطان خطيا

ب) بين أن الشعاعين $\vec{v} + \alpha\vec{u}$ و \vec{u} مرتبطان خطيا وذلك من أجل كل عددين حقيقيين α

و β .

.42. قطعة مستقيم طولها $9cm$. C نقطة

منها حيث $AC = 5cm$

جد العدد الحقيقي x حيث



.43. قطعة مستقيم.

بين أنه إذا كانت M تتنمي إلى $[AB]$ فإنه يوجد عدد حقيقي k من $[0; 1]$ حيث

$$\vec{AM} = k \vec{AB}$$

.44. ABC مثلث كييفي . النقط F ، E ، D معرفة

$$\vec{CA} = 4 \vec{CD} \quad \vec{BA} = 3 \vec{BE}$$

كما يأتي: $\vec{CE} = \frac{3}{5} \vec{BC}$ ، $\vec{BF} = \frac{3}{5} \vec{BC}$ و G منتصف $[CE]$.

بين أن (DE) و (AF) يتقاطعان في النقطة G .

(ارشاد: عبر عن الشعاعين \vec{BG} ، \vec{BD} بدلالة (\vec{AF}, \vec{AG}) وكذلك بالنسبة للشعاعين \vec{BA} ، \vec{AC})

التعليم على مستقيم، وفي المستوى

$$\vec{u} = (2 - \sqrt{3})\vec{i} + \vec{j} \quad \text{و} \\ \vec{v} = \vec{i} + (2 + \sqrt{3})\vec{j}$$

.56. عين في كل مما يأتي العدد x بحيث يكون الشعاعان u و v مرتبطين خطيا.

$$\begin{array}{ll} \vec{v} \begin{pmatrix} x+1 \\ 6 \end{pmatrix}, \vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} & (أ) \\ \vec{v} \begin{pmatrix} 2-x \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{u} \begin{pmatrix} x \\ -5 \end{pmatrix} & (ب) \\ \vec{v} \begin{pmatrix} x \\ 27 \end{pmatrix}, \vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ x \end{pmatrix} & (ج) \end{array}$$

.57. لتكن النقطتان $A(-3; 1)$ ، $B(7; 6)$ ، M نقطة فاصلتها 1 . عين ترتيب النقطة M بحيث تكون النقط A ، M ، B في استقامية.

.58. لتكن النقطتان $A(-3; 1)$ ، $B(7; 6)$. أوجد علاقه بين x و y والتي من أجلها تكون النقطة $M(x; y)$ تتنمي إلى المستقيم (AB) .

G ، F ، E ، D متوازي أضلاع ، النقط H معرفة كما يلي: $\vec{DC}=3\vec{DF}$ ، $\vec{AD}=3\vec{AE}$ ، $\vec{H}\vec{G}=\vec{H}\vec{E}$ ، $\vec{F}\vec{G}=\vec{B}\vec{H}$ ، $\vec{C}\vec{B}=3\vec{C}\vec{G}$. أنجز شكلا مناسبا.

(ب) بين أن الشعاعين \vec{HE} و \vec{GF} متساويان ، واستنتج نوع الرباعي $EFGH$.
 (ج) عين إحداثي كل نقطة من النقط E ، F ، G ، H في المعلم $(B; \vec{BC}; \vec{BA})$ ، ثم تحقق من إجابة الجزء (ب) تحليليا (أي باستعمال الإحداثيات).

.60. في معلم متعادم ومتجانس $(\vec{i}; \vec{j}; \vec{O})$ علم النقط $A(0; 4)$ ، $B(5; 3)$ ، $C(4; -2)$ ، $D(-1; -1)$. تتحقق من أن الرباعي $ABCD$ هو مربع.

.61. متوازي أضلاع ، النقطة ' A' نظيره النقطة A بالنسبة إلى النقطة D ، النقطة M منتصف $[CD]$.

(أ) بين لماذا يمكن اعتبار $(B; \vec{BC}; \vec{BA})$ معلماً للمستوي؟

في التمارين من رقم 49 إلى 62 ، يناسب المستوى إلى معلم $(O; \vec{i}; \vec{j})$

$$\begin{array}{l} \overrightarrow{OB} = 2\vec{i} - \vec{j} ، A(3; 1) \\ \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} ، \overrightarrow{OC} = -\overrightarrow{AB} \\ \cdot D , C , B , A \end{array}$$

.50. ليكن $\vec{v} = -2\vec{i} + 3\vec{j}$ ، $u = 4\vec{i} + \vec{j}$ (أ) احسب مركبتي كل من الأشعة الآتية:

$$\frac{3}{2}\vec{u} + \frac{1}{2}\vec{v} ، \vec{u} + 2\vec{v}$$

(ب) ارسم مثلاً مبدئه النقطة O لكل من الأشعة السابقة

.51. من أجل أي قيمة لعدد x تكون النقط A ، B ، C في استقامية، في كل الحالتين الآتتين:
 (أ) $C(7; 6)$ ، $B(4; 5)$ ، $A(x; 3)$
 (ب) $C(7; 1)$ ، $B(x+4; 3)$ ، $A(x; 5)$

.52. لتكن النقطان $A(2, 3)$ و $B(-2, 2)$. احسب إحداثي النقطة D بحيث يكون الرباعي $AOBD$ متوازي أضلاع .

.53. لتكن النقط $(-5; -2)$ ، $B(-4; 3)$ ، $A(2; 0)$ ، C ، B ، A ، ثم احسب إحداثي النقطة D بحيث يكون الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع .
 (ب) احسب إحداثي النقطة O مركز $ABCD$.

.54. لتكن النقط $(-1; 2)$ ، $B(3; 0)$ ، $A(0; 3)$ ، $C(-4; -4)$.

(أ) هل المستقيمان (AB) و (CD) متوازيان ؟
 (ب) نقطة فاصلتها 4 . عين ترتيبية M بحيث يكون المستقيمان (AB) و (CM) متوازيين .

.55. بين فيما يأتي أن الشعاعين u و v مرتبطان خطيا، ثم عبر عن أحدهما بدلالة الآخر .

$$\begin{array}{l} \vec{u} = \vec{i} + 3\vec{j} \quad \text{و} \\ \vec{v} = (\vec{i} + 5\vec{j}) + \frac{1}{2}(\vec{i} - \vec{j}) \end{array}$$

- (أ) تحقق من أنَّ النقطتين A ، B متناظرتان بالنسبة إلى النقطة O .
- (ب) بين أنَّ النقطة M متساوية المسافة عن طرفي $[AB]$ يكافي $y = 3x$
- (ج) عين قيمة x في حالة المثلث AMB متقارن الأضلاع.

معادلة مستقيم

في التمارين الموالية ينسب المستوى إلى معلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$

68. (D) مستقيم معادلته $7 - 3x - 5y = 0$ ، أوجد شعاع توجيه للمستقيم (D) ، وعين معامل توجيهه.

69. نفس التمارين السابق بالنسبة إلى المستقيم (D')
ذي المعادلة $2x\sqrt{3} + 2y = -4$

70. (D) مستقيم معادلته $-7 - 3x = 0$ ، أوجد شعاع توجيه للمستقيم (D) . هل لـ (D) معامل توجيهه؟

71. ارسم المستقيمات (D_1) ، (D_2) ، (D_3) ، (D_4) ، (D_5) حيث:

$$y = \frac{2}{3}x - \frac{5}{3} : (D_3) \quad y = 3x : (D_1)$$

$$y = -\frac{3}{2}x + 7 : (D_4) \quad x = -4 : (D_2)$$

72. لتكن النقطة $C(3; 4)$ ، $B(3; 1)$ ، $A(1; 3)$. اكتب معادلة لكل مستقيم من المستقيمات (AC) ، (BC) ، (AB) على الشكل $y = ax + b$ ، ثم على الشكل $my + px = n$

73. لتكن $A(3; -2)$ و $\vec{u} = 2\vec{i} - \vec{j}$. جد معادلة المستقيم الذي يشمل النقطة A و شعاع توجيه له.

74. جد معادلة المستقيم الذي معامل توجيهه $\frac{1}{2}$ ويقطع محور التراتيب في النقطة التي ترتبها (-5) .

- (أ) عين إحداثي كل من النقط D ، C ، B ، A ، M ، A' في هذا المعلم.


- (ج) بين باستعمال الإحداثيات المحصل عليها أنَّ النقطة M هي منتصف $[BA]$.

62. $ABCD$ مربع ، النقطة M منتصف $[BC]$

والنقطة N معرفة بالعلاقة $\overrightarrow{CD} = 4\overrightarrow{CN}$

- (أ) بين لماذا يمكن اعتبار $(\overrightarrow{B}; \overrightarrow{BC}; \overrightarrow{BA})$ معلوماً متعامداً متجانساً للمستوى؟

- (ب) بين تحليلياً أنَّ المثلث AMN قائم في M .



- في التمارين من 64 إلى 68 نعتبر $(O; \vec{i}, \vec{j})$ معلوماً متعامداً ومتجانساً.

63. لتكن النقطة $N(3; 6)$ ، $M(2; -1)$ ، $L(-1; 3)$

- (أ) احسب أطوال أضلاع المثلث LMN .

- (ب) بين أنَّ المثلث LMN قائم ومتتساوي الساقين.

64. لتكن النقطة $C(3; 6)$ ، $B(-2; 6)$ ، $A(1; 2)$ ، $D(6; 2)$

- ما نوع الرباعي $ABCD$ ؟

65. حدد نوع الرباعي $ABEF$ إذا علمت أنَّ

$$E(-6; 3) , B(-2; 6) , A(1; 2) , F(-3; -1)$$

66. أ) علم النقطة $(B(1; 4) , A(-2; 1) , C(6; -1))$ ، وبين أنَّ المثلث ABC قائم.

- (ب) عين إحداثيي مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC واحسب نصف قطرها.

- (ج) تحقق من أنَّ النقطة $M(1; -4)$ تنتهي إلى الدائرة المحيطة بالمثلث ABC .

67. لتكن $(M(x; y) , B(-3; 1) , A(3; -1))$

ب) ما هي القيمة الممكنة للعدد k بحيث يكون للجملة (S) لا نهاية من الحلول.

81. لتكن النقطة $C(7; 4)$ ، $A(0; 5)$ ، $B(6; 2)$ ،

أ) بين أن المستقيمين (AB) و (CD) متوازيان
ب) احسب إحداثي نقطة تقاطعهما ، وتحقق من ذلك بيانيا.

82. نريد حل جملة المعادلتين (S) :

$$\begin{cases} 2z^2 - t^2 = -1 \\ 3z^2 + t^2 = 21 \end{cases}$$

أ) بوضع $x = z^2$ و $y = t^2$ اكتب جملة المعادلتين (S') المكافئة للجملة (S) .
ب) حل جملة المعادلتين (S') واستنتج حل الجملة (S) .

83. نريد حل جملة المعادلتين (S) :

$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{7}{y-2} = 6 \\ \frac{7}{x} - \frac{3}{y-2} = 16 \end{cases}$$

أ) بين أن $x \neq 0$ و $y \neq 2$ وأن $x \neq z$ و $t = \frac{1}{y-2}$ اكتب جملة المعادلتين (S') المكافئة للجملة (S) .
ب) حل جملة المعادلتين (S') واستنتاج حل الجملة (S) .

84. عددا مجموعهما 15 ، إذا أضفنا إلى كل منهما العدد 3 صار أحدهما نصف الآخر.
جذ هذين العددين.

85. بمناسبة انتقاله إلى الثانوية نظم يوسف

وليمة دعا إليها تلاميذ قسمه. لاحظ أنه لو يجلس كل 5 تلاميذ حول طاولة فإن 3 منهم لا يجد لهم أماكن للجلوس، ولو يجلس كل 6 تلاميذ حول طاولة فإن 4 أماكن تبقى شاغرة. ما هو عدد التلاميذ الذين دعاهم يوسف؟ وما هو عدد الطاولات؟

86. ABC مثلث أطوال أضلاعه $AB=9cm$ ،

$AC=6cm$ $BC=10cm$. منصف زاوية

الرأس A يقطع $[BC]$ في النقطة D . احسب الطولين BD و CD .

75. (D) مستقيم معادلته $y = \sqrt{2}x - 3$ ، اكتب معادلة للمستقيم (D') الذي يوازي المستقيم (D) ويقطع محور الفواصل في النقطة التي فاصلتها 4.

76. أ) جد معادلة للمستقيم (D) الذي معامل

توجيهه $\frac{3}{2}$ ويشمل النقطة $(-2; -3)$.
ب) عين إحداثي نقطة تقاطع (D) مع محور

الفواصل ، وكذا إحداثي نقطة تقاطعه مع محور التراتيب.

77. بين في كل من الحالتين الآتيتين أن

المستقيمين (D) و (D') متوازيان.

$$(A) : 2x - 3y = 1 : (D)$$

$$-x + \frac{3}{2}y = 0 : (D')$$

$$-3x + 7 = 0 : (D) (B)$$

$$x - \frac{\sqrt{3}}{5} = 0 : (D')$$

جملة معادلتين خطيتين لمجهولين

ينسب المستوى إلى معلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$

78. في كل مما يأتي حل جملة المعادلتين ، ثم مثّل الحل بيانيا.

$$\begin{cases} -x + y = -2 \\ 7x + y = 22 \end{cases} (B) \quad \begin{cases} x + y = 6 \\ -2x + y = 0 \end{cases} (A)$$

$$\begin{cases} -7x + 11y = 43 \\ 6x + y = -16 \end{cases} (C)$$

$$\begin{cases} x\sqrt{2} + \frac{1}{2}y = 2 - \frac{\sqrt{3}}{2} \\ x\sqrt{6} - 2y = 0 \end{cases} (D)$$

79. لتكن جملة المعادلتين (S) :

ما هي القيم الممكنة للعدد k بحيث يكون للجملة (S) حل وحيد.

80. لتكن جملة المعادلتين (S) :

$$\begin{cases} x - \frac{1}{2}y = 3 \\ -\frac{3}{2}x + 3y = k \end{cases}$$

أ) بين أن جملة المعادلتين (S) إما لا حل لها، وإما لها لا نهاية من الحلول.

الطريقة (1) باستعمال خاصية مركز ثقل مثلث
أ) بين أن النقطة G هي مركز ثقل المثلث ABC .

- ب) عبر عن الشعاع \overrightarrow{BG} بدلالة الشعاع \overrightarrow{GO} .
ج) بنفس الطريقة السابقة عبر عن الشعاع \overrightarrow{DH} بدلالة الشعاع \overrightarrow{HQ} .
د) استنتج مما سبق أن $\overrightarrow{BG} = \overrightarrow{GH} = \overrightarrow{HD}$ ومنه المطلوب.

الطريقة (2) باستعمال المعلم $(B; \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{BE})$
أ) عين إحداثيات النقط المسماة في الشكل.
ب) احسب مركبتي كل من الأشعة $\overrightarrow{GH}, \overrightarrow{BG}$ و \overrightarrow{HD}
ج) استنتج مما سبق أن $\overrightarrow{BG} = \overrightarrow{GH} = \overrightarrow{HD}$ ومنه المطلوب.

الطريقة (3) باستعمال خواص هندسية أساسية
أ) لنكن M منتصف $[CD]$. بين أن المستقيم (AM) يشمل النقطة H .
ب) بين أن المستقيمان (AM) و (CE) متوازيان.
ج) باستعمال نظرية طالس في كل من المثلثين ABH و DCG بين أن:
 $BG = GH = HD$

89. p عدد حقيقي ، و ليكن (D_p) مستقيما معرفا بالمعادلة $y = x + p$.

أ) ارسم في مستوى مزود بمعلم المستقيمين (D_0) ، (D_1) .


ب) بين أنه من أجل كل عددين p و p' فإن المستقيمين (D_p) ، $(D_{p'})$ متوازيان.
ج) احسب بدلالة العدد p إحداثي النقاطين A_p و B_p تقاطع المستقيم (D_p) مع محور الفواصل ومحور التراتيب على الترتيب.

د) احسب بدلالة العدد p إحداثي النقطة منتصف M_p $[A_p B_p]$.

هـ) جد علاقة مستقلة عن p بين إحداثي النقطة M_p ، واستنتج المحل الهندسي لمجموعة النقط M_p .

87. مستقيم أول

مثلث كييفي ، O مركز الدائرة المحيطة به، G مركز ثقله ، H نقطة تلاقي ارتفاعاته ، A' ، B' ، C' منتصف كل من $[BC]$ ، $[AC]$ على الترتيب.



1) البحث عن النقطة X التي تحقق العلاقة:

$$\overrightarrow{OX} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$$

أ) بين أن $\overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OC'} = 2\overrightarrow{OA}$ ، واستنتج أن $\overrightarrow{AX} = 2\overrightarrow{OA'}$.

ب) استنتج أن النقطة X تتنمي إلى ارتفاع المثلث المتعلق بالضلع ABC .

ج) تتحقق بنفس الطريقة السابقة أن النقطة X تتنمي إلى ارتفاع المثلث ABC المتعلق بالضلع $[AC]$.

د) ماذا تمثل النقطة X في المثلث ABC ؟


$$\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GA}$$

ب) استنتج أن $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{0}$

أ) بين أن $\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}$
ب) ماذا يمكنك أن تستنتج بالنسبة إلى النقط O ، H ، G .

* يسمى المستقيم الذي يشمل النقط O ، G ، H مستقيم أول.

88. الهدف من هذه المسألة هو برهان خاصة بعدة طرائق وذلك بتتويع الوسائل الرياضياتية المستخدمة.



متوازي أضلاع $ABCD$ ، E ، F منتصف ضلعه $[AD]$ ، $[AB]$ على الترتيب. المستقيمان (CF) ، (CE) يقطعان $[BD]$ في نقطتين G ، H على الترتيب.
بين أن: $BG = GH = HD$

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

**الموضوع : إفادة بتصحيحات ضرورية في كتاب الرياضيات
للسنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا**

**المرجع : العقد المبرم بين المؤلف والديوان
الوطني للمطبوعات المدرسية**

الجزائر في 14 مارس 2006

م. ت. ت : م. بلعباس

إلى

السيد مدير الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية - العاشر -

يشرفني أن أفايكم بتصحيحات للأخطاء التي ظهرت في الطبعة الأولى من كتاب الرياضيات للسنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا على أمل أن يتم التكفل بها على مستوى مؤسستكم لتصحيحها في الطبعة المقبلة. هذه التصحيحات تقدم لكم في قرص مضغوط بثلاث طبعات هي - IMAGE - PDF - word - بالإضافة إلى مطبوعة تتكون من 8 صفحات تشمل على مضمون القرص.

أخبركم بأنني تحت تصرف مصالحكم المعنية لتجسيد عملية التصحيحات.

المؤلف م. ت .

م. بلعباس

:1

		14	1
XI IIIV IIIV VI V IV III II I 9 8 7 6 5 4 3 2 1	XI IIIV IIIV IV V VI III II I 9 8 7 6 5 4 3 2 1	18	
		7	4
$\frac{23}{7} = 3, \underline{285714} \ 285714\dots$	$\frac{23}{7} = 3, \underline{28571} \ 285741\dots$	17	5
$\frac{28}{7} = 3, \underline{28571}$ $\frac{17}{11} = 1, \underline{54}$ $\frac{1}{2} = 0, \underline{50}$	$\frac{28}{7} = \underline{28571}$ $\frac{17}{11} = \underline{54}$ $\frac{1}{2} = \underline{50}$	18	5
A $\cdot p + I$	A d	A d $\cdot p$	7
$25120 \times 0,00935$ $.3 \times 10^2$ 27×10 . ($25120 \times 0,00935$ $.27 \times 10$		8
$25 \geq -5 \quad (-5)^2 = 25$	$25 \geq 5 \quad (-5)^2 = 25$		14
$P(n) = n^2 + n + 41 : n$	$P(n) = n^2 + n - 41 : n$	61	22

- - :2

$-5X \leq -5$	$-5X \leq -1$ " 2 "	(3)	37
---------------	------------------------	-----	----

- - :3

$(0,80)$	$(0,125)$	1	
.	.		
$(50,200)$	$(50,150)$	2	50
$A(x)$	$F(x)$	6	57
: $f(x) \leq g(x)$ (\mathcal{C}_g)	$f(x) > g(x)$ (\mathcal{C}_f)	7	58
.	.	4	
(\mathcal{C})	\mathcal{C}	2	
(C_g)	(C_f)	20	
$f : x \mapsto 2x - 3$	$f : x \mapsto 2x - 3$	58	
...	...	59	
		7	
$D_f =]-\infty ; -1[\cup]-1 ; 0[\cup]0 ; +\infty [$	$D_f =]-\infty ; -1[\cup]0 ; +\infty [$	5	63
$x \neq -2$	$f(x) = \frac{x}{x+2}$	1	
	$x \neq 2$		
	$f(x) = \frac{x}{x+2}$		
(2)	(2)	13 4	73
$AB = 5 \text{ cm}$	$AB = 6 \text{ cm} : 1$	68	81

الباب 4: الدوال المرجعية

$(O; I, J)$	استعمل المعلم (O, I, J)	نشاط 1 : السطر 10	84
1) عين إحداثي النقطة ...M	1) عين إحداثي M النقطة ...	نشاط 3 : السطر 20	84
...فواصل نقط أخرى من (D) ...	فواصل نقط أخرى من (C) ...	نشاط 5 السطر 12	85
إلغاء 0 و ∞ + في طرفي هذا السهم		• اتجاه التغير السطر 7	88
للانعداد 0 ، 2π ، $2\pi - \text{نفس الصورة} \dots$	للأعداد 0 ، 2π ، $2\pi - \text{نفس الصورة} \dots$	مثال 24 السطر	89
$(-x)^2$	$(-x^2)$	$\dots x^2$ (في التعالق)	92
$[-2; +\infty[$ 2	...	93
$-2 < x_1 < x_2$	$() \dots -2 > x_1 < x_2$	14	93
" $[-2; +\infty[\subset [0; +\infty[$ "			93
" " $]-\infty; -1[$	$x_2 \quad x_1$ 7	فقرة دراسة اتجاه تغير الدالة	95
$y = x^2$	$y = x$		96
$\alpha \quad M \quad k)$ $([0; 2\pi]$	$\alpha \quad M \quad k)$ $([0; \pi]$	14) (98
$\sin \pi/3 = \sqrt{3}/2$	$\sin \pi/3 = 1/2$	في الخانة "حل" 12	99
$\pi/6 \quad M''$	$\pi/4 \quad M$	في الخانة "حل" 13	99
احسب جيب و جيب القيم $\pi/4$ - $\pi/4$ و $3\pi/4$ و $5\pi/4$ $201\pi/4$	احسب جيب و جيب القيم $\pi/4$ - $3\pi/4$ و $5\pi/4$	السطر الثاني	100
			100

$-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$	$-1 \leq x \leq 1$ هذا الشكل يحذف لأنّه غير دقيق	" " 2	101
$0 \leq x \leq \pi/2$ •	$0 \leq x \leq 1$ •	1	101
$-\pi/2 \leq x \leq 0$ • $0 \leq x \leq \pi/2$	عندما $-1 \leq x \leq 0$ يكون $0 \leq -x \leq 1$ •	8	101
..... فان $0 \leq x \leq \pi/2$ فان $-\pi/2 \leq x \leq 0$ فان $0 \leq x \leq 1$ فان $-1 \leq x \leq 0$	12	101
$M = H$ $(f(3)=0) \dots x=3$	$M = H$ $(f(0)=0) \dots x=0$	• على M القطعة : $[AH]$	103
$M = A$ $(f(0)=0) \dots x=0$	$M = A$ $(f(3)=0) \dots x=3$		
GRAPH ← نكتب WINDOW ← $Y1=-2x^2+6x$	← نكتب WINDOW GRAPH ← $Y1=-2x^2+6x$	(2)	103
$2x^2-14x+49=37$	$2x^2-4x+49=37$ (.2)	23	105
$x \rightarrow ax^2+b$	$x \rightarrow ax+b$	9	106
.....	15	107
..... $f(x)=3x^2-12x-3$ $f(x)=3x^2-12x-11$	16	107
$f(x)=-x^2+2x-3$	$f(x)=x^2+2x-3$	17	107
. f.37	. f .37	37	109
.... .3838	38	109
10cm	cm10	47	110
.... \widehat{AB} AB	48	110
.... (51 (.51	50 51	110
... x	...		110

.	.4	17	129

الباب 6: الإحصاء

• استعمال خواص الوسط الحسابي • إلغاء • إلغاء	• خواص الوسط الحسابي و استعماله. • •	الكافاءات المستهدفة	141
عن توزيع (إلغاء القوس)	عن (توزيع	1 2	142
تكرار 10 هو 5	تكرار 10 هو 3	. 3	147
		" "	150
n	n	" " 2	152
m	M		155
A2	A1	(" "	158
26 ... 4 3 2 1	1 ,2 ,3,4, ...,26	:2 " "	163
()-10	10-()		173
(.1		1	174
		2	174
		3	174
....3 (174
: .4	1	175
	()15		175

الباب 7 : الهندسة الفضائية

الصواب	الخطأ	السطر أو الفقرة	الصفحة
[AB] و [AG] و [AH] متساوية،	ب) بين أن حرف الهرم AF و AG و AB و AH متساوية،	7	186
مثال: تمثيل موشور قائم	حذف (1) نشاط 4. المنظور المتساوي القياس (1)	16	186
تمثيل موشور قائم قاعدته مثلث ...	ليسا من مستو واحد (في الشكل الذي يوجد بعد عنوان الأوضاع النسبية لمستقيمين)	9	188
(D) و (D') ليسا من مستو واحد	B في الشكل الأول أعلى الصفحة	10	190
يحذف الحرف B	في الشكل في الإطارات الأول ينقص تسمية المستقيم (D) المرسوم باللون الأسود	191	191
إضافة التسمية (D) لهذا المستقيم في الشكل	1. إما بثلاث نقط ليست على استقامة واحدة.	4	195
ينقل إلى أسفل يمين الصفحة 198	الشكل أعلى يمين الصفحة 199	199-198	199-198
يرتبط تحت عنوان التمثيل بالمنظور متساوي القياس ويرقام بالرقم 17 بينما يصبح التمارين رقم 16 يحمل الرقم 17	التمرين 16	205	205
أ. بين أن الناظر يقع تحت المستوى (BCD) والقطة ارسم تمثيلا لنفس المجسم ... يقعان فوق المستوى (BCD).	أ. بين أن الناظر يقع تحت [BC] والقطة ارسم تمثيلا لنفس المجسم ... يقعان فوق [BC].	205	205
. باستخدام تقنية المنظور متساوي القياس ارسم تكبير الشكل قليلا ومقابله لنصف التمارين.	التمرين 23. باستخدام المنظور متساوي القياس ارسم التمارين 51 الشكل المرفق	1	206
			209

الباب 8 الهندسة المستوية

الصفحة	السطر أو الفقرة	الخطأ	الصواب
214	النشاط 3	نضيف للشكل في الجزء عالمي على $[CB]$ و عالمي على $[AB]$ وعلامة التعادم على (Δ_2) وذلك لتشير تساوي قطعتين و تشير التعادم .	نضيف للشكل في الجزء عالمي على $[CB]$ و عالمي على $[AB]$ وعلامة التعادم على (Δ_2)
216	النشاط 7 الجزء (1) في الشكل	حذف الإطار الداخلي	(2) نسمية الشكلين (1) و (2)
216	النشاط 7 الجزء (2) في الشكل	إضافة تحت الدائرة في فقرة المحور العbara $(OA = OB = OC)$	إضافة تحت الدائرة في فقرة المحور العbara $(OA = OB = OC)$
218	11	في فقرة المتوسط تحت المثلث نضيف $(GC=2GC'$ ، $GB=2GB'$ ، $GA=2GA'$)	إضافة تحت المثلث نضيف $(GC=2GC'$ ، $GB=2GB'$ ، $GA=2GA')$
218	13	في الشكل: إضافة العبارات (الوتر، المقابل، المجاور) وحذف الحرف a وتعويضه بالحرف α عند الرأس A لل مثلث فقط.	في الشكل: إضافة العبارات (الوتر، المقابل، المجاور) وحذف الحرف a وتعويضه بالحرف α عند الرأس A لل مثلث فقط.
219	الخاصية 3	تبديل موضع الكتيبتين B' و C' في الشكل	تبديل موضع الكتيبتين B' و C' في الشكل
223	الخاصية 3	في الشكل المرفق للمبرهنة 6 أرقام ترتيب الأشكال معكوسa	يكون ترتيب الأشكال (1) (2) (3) (4) من اليمين إلى اليسار
230	بين 10 و 11	ينقص العنوان : • الزوايا والدائرة	ينقص العنوان : • الزوايا والدائرة
231	التمرين 231	تنقص التسمية (C') في الشكل الدائرة	إضافة التسمية (C') للدائرة الخارجية
231	التمرين 231	تنقص العنوان (2) كتابة كلمة فيثاغورس في نفس السطر مadam المكان يسمح.	في العنوان (2) كتابة كلمة فيثاغورس في نفس السطر مadam المكان يسمح.
233	التمرين 17	تنقص O' على الشكل الثاني في الحل	إضافة O' على الشكل الثاني في الحل
236	التمرين 236	في الشكل المقابل لنصف المسألة نحذف المستقيمين المرسومين باللون الأزرق	في الشكل المقابل لنصف المسألة نحذف المستقيمين المرسومين باللون الأزرق
238	التمرين 3	الرسم فوق النص يخفي العبارة (في الشكل ليس) بتنزيل الشكل قليلا	إظهار العبارة (في الشكل ليس) بتنزيل الشكل قليلا
238	التمرين 13	تقريب الحرف a باللون الأحمر من الضلع $[AC]$ في الشكل.	تقريب الحرف a باللون الأحمر من الضلع $[AC]$ في الشكل.
238	التمرين 14	تشير الزاوية القائمة A كما هو الحال بالنسبة إلى الزاوية D في الشكل ووضع علامة = على الضلع $[CD]$	تشير الزاوية القائمة A كما هو الحال بالنسبة إلى الزاوية D في الشكل ووضع علامة = على الضلع $[CD]$
239	التمرين 28	ينقص رسم الضلع [FD]	رسم الضلع [FD]
240	التمرين 32	إضافة العبارة "النقطتان M و N منتصفان [AB] و [BC] على الترتيب" بعد السطر الأول من نص التمرين	تنقص رسم الضلع [FD]
241	التمرين 47	تغير النقطة H بالنقطة 'H في السطر الخامس من نص التمرين	تغير الكتابة [AB] بالكتابة [AB'] في السطر الثاني من نص التمرين
241	التمرين 53	تغير الكتابة [AB] بالكتابة [AB'] في السطر الثاني من نص التمرين	هذا التمرين يحذف لأنه مكرر (هو نفسه التمرين 50) ويعد ترتيب التمارين الموالية له حيث يحمل آخر تمارين الرقم 117 بدلا عن 118.
241	التمرين 54	آخر تمارين الرقم 117 بدلا عن 118.	إظهار النص الذي يخفيه الرسم ($BC=4$ ، $C'D'=6cm$)
243	التمرين 65	الرسم يخفي جزء من النص	الرسم يخفي جزء من النص
243	التمرين 66	استبدال الكتابة [AB] بالكتابة [AC] في السطر 3 من نص التمرين	الصواب: ... $[AC]$ قطر في (C)، ويقطع (C') في النقطة M ، و $[AD]$ قطر في (C')، ويقطع (C') في النقطة N.
244	التمرين 75	التمرين 4,3,2	الصواب: ... $[AC]$ قطر في (C)، ويقطع (C') في النقطة M ، و $[AD]$ قطر في (C')، ويقطع (C') في النقطة N.
246	التمرين 89	الحرف A في الشكل خطأ	الحرف O بدل الحرف A
247	التمرين 97	أ) احسب أطوال كل ...	أ) احسب بدلالة a أطوال كل ...
248	التمرين 108	غير مكتوبة في سطر واحد	تكتب العبارة $AM = BN$ في سطر واحد
249	التمرين 117	في الشكل المرفق للطريقة 2	على المستقيم (D) بدل B و C بدل

الباب 9 الحساب الشعاعي والهندسة التحليلية

الصفحة	السطر أو الفقرة	الخطأ	الصواب
254	التعريف 1 الشكل الأول $v = AB$	إضافة رمز الشعاع فوق v وكذا فوق AB	إضافة رمز الشعاع فوق v وكذا فوق AB
254	في العبارة $\overrightarrow{AB} = AB$	لا تكتب مائلة.	
256	رمزاً الشعاعان \overrightarrow{AB} و \overrightarrow{CD} ليسا في مكانهما	كتابة رمز الشعاع في مكانه.	
256	نصل أسفل الشكل الموضح للمعلم المتعامد في نهاية الصفحة	إضافة العبارة $((OJ) \perp (OI))$	إظهار النص (باستعمال مبرهنة فيثاغورس في) الذي يكمل السطر الأول الموجود بعد إطار المبرهنة 6. فهو مخفى بالشكل الواقع على يسار الصفحة.
259	الهدف: تعليم طريقة للبرهنة باستعمال معلم؟	حذف نقطة الاستقحام في نهاية النص.	
269	التمرين 5	C, A, B ، ثالث نقط كيفية ...	C, B, A ، ثالث نقط لدينا: ...
273	التمرين 9	الأشعة زائدة	تحذف الأشعة
273	التمرين 29	الشكل نزل إلى التمرين 30.	إعادة الشكل الموجود في التمرين 30 إلى التمرين 29
274	التمرين 44	تستبدل الكتابة (DE) بالكتابية (BD) في السطر 4 من نص التمرين	
275	التمرين 50	كتابه رمز الشعاع فوق الحرف u	كتابه رمز الشعاع فوق الحرف u
276	التمرين 51	استبدال كلمة لعدد بالكلمة لعدد في السطر 1 من نص التمرين	استبدال كلمة لعدد بالكلمة لعدد في السطر 1 من نص التمرين
276	التمرين 55	ينقص رمز الشعاع فوق الحرفين u و v في السطر 1 من نص التمرين	كتابة رمز الشعاع فوق كل من هذين الحرفين
276	التمرين 56	ينقص رمز الشعاع فوق الحرفين u و v في السطر 21 من نص التمرين	كتابة رمز الشعاع فوق كل من هذين الحرفين