

دوليارات رفيق الزجاج في علوم الطبيعة و الأحياء

5
نماذج مقرئحة من سلسلة
التعليم الثانوي بحلولها المفصلة

ثانوي

السنة



شعبة علوم تجريبية

50 دج
فقط

رُؤْسَ الْجَاهِ

لِلعلومِ الْمُسْلِمِيَّةِ وَالْجَاهِ

جَوَادُ الْكَوَافِرِ



شعبة العلوم التجريبية


مجموعة مواضع ختارة وفق الرزناماج
المجديد المقرر من طرف وزارة التربية الوطنية

إعداد الأستاذة: سوماتي كبيرة ذهبية

دار شريفى للطباعة والنشر والتوزيع


النموذج الأول

التمرين الأول:



- 1- تمثل الوثيقة -1- رسمًا مبسطًا لسلسلة بروتينية.
أ- قدم عنواناً مناسباً للوثيقة.
ب- سم الروابط الكيميائية المبينة في الوثيقة
 بالأحرف: س، ص، ع و م.


2- تمثل الوثيقة -2- بعض الأحماض الأمينية وفق تسلسلها في السلسلة البروتينية و التي تنتمي إليها.



- أكتب الصيغة الكيميائية للبيتايدات الموضرة في الوثيقة -1-.

التمرين الثاني:

تمثل خريطة الوثيقة (1) كل من خطوط متساوية العمق ، البوار الرزلالية و مناطق توادج البراكين النشطة على مستوى خندق طانغا-كرمادك (Tanga - Kermadec) في المحيط الهادئ .



مولياته علوم الطبيعة و العيادة

يلخص جدول الوثيقة (2) عمق البؤر الزلزالية (المقطع ا-ب الوثيقة 1) بدلالة بعد عن الخندق باتجاه الغرب .

البعد عن الخندق (كلم)	عمق البؤر الزلزالية (كلم)
0	0
133	100
233	200
400	300
533	400
666	500
766	600

الوثيقة 2

1 - أ - ترجم النتائج المحصل عليها في جدول الوثيقة (2) إلى منحنى بياني على معلم متعمد و متجانس تمثل فيه عمق البؤر الزلزالية بدلالة بعد عن الخندق .

ب - ماذا يطلق على هذا المنحنى ؟


2 - حدد الميل و على ماذا يدل ؟

3 - كيف تفسر وجود البراكين في منطقة الصفائح المترابطة (chevauchantes) ؟

4 - حدد الصفيحة التي تغوص تحت الصفيحة الأخرى ؟

الوضعية الإحتماجية:



لغرض الدراسة الفيزيولوجية العصبية استعملنا التركيب التجريبي الموضح بالوثيقة -1- تم تسجيل ملاحظاتنا على جهاز (ر.ذ.م).



1- ننبه بواسطة تيار كهربائي ذي شدة كافية في نقطة (ن) تبعد عن المسارى ق 1 بمسافة 3 سم. ثم نعيد التبييه في نفس النقطة فتحصلنا على التسجيل المبين في الشكل (2).

- أحسب سرعة السائلة العصبية و قدم معلوماتك حول مميزاتها.

2- لمعرفة آلية انتقال سائلة عصبية من خلية عصبية إلى خلية عضلية، أتجز الرسم التخطيطي لما فوق البنية الخلوية لمنطقة الاتصال بينهما -الشكل 3-



مولياته ملء الطبيعة و الحياة

- أ. ضع البيانات حسب الترتيب المعطى مع إعطاء عنوان مناسب لهذه الوثيقة.
 ب. نقوم بسلسلة من التجارب موضحة في الجدول التالي:

رقم التجربة	التجربة	النتائج الملاحظة
1	تبه العنصر -أ- تنبئها فعالا.	كمون عمل في كل من -أ- و -ب- و نقص في عدد العناصر -3-.
2	تبه العنصر -ب- تنبئها فعالا.	كمون عمل في -ب- فقط مع ثبات عدد العناصر -3-.
3	حقن محتوى العنصر -3- في مستوى المنطقة -6- من دون تنبية.	كمون عمل في -ب- فقط مع ثبات عدد العناصر -3-.
4	حقن الأستيل كولين في مستوى المنطقة -6- من دون تنبية.	كمون عمل في -ب- فقط مع ثبات عدد العناصر -3-.
5	حقن شوارد الكالسيوم في المنطقة -10- من الجزء -أ-.	كمون عمل في -ب- مع نقص عدد العناصر -3-.
6	حقن الكورار في المنطقة -6- ثم تنبية العنصر -أ- تنبئها فعالا.	كمون عمل في -أ- مع نقص عدد العناصر -3-.
7	حقن الكورار ثم حقن محتوى العنصر -3- في نفس المنطقة دون تنبية.	عدم تسجيل كمون عمل و ثبات عدد العناصر -3-.

(1) فسر هذه النتائج.

(2) ماذا تستنتج

الموضوع الثاني

التمرین الأول:

يبدأ هضم البروتينات الموجودة في الغذاء على مستوى المعدة حيث تقوم خلايا جدران المعدة بتركيب إنزيمات تسمى البريلينات و إفرازها في لمعة المعدة في صور خاملة تحول بعد إفرازها إلى حالة نشطة. يقوم إنزيم البريلين بفك الرابطة البيتينية عند موضع محددة (عند Tyr و Phe) في عصارة المعدة ذات PH الحامضي ($\text{PH}=2$) . لذلك تفكك السلسلة البيتينية إلى قطع بيدينية وليس للأى أحماض أمينية. يستمر هضم البروتينات في إثنى عشر بواسطة إنزيمات أخرى مثل إنزيم trypsin الذي يفك الرابطة البيتينية عند الحمض الأميني Lys و عند Arg حيث يكون $\text{PH}=6.5$.


- 1- استخرج من هذا النص العلمي بعض خصائص الإنزيم؟
- 2- ما هو ناتج معاملة البيتينيد التالي بإنزيم بريلين و إنزيم تربسين؟قارن نواتج التحلل في الحالتين و ما هي احتمالات نواتج التحلل لكل إنزيم؟

Ala- Gly- Tyr- Arg- Ser- Phe -Glu- Val- Lys- Leu

التمرین الثاني:

نضع مسحوق أوراق نبات السبانخ في وسط مناسب ثم نخضعها لعملية الطرد المركزي فنحصل على مستخلص خلوي به صناعات حضرة و ميتوكوندريات، ينقل هذا المستخلص إلى مسبار حيث يكون الوسط خال من غاز ثاني أكسيد الكربون ، يضاف لهذا الوسط خلال فترات معينة (1 و 2 و 3) كاشف هيل الممثل في (DCPIP) .

- يأخذ (DCPIP) لون أزرق عندما يكون مؤكسد و عديم اللون عندما يكون مرجع .
- النتائج المحصل عليها على شاشة الجهاز المدعم بالحاسوب ممثلة بالوثيقة التالية :



حالة (DCPIP):

يأخذ اللون الأزرق في (1) و (2) و (3) و (هـ).

يكون عديم اللون في (جـ) و (دـ) و (وـ).

– بين انتلاقاً من النتائج المحصل عليها و الممثلة بالوثيقة:

1 – أن الصانعات الخضراء المعزولة يمكن أن تطرح غاز O_2 في غياب غاز CO_2 .

2 – أن طرح O_2 يتطلب وجود مؤكسد في الوسط.


3 – أن كاشف هيل يتم ارجاعه في وجود الضوء.

4 – أن طرح O_2 مرتبط بارجاع كاشف هيل.


الوضعية الإدماجية:

الأنسولين هرمون يفرز من طرف خلايا البنكرياس و يعمل على تعديل نسبة السكر في الدم، و هو متعدد

ببتيد يتكون من 51 حمض أميني كما هو موضح في الوثيقة 1.



تشكل نهاية السلسلة B لأنسولين الإنسان بتدخل سلسلة من نكليوتيدات الرسول الممثلة بالوثيقة 2.



أ- باستعمال جدول الشفرات الوراثية (الوثيقة 3)، ترجم الجزيئ إلى سلسلة ببتيدية.

ب- ما هي الإشكالية المطروحة خلال ترجمتك.

ج- حدد الحمض الأميني الذي تمثله الثلاثية الأولى من سلسلة نوكليوتيدات الرسول المعطاة في

الوثيقة 2.

مولياته علم الطبيعة والحياة

د- أوجد جزء المورثة المسؤول على إصطناع نهاية هذه السلسلة من الأحماض الأمينية المكونة من 12 حمض أميني.

		Second base						
		U	C	A	G			
First base	U	UUU UUC UUA UUG	UCU UCC UCA UCG	UAU UAC UAA UAG	Tyrosine (Tyr) Stop Stop	UGU UGC UGA UGG	Cysteine (Cys) Stop Tryptophan (Trp)	
	C	CUU CUC CUA CUG	CCU CCC CCA CCG	CAU CAC CAA CAG	Histidine (His) Glutamine (Gln)	CGU CGC CGA CGG	2-PH Arginine (Arg)	
	A	AUU AUC AUA AUG	ACU ACC ACA ACG	AAU AAC AAA AAG	Asparagine (Asn) Lysine (Lys)	AGU AGC AGA AGG	Serine (Ser) Arginine (Arg)	
	G	GUU GUC GUA GUG	GCU GCC GCA GCG	GAU GAC GAA GAG	Aspartic acid (Asp) Glutamic acid (Glu)	GGU GGC GGA GGG	Glycine (Gly)	
Third base								

الوثيقة 3

النموذج الثالث

التمرين الأول:


نفترض من خلال ما يلي دراسة بعض مظاهر التغيير المورثي، يتوفّر غشاء البكتيريا E.COLI على بروتين خاص يسمح بثبتت بعض أنواع المضادات الحيوية لينتج عن ذلك تحطيم البكتيريا. يتكون هذا البروتين من 421 حمضًا أمينيًّا و تتمثل الوثيقة 1 ترتيب عشر أحمس أmino acid على مستوى جزء من هذا البروتين و تعطي الوثيقة 2 الوحدات الرمزية لـ ARNm التي ترمز لمختلف الأحمس الأمينية المكونة لهذا الجزء البروتيني.

149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
Ala – Gly – Gly – Ser – Ser – Phe – Ala – Ser - Asn

الوثيقة 1

الأحمس الأمينية	رموزات الـ ARNm
الAlanine Ala	GCU
Glycine Gly	GGU
Serine Ser	UCU
Phenylalanine Phe	UUC
Asparagine Asn	AAC

الوثيقة 2



ب- ما إسم الظاهرة التي يجسدها هذا الشكل؟

ج- حدد مراحل هذه الظاهرة.



د- إلى أي مرحلة من هذه المراحل ينتمي الشكل المبين في الوثيقة 3 في الوثيقة 3؟

ـ 3- أنجز رسمًا تخطيطيًّا مشابهاً لشكل الوثيقة 3 يبرر إدماج الحمض الأميني رقم 151.

مولياته علوم الطبيعة والحياة

التمرین الثاني:

بالاعتماد على الوثقتين 1 و 2 التاليتين:



- أجب على الأسئلة التالية:


- 1- أكتب البيانات الممثلة بالحروف من (أ) إلى (ه).
- 2- هل تمثل المنطقة 1 ظاهرة تقارب أم تباعد؟
- 3- إشرح ماذا يحدث على مستوى هذه المنطقة.
- 4- ماذا تمثل المنطقة ؟
- 5- ما هي الظاهرة الجيولوجية المسؤولة عن الزوال التدريجي للمنطقة (هـ)؟
- 6- ماذا تمثل المنطقة (3)؟ تسبب قوى الإنضغاط الأفقي على مستوى هذه المنطقة في حدوث نوعين من التشوهات ، ذكرها.
- 7- ضع عنواناً لهاتين الوثقتين.

الوضعية الإحتمالية:

- 1) قصد معرفة الزمرة الدموية لفرد -أ- نقوم بالتجربة الموضحة في الوثيقة -1-

قطرة دم AntiA+	قطرة دم AntiB+	قطرة دم BntiA+AntiA+	قطرة دم AntiD+
حيبي	متجانس	حيبي	حيبي
الوثيقة 1			

- أ- على ماذا يدل المظهر الحيبي والمظهر المتجانس؟



الوثيقة 2

ب- إلى أي زمرة ينتمي هذا الشخص؟

2) يعود المظاهر الحبيبي إلى تدخل جزيئات كيميائية تدعى الأجسام المضادة ممثلة في الوثيقة التالية:

أ_ تعرف على العناصر المرقمة من 1 إلى 6.

ب- أذكر الطبيعة الكيميائية لهذه الجزيئة.

ج- أرسم رسم تخطيطي توضح فيه أجزاء هذه الجزيئة.


3) لمعرفة دور هذه الأجسام المضادة و مصدرها تقوم بالتجارب التالية:

* التجربة 1: حقن فار (B₁) بجرعة مناسبة من مولد ضد هو مصل ألبومين

البقر، يسبب هذا الحقن ظهور أجسام مضادة.

نعاير بمرور الزمن كمية الأجسام المضادة التي تظهر بعد الحقن الأول و الثاني فنحصل على المنحنيين س و ص (الوثيقة 3).

علماً أن الحقن الأول و الثاني كانا بنفس مولد ضد.



* التجربة 2: على فار آخر (B₂) من نفس سلالة (B₁) نجري مايلي:

حقنه بمصل ألبومين البقر السابق و هذا يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة يوضحها المنحنى س (الوثيقة 1)، ثم حقنه بمولد ضد (a) مختلف عن مصل ألبومين البقر و بنفس الجرعة يؤدي ذلك إلى إنتاج أجسام مضادة يوضحها المنحنى ع (الوثيقة 3).


1- استخلص مميزات الاستجابة المناعية و هذا من خلال:

أ- تفسير و مقارنة المنحنيين س و ص؟

ب- تفسير و مقارنة المنحنيين س و ع؟

2- ارسم منحنى تطور كمية الأجسام المضادة عند حقن الفار (B₁) بمولد ضد T₂ في الأسبوع 15 معللاً ذلك؟

* التجربة 3: بعد معايرة الأجسام المضادة عند الفار (B₁) و المتولدة ضد T₂ نقله نزع منه العقد اللمفاوية القرنية من مكان الحقن فلاحظ تحول بعض الخلايا من أ إلى ب (الوثيقة 4).



أ- ماذا تمثل الخلية أ و الخلية ب؟ و ما هو مصدرهما؟

ب- تعرف على البيانات المشار إليها بالأرقام.

ج- كيف يتم الانتقال من أ إلى ب ووضح ذلك بمخطط بسيط؟

د- ما هي العلاقة البنوية و الوظيفية بين

العضيات 1، 2، 3، 4، 5، 6؟

* التجربة 4: عند معاملة الخلية ب بـ DNP الذي يعيق إنتاج ATP ينتج عنه توقف إنتاج الأجسام

المضادة وضح لماذا؟

النموذج الرابع

المقررين الأول:

لإبراز مظاهر تعبير المعلومات الوراثية عند الثدييات، نقترح تحليل بعض المعطيات المتعلقة بتركيب هرموني الفاسوبريسين (vasopressine) والأسيتوسين (ocytocine) ونقرز هاتين المادتين ذات الطبيعة البروتينية من طرف الفص الخلفي للغدة النخامية، يمثل الشكل 1 من الوثيقة 1 قطعة من شريط ADN لمஸوول عن تركيب الفاسوبريسين و يمثل الشكل 2 قطعة من شريط ADN المسؤول عن تركيب الأسيتوسين.

→ حدة الماء

<chem>ACGATGAAGGTCTTGACGGGTTCTCCCT</chem> <chem>ACGATGTAGGTCTTGACGGGGGACCCG</chem>	الشكل 1 الشكل 2
---	--------------------


الوثيقة 1

- 1- عرف المورثة.
- 2- قارن بين الشكلين 1 و 2 الممثلين في الوثيقة 1.
- 3- أعط متالية ARNm المقابلة لكل قطعة من شريطي ADN.
- 4- باستعمال جدول الشفرات الوراثية حدد متالية الأحماض التي تدخل في تركيب كل هرمون.
- 5- قارن سلسلتي الأحماض المتحصل عليهما، و ماذا تستنتج من هذه المقارنة.

تمثل الوثيقة 2 إحدى مراحل تعبير المعلومات الوراثية:

1- أكمل بيانات هذه الوثيقة.

2- تعرف على المرحلة الممثلة في الوثيقة 2.



المقررين الثاني:

قامت مجموعة من التلاميذ وبهدف التعرف على خصائص بعض الصخور الموجودة في الجزائر، نأخذ ثلاثة عينات لصخور من ثلاثة مناطق مختلفة من الجزائر و هي: رأس بوغارون (القل)، فليفلة (سكيكدة) و دلس (بومرداس)، حيث بينت الدراسة بالعين المجردة و المجهر ما يبينه الجدول الموالي:

حولياته علم الطبيعة والحياة

العينة	لون اخضر	سوداء اللون	فاتحة اللون	المعدن
01				كوارتز + فلسيار + بلاجيوكلاز + أمفبولي + ميكا.
02				المعادن الكبيرة: أمفبولي + بيروكسین + بلاجيوكلاز المعادن الدقيقة: ميكروليت
03				أولفين + بيروكسین


1- حدد نوع الصخور (1، 2، 3) و نوع النسيج.

2- من أي منطقة من الجزائر أخذت كل عينة من هذه العينات؟

الوضعيّة الاحماضية

I- المركبات التالية عبارة عن وحدات تدخل في تركيب مادة عضوية نسبتها من 15-20% من المادة

الحية.



1- كيف تسمى هذه المركبات؟

2- تقسم هذه المركبات أساساً إلى 3 أقسام. على أي أساس يتم ذلك؟ صنف إذا هذه المركبات الثلاث.

3- شكل ثاني البيبيدي (الآنين - ليزين) (اكتبه المعادلة).

4- اكتب صيغة ثالثي البيبيدي (الآنين - ليزين - حمض الأسبارتيك).

5- ما هي المادة المشكّلة نتيجة إرتباط عدد كبير من هذه الوحدات؟

II- نقطة التعادل الكهربائي للأحماض الأمينية السابقة هي كما يلي:

pHi	الحمض الأميني
6.01	الآنين
9.74	ليزين
2.95	حمض الأسبارتيك

1- ماذا يقصد بنقطة التعادل الكهربائي؟

2- توضع الأحماض السابقة على جهاز الهجرة الكهربائية ثم تبلل الورقة بمحلول ذو pH يختلف من تجربة إلى أخرى و هي (2.1، 4، 6، 10) ثم توضع هذه الورقة ضمن مجال كهربائي لمدة من الزمن. في أي إتجاه تكون هجرة الأحماض السابقة، على؟

3- بين بإستعمال الصيغ المفصلة السابقة مختلف الشحنات التي تأخذها المركبات السابقة في الوسطين

الحامضي (2.1) و القاعدي (10)؟

ماذا تستنتج حول الخواص الكيميائية لهذه المركبات؟

الفحص الم الخامس

التمرين الأول:

- 1- أجريت تجربة على فئران من سلالات صافية AA و BB تمثل الجزيئات الموافقة لنظام HLA للإنسان، يمثل الجدول التالي النتائج المحصل عليها.

التجربة	المعطى	الناتج	المستقبل
1	AA	AA	قبول الطعام
2	AA	BB	رفض الطعام (الفأر BB)
3	AA	BB	قبول الطعام (الفأر BB) منزوع الغدة التيموسية عند الولادة
4	AA	BB	رفض الطعام (الفأر BB) منزوع الغدة التيموسية عند الولادة و حقن باللمفاويات للفأر BB

أ- لماذا الفأر B_2 يقبل الطعام بينما الفئران B_1 و B_3 يرفضانه؟

ب- ما هي الخلايا المناعية التي تتدخل في رفض الطعام؟

ج- ما هو دور الغدة التيموسية؟

2- في تجربة أخرى استخلصت لمفaoيات من الفأر AA و حقنت في فأر آخر AA من نفس السلالة فلم نلاحظ أي رد مناعي، في حين عند معاملة المفaoيات بابزيمات تغير من الجليكوبروتينات الغشائية و حقنها في الفأر المستقبل نلاحظ رد مناعي.

أ- لماذا هاجمت الخلايا المناعية للفأر المستقبل الخلايا المفaoية التي تم تغيير جليكوبروتيناتها الغشائية؟

ب- ما هو رد الفعل المتوقع (قبول أو رفض) إذا زرعنا جلد من فأر AA إلى فأر هجين AB؟

التمرين الثاني:


لدراسة بعض مظاهر عملية التركيب الضوئي

تحقق التجارب التالية:

التجربة 1:

* حلل هذه المحنثيات، ثم استنتج مصدر O_2 المستعمل خلال عملية التنفس و O_2 المتصروحة خلال عملية التركيب الضوئي.

التجربة 2:



مولياته علوه الطبيعة و العيادة

نجزى صانعات خضراء و ذلك لفصل الستروما (الحشوة) و الكيسات، ثم نضع الكيسات في الضوء و الستروما في الظلام و نغذي كلاً منها بـ $C^{14}O_2$ المشع. ثم نجري عليهم سلسلة من التجارب المماثلة في جدول المقابل.


كمية CO_2 المثبتة في الستروما	التجارب
4000	الستروما موضعية في مكان مظلم 1
96000	الستروما في مكان مظلم 2 الكيسات في مكان مضيء { ثم في الظلام
43000	الستروما في الظلام + ATP 3
97000	الستروما في الظلام + ATP + ناقل مرجع NADPH ₂ 4

- * فسر هذه النتائج ثم إستنتج :
- (أ) مقر و شروط ثبات CO_2 ؟
- (ب) دور الكيسات في وجود الضوء؟

الوضعية الإدماجية:

العمل المنظم للخلية هو نتيجة تفاعلات بين مختلف الجزيئات الخلوية خاصة البروتينات ، تفترح في هذا الموضوع معالم بعض الفواهر من النشاط البيولوجي لهذه الأخيرة.

- إن بنية البروتينات تكتسبها تخصصاً وظيفياً عالياً.
- الوثيقة - ١ - هي تمثيل فراغي لجزيئه بروتين.
- تعرف على هذه البنية.
- وضح بنية الجزء المؤطر في الوثيقة - ١ - باستعمال الصيغة β الوثيقة - ١ . الكيميائية العامة لوحداتها التركيبية.
- استخرج كيف يتم الانتقال من هذه البنية المؤطرة إلى الشكل الممثل في الوثيقة - ١ - ، لماذا يعبر هذا الانتقال أساسياً؟
- إن التخصص الوظيفي للبروتين مرتبط بصفة وطيدة ببنائه، فيما يتمثل هذا الارتباط؟
- تمثل الوثيقة التالية جزءاً من المورثة المسؤولة عن إصطناع ببتيد عند حيوان ثدي.



- ١- يستخرج قطعة الـ ARN الرسول اعتباراً من سلسلة الـ ADN القالب (+).

حولياته علم الطبيعة والحياة

2- ما هي الأحماض الأمينية اللازمة لتركيب متعدد الببتيد الناتج من ترجمة قطعة الـ ARN الرسول؟

3- ما هي جزيئات الـ ARN الناقل التي تحمل الأحماض الأمينية اللازمة؟

* ما هي الأحماض الأمينية المنقولة بواسطة الـ ARN الناقل المبينة فيما يلي:




III- تظهر عند بعض الأشخاص تشوهات في مستوى كريات الدم الحمراء، فيصاب هؤلاء بمرض يدعى فقر الدم المنجل، حيث تصبح كريات الدم الحمراء منحلية الشكل و حاوية على خضاب الدم غير عادي يرمز له بـ HbS.

أظهرت الدراسات أن المرض مرتبط بتغيير في بنية خضاب الدم العادي و بالتحديد في مستوى سلسلة واحدة من الـ Hb.

1- ما هي الظاهرة المسؤولة عن ظهور هذا المرض.

2- تمثل الوثيقة 1- أ جزء من الـ ARN الرسول الموجود في خضاب الدم العادي HbA، يشفّر هذا الجزء لسلسلة عديد الببتيد من HbA

و تمثل الوثيقة 1- ب جزء من الـ ARN الرسول الموجود في خضاب الدم الغير العادي HbS ، يشفّر هذا الجزء لسلسلة عديد الببتيد من HbS.




* فسر الظاهرة بعد إستنتاج المورثة المسؤولة عن خضاب الدم .

* بإستخدام جدول الشفرات الوراثية، حدد الفرق، من حيث البنية الببتيدية بين HbS و HbA.

حل المفهوم الأول


المفهرين الأول:

- 1- عنوان الوثيقة: رسم تخطيطي لسلسلة بروتينية (بنية أولية).
- 2- نسمية الروابط الكيميائية المبينة في الوثيقة: $\text{N} \text{--- C}$
- 3- رابطة بيبتيدية، ص: رابطة كبريتية، ع: رابطة أيونية (شاردية): م: رابطة هيدروجينية.
- 4- كتابة الصيغة الكيميائية للببتيدات المؤطرة في الوثيقة -1-.



المفهرين الثاني:

- 1- الرسم البياني :



ب- يطلق على هذا المنحنى "مخطط بنiof".

- ج- الميل = 40° و هو يدل على وجود حركة تقارب بين صفيحة الهدى و صفيحة الهند أسترالية .
- 3- نفتر وجد البراكين بشكل الماغما في البرنس الليتوسفيري للصفيحة المترابطة ثم تصعد شاقوليها .
- 4- تغوص صفيحة الهدى أسفل صفيحة الهند أسترالية .

مولياته لعلوم الطبيعة والحياة

الوضعية الإدماجية: الامتحنة لـ ARN الرسول

١- حساب سرعة السائلة العصبية:

$$\text{سر} = \frac{\Delta F}{\Delta Z} = \frac{3-8}{2.5} = 2.5 \text{ سم} , \Delta Z = 1.5-4 \text{ ميلي ثا} , \text{سر} = \frac{5}{2.5} = 2 \text{ سم / ميلي ثا} .$$

* مميزات سرعة السائلة العصبية:

- اتجاه واحد: الجسم الخلوي ← المادة البيضاء ← العصب ← العضلة.

- سريعة.

- ثابتة على طول العصب.

- تأخر في مستوى الشق المشبكي.

٢- أ. البيانات:

أ- خلية عصبية، ب- خلية عضلية.

١- محور أسطواني، ٢- ميتوكوندري، ٣- حويصلات مشبكية، ٤- غشاء قبل مشبكي، ٥- طرح أستيل كولين، ٦- شق مشبكي، ٧- غشاء بعد مشبكي، ٨- ليفات عضلية، ٩- هيولى عضلية، ١٠ الزر المشبكي.

* العنوان: مشبك عصبي عضلي (اللوحة المحركة).

ب.١) تفسير النتائج:

التجربة ٢: الخلية العضلية مستقطبة تتبعها يسبب في ظهور موجة زوال الإستقطاب لأن العضلة قابلة

للتبغ (مستقطبة).

التجربة ٥: الكالسيوم هو المسبب في تغير الحويصلات المشبكية و ذلك بدون تتبغ و منه الكالسيوم يلعب دور السائلة العصبية (منبه).

التجربة ٦: حقن الكرار في الشق المشبكي لا يؤثر بحيث أن عند التتبغ العنصر ١- نلاحظ ظهور كمون عمل.

التجربة ٧: حقن الكرار في مستوى العنصر ٣- يسبب شلل العضلة لأن الكرار يتوضع في مكان الأستيل كولين و ذلك في مستوى المستقبلات الغشائية و منه فهو يسبب شلل في العضلة فهو تتبغ مثبط.

(٢) نستنتج مايلي:

- ينتقل التتبغ من العصب إلى العضلة عبر الشق المشبكي.

- تنتقل السائلة العصبية عبر المشبك بتدخل وسيط كيميائي الأستيل كولين.

حل المموج الثاني

التمرین الأول:

1- خصائص الإنزيم:

- * الإنزيمات نوعية (أي أنها تعمل في موقع مختلف داخل البروتين).
- * كل إنزيم يعمل في وسط PH خاص به (اختلاف PH الأمثل للعمل).
- * تتميز أنزيمات الهضم بتنشيطها بعد الإفراز.

2- نتائج معاملة البيبيدي بإنزيم البيسين (Phe,Tyr)

Ala- Gly- Tyr	}	الاحتمال 1
Arg- Ser- Phe		
Glu- Val- Lys- Leu		

Ala- Gly	}	الاحتمال 2
Tyr -Arg- Ser		
Phe -Glu- Val- Lys- Leu		

نتائج معاملة البيبيدي بإنزيم التربسين (Arg,Lys) :

Ala- Gly- Tyr- Arg	}	الاحتمال 1
Ser- Phe- Glu- Val- Lys		
Leu		

Ala- Gly- Tyr	}	الاحتمال 2
Arg- Ser -Phe -Glu- Val		
Lys- Leu		

التمرین الثاني:

1- رغم غياب CO_2 و في وجود كل من الضوء و مستقبل الإلكترونات (DCPIP) تسجل زيادة في تركيز O_2 في الوسط (من ب إلى جـ أو من هـ إلى و كما في المنحنى) مما يدل على طرحه من طرف الصناعات الخضراء المعزولة .

2- قبل إضافة مستقبل الإلكترونات (DCPIP) و بوجود الضوء تسجل تناقص في O_2 (الجزء أـ بـ من المنحنى) دلالة على إستهلاكه من طرف الميتوكوندري (عملية التنفس) و على إثر إضافة DCPIP (جزء جـ هـ من المنحنى) يزيد تركيز O_2 ملحوظاً (وذلك في جـ هـ) مما يدل على إنتاجه من طرف الميتوكوندري .


الجزء ب - جـ من المنحنى) تسجل زيادة في تركيز O_2 في الوسط مما يدل على أن طرح O_2 يتطلب وجود مستقبل للإلكترونات .

3- رغم وجود كاشف هيل (DCPIP) و في غياب الضوء (النقطة 3 من المنحنى) نلاحظ تناقص في O_2 و بتوفّر الضوء (النقطة هـ) يستأنف طرح O_2 مما يدل على أن طرح O_2 يتطلب وجود الضوء .

4- في حالة نفاد DCPIP من الوسط (النقطة جـ أو د من المنحنى) أي في حالة إرجاعه نلاحظ تناقص في تركيز O_2 فطرح O_2 مرهون باستهلاك DCPIP أي إرجاعه.

الوضعية الإدماجية:

أ- ترجمة جزئية ARN الرسول إلى سلسلة بيتيدية:



ب- الإشكالية المطروحة خلال الترجمة:

الثلاثية الأولى من سلسلة النوكليوتيدات الممثلة لـ ARN الرسول ناقصة حيث تم تمثيل نوكليوتيدتين فقط منها.

جـ- تحديد الحمض الأميني الذي تمثله الثلاثية الأولى من سلسلة نوكليوتيدات ARN الرسول المعطاة في الوثيقة -2:-

الثلاثية الأولى من السلسلة هي (GU.) حيث أنها ناقصة، تكون هذه الثلاثية في المرتبة الثانية عشرة من نهاية السلسلة إلى بدايتها.

و مقارنة مع الوثيقة -1- التي تبين بنية جزئية الأنسولين و على مستوى السلسلة B من الجزئية، فإن الحمض الأميني المتواجد في المرتبة الثانية عشرة من السلسلة B إلى بدايتها، هو الحمض الأميني (الحمض

الأميني رقم 19) مرتبط باخر من السلسلة 8 بواسطة رابطة كبريتية، أي أنه حمض يحوي عنصر الكبريت (S).

و الأحماض الأمينية الحاملة لعنصر الكبريت هي: إما سستين أو المثيونين، وحسب جدول الشفرات الوراثية، فإن الثلاثية الخاصة بهذين الحمضين هي:

- سستين : UGU أو CUG - المثيونين: AUG

و بما أن النكليوتيدتين الثانية والثالثة لهذه الثلاثية الناقصة هي: "GU" فالنكليوتيدة الأولى منها وجب أن تكون حاملة لقاعدة "بوراسييل" و منه هذه الثلاثية هي: UGU و التي تمثل الحمض الأميني سستين.


د- جزء المورثة المسؤول على إصطناع نهاية هذه السلسلة من الأحماض الأمينية المكونة من 12 حمض

أميني:

UGUGGAGAGCGUGGCUUCUUCUACACUCCUAAGACU RNA الرسول

ACACCTCTCGCACCGAAGAAGATGTGAGGATTCTGA
TGTGGAGAGCGTGGCTTCTTACACTCCTAACAGACT

جزء المورثة المسؤول




حل النموذج الثالث

التمرين الأول:

1- اعطاء متالية القواعد الأزوتية المعبرة عن جزء المورثة المسئولة عن تركيب هذا البروتين:

149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

Ala - Gly - Gly - Ser - Ser - Ser - Phe - Ala - Ser - Asn



2- أ- تسمية معطيات الشكل المبين في الوثيقة 3:


يكون الريبوزوم الذي يخترق ARNm بصدق قراءة وحدتين، رامزتين تقابلان الحمضين الأمينيين 149 و 150 و ترتبط بهذا الريبوزوم أي بتحت وحدة كبيرة سلسلة البروتين.

ب- إسم الظاهرة التي يجسدها هذا الشكل هي: الترجمة.

ج- تحديد مراحل هذه الظاهرة: مرحلة البداية، مرحلة الإستطالة، مرحلة النهاية.

د- ينتمي الشكل المبين في الوثيقة 3 إلى مرحلة الإستطالة.

3- رسم تخطيطي مشابها لشكل الوثيقة 3 يبرز ادماج الحمض الأميني رقم 151 .



مولياته علم الطبيعة والحياة

التمرير الثاني:

١- كتابة البيانات الممثلة بالحروف من (أ) إلى (ه) :

أ- قشرة قارية، ب- رداء علوي، ج- الليتوسفير، د- رداء سفلي (ماغماتي)، هـ- قشرة محيطية.

٢- تمثل المنطقة ١ ظاهرة تقارب.

٣- شرح ماذا يحدث على مستوى هذه المنطقة:

على مستوى منطقة التقارب يحدث إنزلاق القشرة المحيطية تحت القشرة القارية (ظاهرة الغوص) و ذلك بسبب قوى الإنضغاط بين الصفيحتين.

٤- تمثل المنطقة ٢ خندق محيطي.

٥- الظاهرة الجيولوجية المسؤولة عن الزوال التدريجي للمنطقة (هـ) هي ظاهرة الغوص.

٦- تمثل المنطقة (٣) : تشكل جبال.

التشوهات التي تحدث بسبب قوى الإنضغاط الأفقية على مستوى منطقة تشكل جبال هي الطيات و الفوائق.

٧- عنوان الوثيقة ١: رسم تخطيطي لظاهرة الغوص.

- عنوان الوثيقة ٢: رسم تخطيطي لشكل جبل.

الوضعية الإدماجية:

١- أ- يدل المظاهر الحبيبي على حدوث تراص للكريات الحمراء بسبب الأجسام المضادة التي شكلت مع هذه الأخيرة معقدات مناعية.

و يدل المظاهر المتجلّس على عدم حدوث تراص للكريات الحمراء بسبب عدم تشكيل معقدات مناعية (أجسام مضادة - كرية حمراء).


ب- ينتمي هذا الشخص إلى الزمرة A⁺.

(٢) أ- التعرف على العناصر المرقمة:

١- منطقة متغيرة، ٢- منطقة ثابتة، ٣- سلسلة خفيفة ، ٤- سلسلة ثقيلة، ٥- موقع تثبيت الجسم المضاد على الخلايا المناعية.

ب- الطبيعة الكيميائية للأجسام المضادة هي : بروتينية.

جـ - رسم تخطيطي يمثل أجزاء الجسم المضاد.



(3) التجربة 1 و 2:

1- استخلاص مميزات الاستجابة المناعية:

أ- تفسير و مقارنة المنحنيين س و ص:

أدى الحقن الأول بمولد ضد البوتين البقر إلى ظهور الأجسام المضادة في الدم بعد حوالي أسبوع، ثم تزايّد الأجسام المضادة تدريجياً، وبعدها بدأت تتلاصص تدريجياً.
بعد الحقن الثاني بنفس مولد ضد تظهر الأجسام المضادة مباشرةً وبكمية كبيرة في الدم حتى تصل إلى قيمة عظمى بعد 10 أسابيع ثم تتلاصص تدريجياً.

يعود الاختلاف بين المنحنيين من وص إلى أن في الحقن الأول تكون الاستجابة المناعية أولية حيث تم خلاياها بلعمة مولد ضد و تشويط الخلايا البائية و تحول بعضها إلى خلايا ذاكرة تحتفظ بمحددات مولد ضد، و بالتالي تتعرف عليه مباشرة عند الحقن الثاني.

ب- تفسير و مقارنة المنحنيين س و ع :


أدى الحقن الأول بمولد ضد البوتين البقر إلى ظهور الأجسام المضادة في الدم بعد حوالي أسبوع، و عند الحقن بمولد ضد (a) مختلف عن مصل البوتين البقر يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة بعد أسبوع أيضاً.
في الحقن الأول و الثاني تكون الاستجابة المناعية أولية لأن مولد الضد مختلف.

نتيجة: نستخلص أن من مميزات الاستجابة المناعية هي أنها نوعية.

2- رسم منحنى تطور كمية الأجسام المضادة عند حقن الفار (B₁) بمولد ضد T₂ في الأسبوع 15 :

التحليل:

عند حقن الفار B₁ بمولد ضد T₂ في الأسبوع 15 تبدأ ظهور الأجسام المضادة في الدم بعد حوالي أسبوع من الحقن و تزايّد ثم بعدها تبدأ بالتللاصص، لأن الاستجابة أولية.




مولياته ملوك الطبيعة والحياة

* التجربة 4:

أ- تمثل الخلية أ: خلية لمفاوية بائية هو نقي العظام، و الخلية ب تمثل خلية بلازمية و مصدرها هي تحول الخلية البائية.

ب- التعرف على البيانات المشار إليها بالآرقام:

1- شبكة أندوبلازمية فعالة، 2- نواة، 3- جهاز غولجي، 4- غشاء بلازمي، 5- حويصلة إفرازية، 6- مادة مفرزة.



ج- يتم الانتقال من أ إلى ب كمالي: عند دخول الجسم الغريب إلى العضوية تعرف عليه البالعات الكبيرة و التي تقدم مستضداته للخلية المفاوية الثانية المساعدة و التي بدورها تقدمه للخلية المفاوية البائية، حيث تتكاثر هذه الخلايا و تتمايز، بفضل عوامل النمو و التمايز إلى خلايا بلازمية التي تقوم بإفراز الأجسام المضادة التي تهاجم الجسم الغريب و تفقده فعاليته. والمخطط المقابل يمثل هذا الانتقال.

د- العلاقة البنوية و الوظيفية بين العضيات 1، 2، 3، 4، 5، 6 هي: التعاون على إصطناع الأجسام المضادة و طرحها إلى الخارج كمالي:

* تقوم الشبكة الأندوبلازمية بترجمة المعلومة الوراثية الخاصة بالجسم المضاد و التي تأتي من النواة، إلى بروتينات مكونة للجسم المضاد.

* تنتقل هذه البروتينات إلى جهاز غولجي و الذي يقوم بتعديل و تعليب هذه البروتينات في حويصلات إفرازية.

* تطرح الحويصلات الإفرازية الحاملة للبروتينات إلى الخارج عبر الغشاء البلازمي عن طريق عملية الإطراح الخلوي.

* التجربة 4:

عند معاملة الخلية ب بـ DNP الذي يعيق إنتاج ATP ينتج عنه توقف إنتاج الأجسام المضادة، لأن إنتاج الأجسام المضادة عملية حيوية تحتاج إلى طاقة.

حل الفحص الرابع

التمرين الأول:

I- 1- **تعريف المورثة:** هي جزء من الصبغي مسؤولة عن ظهور صفة محددة، وهذا عند جميع الكائنات الحية.

2- مقارنة بين الشكلين 1 و 2 الممثلين في الوثيقة :

نلاحظ من خلال مقارنة الشكلين أن هناك اختلاف في نوع بعض القواعد الأزوتية لهاتين المتناثلتين لقطيعي الـ ADN.

3- إعطاء متناثلة ARNm المقابلة لكل قطعة من شريطي ADN:

UGC UAC UUC CAG AAC UGC CCA AGA GGA شكل 1 ARNm

UGC UAC AUC CAG AAC UGC CCC CUG GGC شكل 2 ARNm

4- تحديد متناثلة الأحماض التي تدخل في تركيب كل هرمون:

هرمون الفاسوبريسين Cys - Tyr - Phe - Gln - Asn - Cys - Gln - Arg - Gly
 1 2 3 4 5 6 7 8 9

هرمون الأسيتونين Cys - Tyr - Ileu - Gln - Asn - Cys - Pro - Leu - Gly
 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5- مقارنة سلسلتي الأحماض المتحصل عليهما:

هناك اختلاف في الأحماض الأمينية رقم 3، 7 و 8.

* الإستنتاج : مادام هناك اختلاف في الأحماض الأمينية بين الهرمونين هذا يعني اختلاف في الوظيفة أيضا.

I-II- إكمال بيانات الوثيقة:

1- ربيوزوم، 2- تحت وحدة كبيرة لربيوزوم، 3- سلسلة متعدد البيتيد، 4- تحت وحدة صغيرة لربيوزوم.

2- المرحلة المماثلة في الوثيقة 2 هي مرحلة الترجمة.

التمرين الثاني: بعد ما نجا بالختام، لأن الماء الذي أخذته من قيلولة قاتلها ولذلك

العينة	نوع الصخر	النسيج
01	الغرانيت	بلوري
02	البازلت	ميكروليتي
03	البريدوتيت	بلوري

2- أخذت عينة الغرانيت من ← فليفلة (سكيكدة).

أخذت عينة البازلت من ← دلس (بومرداس).

أخذت عينة البريدوتيت من ← رأس بوغارون (الفل).

الوضعية الإدماجية:

1- نسمى هذه المركبات : الأحماض الأمينية.

2- تقسم هذه المركبات أساسا إلى 3 أقسام هي: أحماض أمينية متعادلة، قاعدية و حامضية و ذلك على أساس نوع المجموعة الإضافية في الجذر الألكيلي R.


تصنيف هذه المركبات الثالث:

* الألين : حمض أميني متعادل.


* لizin: حمض أميني قاعدي.

* حمض الأسبارتيك: حمض أميني حامضي.

3- تشكيل ثالثي البيتيد (اللين- لizin):



4- كتابة صيغة ثالثي البيتيد (اللين- لizin- حمض الأسبارتيك):




5- المادة المشكّلة نتيجة ارتباط عدد كبير من هذه الوحدات هي البروتين.

مولياته علوم الطبيعة والحياة

II - 1- يقصد بنقطة التعادل الكهربائي: درجة pH التي يكون عندها الحمض الأميني متعادل كهربائياً ويرمز لها بـ pH_i.


2- تكون هجرة الأحماض كما يلي:




* تعليل: حُتَّ الأمتحان المُعيبة تجعلك تصلون المنهج في درس القاعدة آلياً سفطياً لأنَّ نزول شخصيٍّ في ساليفٍ يعنيه ترتيب المتربيٍّ والقديساً بدحيم

3- الشحنات التي تأخذها المركبات السابقة:

* في الوسط الحامضي (2.1):




* في القاعدي (10):



4- نستنتج أنَّ الأحماض الأمينية تسلك سلوك الأحماض (تحرر بروتونات H^+) في الوسط القاعدي، بينما تسلك سلوك القواعد (تكتسب بروتونات H^+) في الوسط الحامضي، ولذلك يطلق عليها اسم المركبات الأمفوتيية (الحمقية).

(كذلك يكتسب NH_3^+ بروتونات H^+ لتصبح NH_4^+).



حل النموذج الخامس

التمرير الأول:

- ١- أ- الفأر B_2 يقل الطعم لأنه ممزوج الغدة التيموسية: الأخصاص الأخرى للشعر وهذا النتيجة التي غيرت عضوية هذا الفأر لم تعرف على خلايا الطعم كخلايا غريبة وبالتالي لا ترفضها و هذا راجع لغياب الغدة التيموسية مما يؤدي إلى غياب الإستجابة المناعية.
- بـ بينما الفارين B_1 و B_3 يرفضان الطعم لأن عضويتهما تعرفنا على خلايا الطعم و هذا لوجود الغدة التيموسية عند الفأر B_1 و وجود خلايا لمفافية B_3 عند الفأر B_3 .
- جـ - الخلايا المناعية التي تتخل في رفض الطعم هي المفافية T (TL).
- ٢- أ- دور الغدة التيموسية: الغدة التيموسية مسؤولة على رفض الطعم و هذا بواسطة الخلايا المفافية T.
- بـ هاجمت الخلايا المناعية للفأر المستقبل الخلايا المفافية التي تم تغير جليكوبروتيناتها الغشائية لأن هذه الجليكوبروتينات الغشائية خاصة بالفرد أي أنها نوعية و هي التي تسمح للخلايا الباعمية بالتعرف على ما إذا كانت هذه الخلايا تنتمي إلى الجسم أم لا، و هذا ما يفسر مهاجمة الخلايا المناعية للفأر المستقبل من نفس السلالة بعد تخريب المفافية (CMH) لها و يطلق على هذه البروتينات السكرية (الجيوكوبروتينات) بمولدات الضد الذات (CMH).
- جـ - رد الفعل المتوقع (قبول أو رفض) إذا زرعنا جلد من فأر AA إلى فأر هجين AB هو حدوث رفض جزئي للطعم و هذا لعدم التوافق الكلي لمعقد التوافق النسجي الرئيسي (CMH) بين المعطى و المستقبل.

التمرير الثاني:

- التجربة ١:**
- ***تحليل هذه المنحنيات:**
- تحليل منحنى الأكسجين المشع: يتراقص تركيز الأكسجين المشع في الوسط في الضوء و الظلام و يستمر حتى ينعدم عند الدقيقة (60) حيث يستعمل من طرف الخلايا في عملية التنفس.
- تحليل منحنى الأكسجين العادي:
- * من ٠ إلى ٢٠ د: يتراقص تركيز الأكسجين العادي في الظلام حيث يستعمل من طرف الخلايا في عملية التنفس.
 - * من ٢٠ إلى ٣٥ د: يزداد تركيز الأكسجين العادي حيث تتجه خلايا الكلوريلا في عملية التركيب الضوئي نظراً لتوفر الضوء.
 - * من ٣٥ إلى ٥٥ د: يتراقص تركيز الأكسجين العادي حيث يستعمل من طرف الخلايا في عملية التنفس و توقف عملية التركيب الضوئي لغياب الضوء.

جولياته علوم الطبيعة والحياة

* الاستنتاج:

- مصدر O_2 المستعمل خلال عملية التنفس هو: $^{16}O_2$ و $^{18}O_2$ المنحلين في ماء الوسط.
- مصدر O_2 المطروح خلال عملية التركيب الضوئي هو الماء.

التجربة 2:

* تفسير النتائج:

- تجربة 1: عند وضع الستروما في الظلام تكون كمية CO_2 المثبتة قليلة لأن كمية الريبوزنات المائية قليلة و لم تتجدد بعد توفر نواتج المرحلة الضوئية.
- تجربة 2: عند وضع الستروما في الظلام و الكيسيات في الضوء ثم نقلها إلى الظلام تكون كمية CO_2 المثبتة معترضة و يرجع ذلك إلى توفر نواتج المرحلة الضوئية وهي ATP و $NADPH_2$ بسبب وضع الكيسيات في الضوء قبل نقلها إلى الظلام و يسمح هذا بتحويل PGAL إلى APG ثم إلى P.DI.Ru.P
- تجربة 3: تكون كمية CO_2 المثبتة متوسطة لأن توفر ATP يسمح بتحويل كمية من الكيسيات إلى P.DI.Ru و هذا يساهم في زيادة ثبات كمية CO_2 .
- تجربة 4: تكون كمية CO_2 المثبتة كبيرة لتوفر ATP و $NADPH_2$ و مما يمثلان نواتج المرحلة الضوئية.

* الاستنتاج :


- (أ) مقر ثبات CO_2 هو : المادة الأساسية (الستروما) و شرطها هي توفر ATP و مصدرا للبروتونات والإلكترونات أي توفر $NADPH_2$ و هذا إنطلاقا من الطاقة الضوئية و أكسدة الماء لضمان تجديد .Ru.DI.P

- (ب) دور الكيسيات في وجود الضوء هو توفير ATP و $NADPH_2$ إنطلاقا من الطاقة الضوئية و أكسدة الماء.

الوضعية الأداجية:

- أ-α - هذه البنية هي بنية ثالثية لأن السلسلة ملتفة حول نفسها.

- β - وضع بنية الجزء المؤطر في الوثيقة 1-1:



ب- يتم الإنتقال من البنية الأولية إلى الثالثة بزيادة طول البنية الأولية فتنتقل إلى البنية الثانية ثم تلتف حول نفسها مشكلة بنية ثالثية، و تتشاً روابط و جسور تسمح للجزء بالثبات ، يعتبر هذا إنتقال أساسيا حيث تبرز فيه المواقع النشطة للبروتين.


2- يتمثل هذا الارتباط في: * عدد ونوع و نظام سلسل الأحماض الأمينية للبروتين و كذا البنية الفراغية للبروتين.

1-1- استخراج قطعة الـ ARN الرسول اعتبارا من سلسلة الـ ADN القالب (+):


UAUCUCAAUGGCCUCACA الـ ARN الرسول

2- الأحماض الأمينية اللازمة لتركيب متعدد الببتيد الناتج من ترجمة قطعة الـ NAR الرسول:

Tyr- Leu- Asn- Gly- Leu- The



* الأحماض الأمينية المنقولة بواسطة الـ ARN الناقل المبينة فيما يلي:



III- 1- الظاهرة المسؤولة عن ظهور المرض: لطفرة الوراثية.

2- استخراج المورثة المسؤولة عن خضاب الدم لـ (HbA):

CATGTGGAGTGAGGTCTTGTTC

استخراج المورثة المسؤولة عن خضاب الدم لـ (HbS):

CATGTGGAGTGAGGTCTAGTC

* تفسير الظاهرة بعد استئصال المورثة المسؤولة عن خضاب الدم :

حدث تغيير في أحد القواعد الأزوتية المكونة لقطعة المورثة المسؤولة عن خضاب الدم مما أدى إلى تغيير في أحد نكليوتيدات ARN الرسول الذي يؤدي بدوره إلى تغيير في نوع الحمض الأميني الموافق لها و من ثم يكون البروتين غير نشط.

* تحديد الفرق من حيث البنية البينية بين HbA و HbS: في خضاب الدم العادي يكون الحمض الأميني رقم 6 حمض الغلوتاميك أما في خضاب الدم الغير عادي فنجد حمض الفالين.

الفهرس

الصفحة	العنوان
3	النموذج الأول
6	النموذج الثاني
9	النموذج الثالث
12	النموذج الرابع
14	النموذج الخامس
17	حل النموذج الأول
19	حل النموذج الثاني
24	حل النموذج الثالث
26	حل النموذج الرابع
29	حل النموذج الخامس

اطلبوا من الناشر ...



رقم الإيداع: 2008-776

ISBN 978-994-78-6910-9



9 789947 869109 >

جميع الحقوق محفوظة

لدار شرفي للطباعة والنشر والتوزيع

العنوان: حي الصومام عماره 13 ب رقم 7 باب الزوار الجزائر العاصمة

الهاتف: 073 78 08 69

تلفاكس: 021 24 12 63